

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2025



Carlos Alvarez-Cros (ed.)



El G. N. Sterna és una
societat adherida a la
ICHN
Institut Catalana d'Història Natural
Fili de l'Institut d'Estudis Catalans

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2025

Carlos Alvarez-Cros (ed.)
(vallridaura@yahoo.es)

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2025

Coordinació i selecció de dades
Carlos Alvarez-Cros

Revisió general de textos
Carlos Alvarez-Cros
Josep Ma Bas Lay
Rosa Matesanz Torrent
Jaume Ramot García

Revisió de textos de ratpenats
Josep Vidal Oliveras

Revisió de textos d'amfibis i rèptils
Eudald Pujol Buxó

Citació bibliogràfica recomanada.

Obra completa: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2026. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2025.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2025.pdf

Espècie concreta, exemple: Soler, J. 2026. Terrerola comuna (*Calandrella brachydactyla*) in: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2026. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2025.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2025.pdf

Fotos de portada: territ fosc (*Calidris maritima*), el 6.II.2025 (Carlos Alvarez-Cros). *Paracorymbia stragulata*, el 8.VI.2025 (Carlos Alvarez-Cros). *Drusia valenciennii*, el 22.IV.2025 (Carlos Alvarez-Cros).

SUMARI

INTRODUCCIÓ	5
ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL	5
ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI	5
AGRAÏMENTS	6
METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES	6
ESTRUCTURA	8
RESUM DE L'ANY	9
LLISTA GENERAL D'OCELLS	14
LLISTA D'ESPÈCIES NO NATIVES	66
LLISTA DE MAMÍFERS	67
LLISTA DE RÈPTILS	73
LLISTA D'AMFIBIS	79
PEIXOS MARINS	81
PAPALLONES DIÛRNES	82
PAPALLONES NOCTURNES	87
ODONATS	94
NOTES ADDICIONALS D'ALTRES GRUPS D'INVERTEBRATS: (ORTÒPTERS (96), MOL·LUSCS (97), CERAMBÍCIDS (106), BERNATS (109), MANTODEUS (109), CIGALES (106), ARÀCNIDS (110), ASCALÀFIDS (115))	
NOTES ADDICIONALS D'INVERTEBRATS MARINS	116
NOTES ADDICIONALS DE VEGETALS	117
NOTA ADDICIONAL DE BOLETS	134
NOTES ADDICIONALS DE LIQUENS	135
TAULA D'OBSERVADORS	138
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES	140
ÍNDEX ALFABÈTIC	141


INTRODUCCIÓ

Aquest és el dissetè dels anuaris ornitològics de la vall del Ridaura i el desè també naturalístic. Com els precedents, neix amb la voluntat de deixar constància de la realitat ornitològica i naturalística actual de la Vall, tot recollint aquelles observacions més destacades que s'hi han produït. A més dels ocells, s'hi inclouen les citacions interessants d'altres grups de vertebrats (mamífers, rèptils, amfibis i peixos) i d'alguns invertebrats (papallones diürnes, odonats i altres). També s'han afegit dades de citacions d'espècies no citades abans a la Vall d'aquells grups d'invertebrats dels quals hi ha un cert seguiment.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL

En aquest document, per vall del Ridaura, s'entén l'àrea de terreny (uns 130 km²) que comprèn els termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, amb la franja oriental del terme de Llagostera, delimitada al nord per la riera de la Resclosa, i al sud per la carretera de Sant Llorenç i Sant Grau, GIP-6821 i la part de mar davant de la costa d'aquesta àrea (Fig. 1).

Tal com figura al títol, l'espai temporal abraça l'any 2025.



Límits, en vermell, de la vall del Ridaura
(Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2017)

ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI

Per a comunicar les dades es recomana l'ús del portal web Ornitho.cat (www.ornitho.cat) ja que, a més, s'integraran al conjunt de dades del territori català, fet que incrementarà el seu valor particular i el del conjunt. En tot cas, també es poden enviar directament a l'editor, a l'adreça de correu electrònic: vallridaura@yahoo.es

Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:

- Geogràfic: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de les que es té poca informació.

- Fenològic: dates de presència a la zona, tant extremes com poc habituals.
- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona.
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona.
- Etològic: comportaments d'interès o poc habituals.
- Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

AGRAÏMENTS

Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l'aportació d'observacions i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hauria estat possible.

METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES

La gran majoria de les dades prové de comunicacions personals, fruit d'una activitat d'observació regular i constant, encara que no professionalitzada.

L'altra font d'obtenció de dades correspon a les sessions de treball de diferents projectes que s'han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.

Anellament científic d'ocells i control d'ocells marcats

Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. Fruit del seguiment de rapinyaires diürns i nocturns, aquest any es van marcar quatre polls de xoriguer comú (*Falco tinnunculus*), quatre polls de falcó pelegrí (*Falco peregrinus*), sis (2 adults i 4 polls) òlibes (*Tyto alba*), nou ducs (*Bubo bubo*), vint-i-sis xots (*Otus scops*) i cinc (1 adult i 4 polls) mussols comuns (*Athene noctua*).

D'altra banda, es va continuar amb la labor de lectura d'anelles a distància. Es va poder llegir anelles de lectura a distància posades a espècies, com el corb marí emplomallat (*Gulosus aristotelis*), la gavina riallera (*Chroicocephalus ridibundus*), la gavina corsa (*Ichthyophaga audouinii*) el gavià argentat (*Larus michahellis*), el xatrac bec llarg (*Thalasseus sandvicensis*), el becplaner (*Platalea leucorodia*) o el falcó pelegrí (*Falco peregrinus*). Aquest any hem tornat a comptar, al Parc dels Estanys, amb la presència hivernal del brenat pescaire (*Ardea cinerea*) marcat, ja detectat el juliol de 2016, que ha hivernat des de llavors en aquest indret.

Projectes coordinats per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)

Durant el 2025, s'ha continuat amb la participació al Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), integrat al *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS), projecte impulsat per l'*European Bird Census Council*, que engloba els seguiments d'ocells comuns realitzats en 25 països europeus i genera tendències a escala europea per a 145 espècies d'ocells i bioindicadors multi-específics sobre l'estat dels hàbitats.

També s'ha continuat fent censos complementaris d'aus marines, integrats en el projecte SAM (Seguiment d'Aus Marines). El punt d'observació se situa a Port Salvi, a Sant Feliu de Guíxols.

En el marc del Projecte Orenetres, s'ha continuat realitzant un cens de nius d'oreneta cuablanca del casc urbà de Santa Cristina d'Aro.

Censos

Com cada gener, s'ha participat en la realització del cens anual internacional d'aus aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Per tercer any consecutiu el Grup de Natura Sterna, junt amb el Consorci de les Gavarres, ha organitzat i portat a terme un cens d'àguila marcenca (*Circaetus gallicus*) al massís de Gavarres.

Altres

Aquest any s'ha continuat amb el seguiment de papallones diürnes, amb un recorregut CBMS (*Catalan Butterfly Monitoring Scheme*) al comal de la Coma de Castell d'Aro pel seguiment de les poblacions de papallones diürnes. Addicionalment, aquest any, s'ha iniciat la participació en el projecte "Jardins de papallones" (coordinat pel CBMS), a l'Oasi de papallones del Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

ESTRUCTURA

El primer que trobem és un resum de l'any des del punt de vista ornitològic, que també inclou comentaris sobre fets que afecten la nostra ornitofauna.

Les espècies d'aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2025 estan agrupades en dues llistes. La primera, o llista general, inclou les espècies de presència natural a casa nostra. A la segona llista figuren les espècies no natives i/o escapades de captivitat. Cal aclarir que, a la llista general s'ha inclòs espècies que, malgrat ser no natives com l'oca d'Egipte (*Alopochen aegyptiaca*), el faisà (*Phasianus colchicus*), la cotorreta pitgrisa (*Myiopsitta monachus*) o el bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*), mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d'algunes més o menys properes.

Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies. L'ordre i la nomenclatura científica emprats són els recomanats per l'*AviList Core Team* (*AviList Core Team, 2025*). Els noms catalans són els emprats al *Diccionari dels ocells del món* (Fundació Barcelona Zoo, Institut Català d'Ornitologia, TERMCAT, 2023).

A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català. Immediatament rere seu, el nom científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d'un tàxon de nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu l'estatus actual a l'àrea d'estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dona la següent informació: nombre, edat i sexe dels individus, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de l'observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d'una citació a una altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l'observació. Quan es tracta de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d'on s'ha extret la informació. Les citacions d'espècies sotmeses a homologació per part del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (CAE, 2013), el CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya, 2021) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología) (Rouco i altres, 2019) i que encara no hagin estat homologades, figuren en lletra de color gris. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota on, si se sap, es detalla el número de l'homologació.

Com altres anys, aquest s'han inclòs alguns gràfics obtinguts mitjançant les dades entrades al portal Ornitho.cat per tal d'il·lustrar la presència anual d'algunes espècies.

De la majoria d'espècies comunes a la vall, sense canvis significatius d'estatus o observacions destacables, no se n'inclouen les citacions.

Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s'han pres a la vall durant el 2025 i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un asterisc després del codi de l'autor: (XXX*).

Després de la part destinada als ocells, segueixen les dedicades als altres grups de vertebrats (mamífers, rèptils, amfibis i peixos), així com d'invertebrats (ropalòcers - papallones diürnes- i odonats -libèl·lules-). Aquest any també s'han inclòs unes notes addicionals amb dades interessants sobre altres grups d'invertebrats, ja que s'ha continuat amb la recerca de camp de papallones nocturnes, d'ortòpters, de mol·luscs continentals, d'escarabats cerambícids, de bernats (família *Pentatomidae*), d'aràcnids i d'invertebrats marins. També s'ha fet una certa recerca de camp, així com una cerca


als arxius fotogràfics de diversos membres del G. N. Sterna, dels Ascalàfids presents a la nostra Vall. Per fi, s'inclouen unes notes addicionals de vegetals, de molses, de bolets i de líquens.

Al final, abans de l'índex alfabètic d'espècies hi ha la taula de correspondència entre els codis dels observadors i els seus noms, seguida de les referències bibliogràfiques citades.


RESUM DE L'ANY

Pel que fa a les particularitats d'aquest any 2025, es passa a enumerar, més o menys cronològicament, les més significatives.

Comencem amb un gràfic, amb les principals dades meteorològiques de l'estació meteorològica de Sant Feliu de Guíxols, gestionada per Andreu García Monge.
https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESCAT1700000017220B?screen_width=1536




A casa nostra, l'hivern del 2024-2025 ha estat càlid i lleugerament sec.




Així ho mostren els gràfics del Servei Meteorològic de Catalunya, que comparen les dades respecte de la mitjana climàtica dels anys 1991 - 2020. (<https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/686782/l-hivern-ha-estat-càlid-i-sec-a-catalunya-molt-sec-al-terc-sud>).


No fou fins a mitjans de març que es trencà la tendència, ja que aquest mes de 2025 ha estat el més plujós d'aquest segle al conjunt de Catalunya, superant lleugerament el de 2011, i un dels més plujosos que s'han mesurat al país, comparable al de 1974. D'altra banda, el conjunt del país no vivia un mes tan plujós des del gener de 2020. Aquesta anomalia de la precipitació ha estat causada per les contínues pertorbacions que, despenjades del corrent general, han afectat Catalunya provocant precipitació generalitzada (<https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/695502/el-marc-mes-plujos-del-que-portem-de-segle>).



El nostre estiu va ser càlid arreu amb una anomalia termomètrica igual o superior a +2 °C respecte de la mitjana dels anys 1991-2020. Les precipitacions van ser les normals. Tot plegat tal com es pot observar als mapes del Servei Meteorològic de Catalunya (<https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/meteo-00005#primavera-de-2025>).



A casa nostra, la tardor fou lleugerament més càlida que la mitjana dels anys 1991-2020 i amb precipitacions que es podrien considerar normals. (<https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/meteo-00005#primavera-de-2025>).



Acomiadarem l'any amb uns Nadal i Sant Esteve protagonitzats per un episodi de llevant amb fortes pluges i mar grossa.

Al joc d'esplugabous (*Bubulcus ibis*), del Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es comptaren cent catorze individus durant el cens de gener d'aquàtiques i marines. D'altra banda, el joc de corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*) ha continuat a l'illa, amb un total de catorze individus durant el mateix cens.

Altres espècies escasses a la vall, presents a finals de l'any 2024, continuaren la seva hivernada a primers del 2025. En són exemples el bernat pescaire (*Ardea cinerea*), el martinet blanc (*Egretta garzetta*), el rascló (*Rallus aquaticus*), la fotja comuna (*Fulica atra*) o el becadell comú (*Gallinago gallinago*). Pel que fa a la fotja vulgar, aquest ha estat el catorzè hivern consecutiu en realitzar una vertadera hivernada, localitzada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

L'abocador de Solius ha continuat funcionant com a planta de transferència. Per la qual cosa gavians, corbs, milans negres i altres ocells han continuat veient molt reduïda la seva accessibilitat a les deixalles.

A primers de gener es fa la primera observació a la Vall de **territ fosc** (*Calidris maritima*).

A principis de març es portà a terme una important actuació de desbrossament i retirada de canya comuna (*Arundo donax*) al tram final de la llera del Ridaura.

Durant el mes d'abril es fa la segona citació a la Vall de paràsit cuaample (*Stercorarius pomarinus*) i les cinquenes de xatrac gros (*Hydropogone caspia*) i curroc (*Gelochelidon nilotica*).



Alguns col·laboradors d'aquest anuari tingueren la impressió que el pas migratori primaveral havia estat molt fluix, en comparació amb el d'altres anys. Aquesta percepció es veié confirmada a nivell català per les dades entrades al portal Ornitho.cat, un anàlisi de les quals es pot trobar al següent l'enllaç:

https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=1164&a=N414#FN414

Pel que fa a la cria, per quinzè any consecutiu, l'oca d'Egipte (*Alopochen aegyptiaca*) va niar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro tot i que se'n va frustrar l'èxit. La fotja comuna (*Fulica atra*) tampoc crià aquest any a la Vall. Probablement dues parelles de martinet menut (*Botaurus minutus*) s'hagin reproduït al Parc dels Estanys. Com en anys precedents, una altra espècie escassa que va niar a la Vall, al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys (6 a 7 territoris), és la boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*).

Respecte als rapinyaires diürns, la parella d'àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*), instal·lada al massís de l'Ardenya, aquest any va tornar a treure endavant dos polls. Aquest any es va tornar a constatar la cria amb èxit d'àguila marcenca (*Circaetus gallicus*) amb dos nius situats a les Gavarres dins els límits de la vall del Ridaura. De moment no s'ha portat a terme cap prospecció al massís de l'Ardenya.

En referència a la cornella negra (*Corvus corone*) es tornaren a observar indicis sòlids de cria en lloc i època adients.

Aquest any es tornà a constatar la cria de bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*), espècie ja establerta a la Vall.

També és destacable, la confirmació de l'èxit reproductor de la parella de llúdrigues (*Lutra lutra*) establerta a la Vall.

De finals de primavera i durant l'estiu es va comptar amb la presència continuada de gavina corsa (*Ichthyophaga audouinii*) al port de Sant Feliu de Guíxols, fet inèdit a la Vall. En tot cas, sense senyals de reproducció. També és excepcional el fet que un individu hi romangué fins a primers de desembre.

Es va tornar a comptar amb la presència estival més o menys continuada d'uns pocs individus de martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*), de martinet blanc (*Egretta garzetta*) i de bernat pescaire (*Ardea cinerea*).

A finals de juliol es començà a formar el joc d'esplugabous (*Bubulcus ibis*) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a l'illa del mig.

Per primera vegada a la Vall, s'ha registrat la presència estival d'un individu de segon any de corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*).

Durant la segona quinzena d'agost es fa la cinquena i molt primerenca observació de pigre gris (*Pluvialis squatarola*). A mitjan novembre es fa la primera observació a la Vall de **repicatalons rústic** (*Emberiza rustica*) i la cinquena de verderola (*Emberiza citrinella*). A final d'any, es fa la quarta observació a la Vall de mussol emigrant (*Asio flammeus*).

Com ja va passar durant el pas primaveral, alguns col·laboradors d'aquest anuari tingueren la impressió que el pas migratori de tardor havia estat molt fluix, així com

també el nombre d'ocells hivernants en comparació amb el d'altres anys. Aquesta percepció es veié confirmada a nivell català en revisar les dades de moltes espècies al web OrnithoLlistes (<https://dades.ornitho.cat/llistes>) de l'ICO, que mostren dades clarament per sota de les de la mitjana històrica.



Com a clàssics de cada any, continuen les mostres de manca de civisme dels propietaris de gossos d'una banda i de manca de vigilància per part de l'autoritat municipal tant al Parc dels Estanys de Platja d'Aro com a la bassa del Dofí de l'altra, amb les consegüents molèsties a aus i observadors. També l'embrutiment dels aguaitos d'observació, amb tota mena de deixalles. I activitats esportives prohibides que malmeten el medi natural i provoquen molèsties a la fauna, especialment greus durant

l'estació reproductora.



Per fi, cal remarcar que, a final d'any, l'ajuntament de Castell-Platja d'Aro portà a terme una retirada dels difernets peus de la planta no nativa invasora anomenada plomall de la pampa (*Cortaderia selloana*) que envaïen el Parc dels Estanys.



LLISTAT GENERAL D'OCELLS

Cigne vulgar (*Cygnus olor*). Les seves citacions estan lligades a ocells provinents de captivitat o de centres de recuperació de fauna.

El 8.X, l'individu d'origen domèstic va ser finalment retirat del Parc dels Estanys de Platja d'Aro per traslladar-lo a un lloc segur, a Cassà de la Selva, ja que s'escapava de manera reiterada, posant en perill la seva vida i constituint un risc per la circulació rodada (CAC, MTM, ATX, XTG, VDX, ORX, RMT, DAX, ALM, AMS, JCO, JRY, RCA, NFM, JRG, MAC, JFB, JMX, FLX, AMS, JCJ, BOC, MDX).



Oca d'Egipte (*Alopochen aegyptiaca*). Aquesta espècie constitueix un cas excepcional, ja que es tracta d'una espècie no nativa invasora que causa greus problemes a l'ornitofauna local. En ser molt territorial, impedeix la cria de les altres espècies aquàtiques allà on s'instal·la. La presència continuada a casa nostra començà amb un escapament accidental a finals de 2010. A partir de 2011 s'ha reproduït cada any, amb un màxim de dues parelles. Els últims anys s'han portat a terme diverses accions de retirada del medi d'alguns individus i de destrucció de postes.

Presència hivernal (2024-25) de dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, ATX, XTG, VDX, CMG, JFB, DAX, AMS, NFM).

El 25.II s'observa una còpula de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

L'11.V es destruí una posta de deu ous de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest és el quinzè any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la Vall (CAC, JRG*).



També es detecta a altres llocs de la vall, com la desembocadura del Ridaura i la bassa del Dofí de Castell d'Aro.

El 26.VIII, nou individus en vol, a més de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JFB).

El 2.IX dos individus foragitats per la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Ànec cullerot (*Spatula clypeata*). És un hivernant i migrador escàs, però recentment regular. Les primeres observacions es produeixen la segona quinzena de juliol i es perllonguen fins a mitjans de maig. El 2020 es produí el cas excepcional d'una parella que crià al Parc dels Estanys de Castell-Platja d'Aro. Davant la impotència dels adults, la parella resident d'oca d'Egipte matà els set pollets tan bon punt feren la seva aparició.

Del 16.VIII al 26.VIII, un mascle de primer any a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; del 21.VIII al 29.VIII dues femelles, els dies 30.VIII i 31.VIII una (RMT, CAC*, XTG, JXA, MAC, JFB, JGV, ALM).

El 20.VIII, dues femelles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Ànec griset (*Mareca strepera*). És un migrador i divagant hivernal escàs i irregular. De tota manera, les citacions s'estenen durant tots els mesos de l'any. Dos exemplars passaren l'estiu i mudaren el plomatge al Parc dels Estanys en anys diferents.

El 13.X, un mascle a la desembocadura del Ridaura, que més tard és al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC*).

El 9.XI, quatre individus tipus femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, ALM).



Ànec xiulador (*Mareca penelope*). És un hivernant i migrador, molt escàs i irregular. Detectat de finals de setembre a mitjans de març.

El 22.XI, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC*).



Ànec collverd (*Anas platyrhynchos*). La seva presència no es era habitual a la Vall fins que, després de la creació de la bassa del Dofí, una parella d'adults amb les primàries retallades hi fou alliberada i hi crià. Ara és un resident i nidificant comú. De fet, la xifra rècord assolida durant els censos anuals d'aquàtiques hivernants es produí l'any 2012 amb més de 220 individus.

Aquest any, durant el cens efectuat a mitjan gener es detectà un total de cent cinquanta-un individus (CAC, JFB).

El 17.III, primera llocada a la vall, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

Xarxet (*Anas crecca*). És un hivernant i migrador escàs però regular. Detectat de mitjans de juliol a primers d'abril.

El 31.VIII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).

El 2.IX, no menys de cinc individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 1.X, 2.X, 5.X, 6.X, 13.X, 27.X, 31.X, 22.XI i 23.XI un individu tipus femella, els dies 9.X, 11.X i 12.X dos, el 2.XI tres (CAC, MAC, JFB).

Els dies 2.X, 20.X, 27.X, 1.XI, 2.XI i 24.XI, un individu tipus femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro;

els dies 7.XI, 8.XI, 10.XI, 13.XI, 15.XI, 17.XI i 28.XI un mascle de primer any, probablement el de les altres citacions, ja que començava a mudar les plomes del cap que en delataven el gènere, el 19.XI quatre individus, del 22.XI al 30.XII una parella, el 17.XII només un mascle (CAC*, HMX, JFB, JRG, RMT).

Els dies 17.X, 18.X, 25.X i 26.X, un individu tipus femella al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; el 14.XI un mascle de primer any (CAC).

Els dies 30.X, 6.XI i 13.XI, un individu tipus femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 22.XI quatre individus (CAC, XTG, ALM, NFM).



Xibec (*Netta rufina*). És un migrador esporàdic, detectat entre finals de març i d'agost.

Els dies 31.VIII i 1.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura; vuitena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (RMT*, CAC, ALM).



Morell de cap roig (*Aythya ferina*). És un migrador i divagant estival molt escàs i irregular. Detectat de primers de març a mitjans de novembre.

El 6.IV, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC*, RMT).

El 13.IX, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Bec de serra (*Mergus merganser / serrator*).

El 27.XI, dos individus tipus femella en vol a la desembocadura del Ridaura. L'avistament fou molt ràpid i a contrallum. La posterior aparició, l'1.XII, i presència continuada fins a final d'any de dues femelles adultes de bec de serra gros a l'Estartit i gola del Ter, Baix Empordà, fa pensar que els individus observats a la Vall podrien ser els mateixos. Un altre argument que reforça aquesta hipòtesi és el fet que aquest hivern no s'ha registrat cap observació al portal Ornitho.cat de bec de serra mitjà a les comarques gironines (CAC).

Faisà (*Phasianus colchicus*). Els seus efectius estaven del tot determinats pels alliberaments realitzats pel col·lectiu de caçadors. Hi ha una petita població estable però en regressió concentrada al fons de la Vall, especialment als voltants del Parc dels Estanys.

Del 4.I al 27.II, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, ATX, JFB).

Del 15.IV al 18.V, un mascle canta a prop del Tennis d'Aro (CAC).

Guatlla (*Coturnix coturnix*). La reducció de les zones agrícoles de la Vall i els canvis en la seva gestió han comportat una davallada importantíssima de la presència d'aquesta espècie a casa nostra. Es tracta d'una espècie migradora i estival que, actualment, hi cria de manera molt escassa i irregular. Observada de mitjans d'abril a la segona quinzena d'octubre.

El 13.IV, un individu prop de la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC).

El 26.IV, un individu a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro (CAC).

El 3.V, un individu a Panedes, Llagostera; el 7.V quatre (JSR*).



Perdiu roja (*Alectoris rufa*). És una espècie resident escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l'àrea d'estudi.

El 6.I, quatre individus prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 22.IV, un individu a les Eroles, a Castell d'Aro (CAC).

El 12.VIII, tres individus a Castell d'Aro (JRG).

Enganyapastors (*Caprimulgus europaeus*). És un migrador i nidificant relativament comú, present de la segona quinzena d'abril a la segona d'octubre, amb una data molt tardana del 12.XI.11.

El 10.IX, un individu a Tallades, Santa Cristina d'Aro (JBX).

Ballester (*Tachymarptis melba*). És un migrador i estival relativament comú, observable des de primers de març fins a mitjans d'octubre. Es tracta d'una espècie en expansió a la Vall, on no és fins el 2011 que s'hi va confirmar per primera vegada la cria als contrapesos d'unes grues de construcció.

El 9.III, diversos individus sobre Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any (CAC).

El 19.X, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació de l'any (JBL, CAC).

Falciot negre (*Apus apus*). És un migrador i nidificant comú, observable de mitjans de març fins a mitjans d'octubre. Les noves construccions i les rehabilitacions d'edificis antics tendeixen a eliminar els forats o els espais de nidificació d'aquesta espècie antropòfila, la qual cosa causa una lenta però progressiva davallada de les seves poblacions.

El 22.III, diversos individus sobre Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any (RMT).

El 18.IX, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació de l'any (CAC).

Falciot pàl·lid (*Apus pallidus*). És un migrador i nidificant molt escàs, observable de mitjans de febrer a primers de novembre.

El 15.IV, dos individus a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial (CMG).

L'11.X, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació de l'any (JFB).

Cucut reial (*Clamator glandarius*). És un migrador molt escàs i irregular. Les escasses citacions es distribueixen entre mitjan març i mitjan agost.

El 29.IV, un individu a can Llac de Romanyà de la Selva (AMS).

Cucut (*Cuculus canorus*). És un migrador i reproductor escàs. Detectat des de mitjans de març a finals d'agost. La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys i ha passat de ser comuna a escassa.

El 6.IV, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

L'1.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació de l'any (XTG).

Colom roquer (*Columba livia*). Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la creixent població de la Vall és tota originària d'aus escapades de captivitat. De tant en tant s'observen ocells de competició, anellats i/o marcats amb pigments.

Tudó (*Columba palumbus*). Manté una població resident i sedentària, que es veu fortament incrementada durant els passos migratoris i a l'hivern.

Tórtora de bosc (*Streptopelia turtur*). És una espècie migradora i nidificant escassa i en forta regressió, present de mitjans d'abril a mitjans de setembre.

El 15.IV, un individu al costat de la vinya del mas Candell de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

El 27.VIII, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; última citació postnupcial (JGV).

Tórtora turca (*Streptopelia decaocto*). La primera observació d'aquesta espècie a la nostra Vall es produí el 1984. De llavors ençà s'ha tornat una espècie comuna en àmbits antròpics.

Rascló (*Rallus aquaticus*). És un migrador i hivernant regular, escàs i localitzat. Les primeres citacions es produeixen ja a primers d'agost, tot i que el gros d'arribades es produeixen la primera quinzena de setembre i les darreres citacions hivernals, al final d'abril. Hi ha una dada d'almenys un juvenil amb les primàries encara creixent a la segona quinzena de juny de 2022, la qual cosa en confirma la cria a la Vall, tot i que de manera esporàdica.

El 13.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació prenupcial (CAC).

El 8.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (JRG).

Polla d'aigua (*Gallinula chloropus*). És una espècie resident sedentària, relativament abundant.

El 22.IV, primera llocada a la Vall, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JMA, RMT, JXA, CAC).

Xifres elevades els dies 4.X, 8.X i 23.X, amb no menys de quaranta-cinc, quaranta-sis i cinquanta-quatre individus, respectivament, entre la desembocadura del Ridaura (oberta i amb nivell d'aigua molt baix, 31 - 34 - 41) i el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (14 - 12 - 13) (CAC).

Fotja comuna (*Fulica atra*). Era una espècie migradora i hivernant irregular i molt escassa. Des de l'any 2009 fins al 2015 es converteix en una hivernant escassa i localitzada i del 2010 al 2021, una reproductora escassa i localitzada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura.

El 7.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació prenupcial (CAC).

El 14.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial d'aquesta espècie, que enguany tampoc ha criat a la Vall (CAC).

Grua (*Grus grus*). És una espècie migradora irregular i divagant hivernal molt escassa a la Vall. Durant el pas primaveral es detecta des de mitjans de febrer a mitjans d'abril i durant el de tardor, molt més nombrós, de mitjans d'octubre a novembre. Hi ha citacions hivernals a cavall de desembre i gener.

La nit de l'1 al 2.III, un estol sobre les Eroles, a Castell d'Aro (JRG).

Calàbria grossa (*Gavia immer*).

És un divagant hivernant molt escàs i irregular. Només es té constància de cinc observacions a finals de desembre i de gener.

El 21.I, dos individus davant de la Platja Gran de Platja d'Aro (RMT*).



Cabusset (*Tachybaptus ruficollis*). És un resident i nidificant comú, que nidifica a moltes de les basses de la Vall, algunes de dimensions realment reduïdes. És regular com hivernant i en migració.

Cabussó collnegre (*Podiceps nigricollis*). És un hivernant i migrador molt escàs i irregular. Detectat de la primera quinzena d'agost a primers d'abril.

L'1.I encara els cinc individus davant la desembocadura del Ridaura; els dies 3.I, 5.I i 18.I, sis, el 6.I dos, els dies 7.I, 8.I i 9.I tres, els dies 30.I i 31.I un (CAC*, GAX, MJP, AMS, RMT, NFM, ATX, XTG, XIP).



El 6.XII, s'allibera un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAR).

Flamenc rosat (*Phoenicopterus roseus*). És un migrador i divagant hivernal molt escàs i irregular. Al pas primaveral s'ha detectat al març, al de tardor, de la segona quinzena de juliol a final de novembre. A l'hivern s'ha observat al gener i primers de febrer.

El 7.XII, un individu al mar, en vol costa amunt, davant de Platja d'Aro (JSR).

Torlit (*Burhinus oedicnemus*). És un migrador irregular i divagant hivernal molt escàs. Les citacions obtingudes s'estenen des de la primera quinzena d'octubre a primers d'abril.

El 25.II, un individu a l'escullera del Port d'Aro (ATX*).

El 22.X, un individu en vol sobre el Tennis d'Aro (RMT).



Cames llargues (*Himantopus himantopus*). És una migradora regular, amb presència esporàdica d'exemplars no reproductors durant l'estiu i una única dada de reproducció segura el 2011 i una altra de possible el 2014. Les primeres citacions es produeixen durant la primera quinzena de març, i les darreres durant la primera quinzena de setembre. A finals d'abril de 1995, a la bassa del Dofí, es va llegir l'anella d'un individu que havia estat marcat al Salobrar de Campos, a Mallorca.

El 17.III, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (RMT*).

Els dies 21.III i 2.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 5.IV quatre (RMT, CAC).

Els dies 21.III, 18.V, 7.VI i 22.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 28.III dos, els dies 31.III, 10.IV i 28.V tres, el 2.IV quatre, el 5.IV un estol de dinou individus que no s'acaben d'aturar, el 6.IV onze individus (CAC, LTM, XTG, MAL, JFB, RMT, NFM).

El 13.V, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 29.V, dos individus a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 3.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura; única citació postnupcial (RMT).



Daurada grossa (*Pluvialis apricaria*). Es tracta d'una hivernant molt escassa i irregular, localitzada al pla de Panedes. Detectada entre mitjans de novembre i mitjans de març.

Els dies 5.II i 8.III, quatre individus a Panedes, Llagostera (JSR*).

El 3.XII, quatre individus a Panedes, Llagostera (JSR).



Pigre gris (*Pluvialis squatarola*)

Es tracta migrador esporàdic.

El 17.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; cinquena citació d'aquesta espècie a la Vall (XTG*).



Fredeluga (*Vanellus vanellus*). És una migradora i hivernant regular i localitzada. Detectada de finals de juliol a mitjans de març, tot i que hi ha dues citacions de mitjans d'abril i una altra de juny.

El 12.I, sis individus en vol davant de la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 15.II, quatre individus sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29.III un (CAC, CFQ).

El 27.X un individu sobrevolant la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

El 28.XI, dos individus sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Corriol gros (*Charadrius hiaticula*). És un migrador regular encara que escàs, especialment durant el pas postnupcial, que va de mitjans d'agost a mitjans d'octubre. El pas de primavera s'estén des de la segona quinzena d'abril fins a la segona de maig.

El 21.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC).

El 8.V, fins a catorze individus a la desembocadura del Ridaura; xifra rècord a la Vall.



El 9.V no menys de nou individus, el 10.V tres, els dies 11.V i 12.V cinc, els dies 14.V, 19.V, 21.V, 22.V, 23.V i 24.V un (XTG*, CAC, ALM, ALM, JFB).

Corriol camanegre (*Anarhynchus alexandrinus*) és un migrador esporàdic. Detectat entre finals de març i primers de maig i una única dada postnupcial, a la primera quinzena d'agost.

El 29.III, tres individus a la platja Gran de Platja d'Aro; setena citació d'aquesta espècie que no es citava a la Vall des de 2015 (JCC*).



Batallaire (*Calidris pugnax*). És un migrador esporàdic. Detectat al març, a l'abril i al juliol.

El 8.III, un individu a Panedes, Llagostera (JSR*).



Territ fosc (*Calidris maritima*). **Accidental.** Els dies 3.I, 7.I, 11.I, 12.I, 4.II i 5.II, un individu a l'escollera del Port d'Aro; del 4.I al 6.II dos; nova espècie a la vall del Ridaura, sotmesa a homologació pel CAC (GAX, CAC*, RMT, MJP, AMS, MTM, RAX, NFM, ADY, ATX, XTG, MFX, HMX, MAX, NDX, RPE, FRX, MAC, MBX, MPM, PBC, PCF, XIP, JMA).



Territ becclarg (*Calidris ferruginea*). És un migrador esporàdic

El 30.III, un individu a la desembocadura del Ridaura; espècie que no es citava a la Vall des del 2015 (CAC*).



Territ variant (*Calidris alpina*). És un migrador molt escàs, especialment detectat al pas de tardor, entre primers d'agost i primers de novembre i amb dues úniques citacions primaverals del març i abril; també és un divagant hivernal esporàdic.

Els dies 15.X i 16.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 23.X i 25.X un altre o el mateix (JFB, CAC, MAC, PRR).



Becada (*Scolopax rusticola*). Donat els seus hàbits discrets, és de difícil monitorització. Es tracta d'una espècie hivernant i migradora relativament comuna. Detectada de la segona quinzena d'octubre a primers de març. Hi ha, però, una dada de finals d'abril. La majoria de dades són aportades per caçadors.

L'1.XI, un individu al tram alt del Ridaura (JSR).

El 9.XI, un individu prop del monestir de Solius (ALM).

L'11.XI, dos individus al tram mig del Ridaura (JSR).

El 13.XII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR*).



Becadell sord (*Lymnocyptes minimus*). És un migrador i hivernant molt escàs i localitzat. Detectat des de finals de setembre a la segona quinzena d'abril. El 15.XI, un individu a la bassa de la Costa de l'Alou (CAC).

Becadell comú (*Gallinago gallinago*). És un hivernant i migrador relativament abundant. Les primeres arribades es poden produir ja a finals d'agost, i les darreres citacions primaverals, a la segona quinzena de maig.

Els dies 19.I i 16.II, tres individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 26.I i 28.III (última citació prenupcial) un, els dies 17.II i 10.III dos (CMG, JFB, CAC*, RMT).

El 13.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (CAC).

Els dies 8.XI, 11.XI, 12.XI, 24.XI, 30.XI i 3.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 16.XI i 29.XII quatre, els dies 26.XI i 9.XII dos, els dies 30.XII i 31.XII tres (CAC, RMT, XTG, JRG, LVY).

El 9.XI, dos individus al tram final del Ridaura; el 17.XI un (JFB, CAC).

El 27.XI, un individu a la bassa de la Costa de l'Alou (CAC).

El 13.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).



Xivitona (*Actitis hypoleucos*). És una migradora i hivernant regular, encara que escassa. Tot i que durant l'estació reproductora és molt escassa, s'ha detectat durant tot l'any, excepte la segona quinzena de juny. No hi ha indicis de cria.

El 6.I, un individu al Port d'Aro (RAX). Els dies 7.IV, 20.IV, 9.V i 12.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 18.IV cinc, el 19.IV tres, els dies 30.IV i 2.V sis, els dies 1.V, 8.V i 10.V almenys dos, l'11.V nou (CAC, NFM, RMT, JFB, MAC, XTG, ALM).

Els dies 16.IV, 17.IV, 18.IV, 27.IV, 1.V, 9.V, 10.V, 14.V, 18.V i 19.V (última citació prenupcial), un individu a la desembocadura del Ridaura; el 30.IV cinc, els dies 1.V, 11.V i 17.V dos, el 12.V tres (RMT, CAC, MAC, JFB, MLY, ALM, XTG).

Els dies 26.IV, 27.IV, 10.V i 12.V, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; l'11.V dos (CAC, JFB, XTG).

Els dies 4.VII (primera citació postnupcial), 2.VIII, 12.VIII, 20.VIII, 30.VIII i 11.IX, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 12.VII,



20.VII, 22.VII, 30.VII, 6.VIII, 13.VIII, 14.VIII, 17.VIII, 22.VIII, 23.VIII, 29.VIII, 1.IX, 2.IX, 3.IX, 8.IX, 9.IX, 10.IX i 12.IX un, el 5.IX tres (MAC, CAC, JCC, XCX, NFM, XTG, JPC).

Els dies 11.VII, 31.VII, 1.VIII, 20.VIII, 22.VIII, 23.VIII, 24.VIII, 26.VIII, 28.VIII, 9.IX i 11.IX, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 21.VIII, 25.VIII i 29.VIII dos (CAC*, XTG, RMT, JFB, MAC).

El 28.VII, dos individus a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Els dies 2.VIII, 2.IX, 5.IX, 6.IX, 11.IX, 13.IX, 14.IX, 17.IX, 18.IX i 24.XI (última citació postnupcial), un individu a la desembocadura del Ridaura: el 3.IX dos (CAC, RMT, JPC).

Xivita (*Tringa ochropus*). És una migradora regular; a l'hivern pot aparèixer algun ocell divagant i, fins i tot, algun vertader hivernant i, a l'estiu, algun ocell no reproductor. Aquests fets dificulten establir els vertaders espais temporals dels passos migratoris. El pas de primavera sembla que s'estén de la segona quinzena de febrer fins a primers de maig. Durant el de tardor es comença a veure algun exemplar a mitjans de juny i es perllonga fins a la segona quinzena d'octubre.

Els dies 16.II, 2.III, 17.III, 29.III, 3.IV i 11.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 28.III quatre, el 10.IV dos, els dies 19.IV i 30.IV tres (CAC, RMT, XTG, NFM, MAC).

Els dies 7.III, 9.III, 13.III, 30.III, 31.III, 2.IV, 3.IV, 4.IV, 5.IV, 6.IV, 7.IV i 11.IV, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 16.III tres (CAC, NFM, XTG).

El 2.IV, un individu és a la desembocadura del Ridaura (MAL).

L'11.IV, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 23.IV, dos individus a la bassa de can Puig de Sant Llorenç, a Llagostera; última citació pre-nupcial (CAC).

El 17.VI, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació post-nupcial (JSR).

Els dies 22.VI, 4.VII, 16.VII, 20.VII, 25.VII, 3.VIII, 19.VIII, 21.VIII, 23.VIII, 29.VIII, 31.VIII, 4.IX, 12.IX i 3.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 23.VI, cinc, els dies 26.VII, 4.VIII i 18.VIII tres, els dies 29.VII i 28.VIII dos, el 22.VIII sis (CAC, JFB, NFM, XTG, JCC, MAC, MAL).

El 26.VI, un individu a la bassa de can Llauredor, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 8.VII, 27.VII i 4.VIII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC*, NFM).

Els dies 31.VIII, 22.XI i 27.XI, un individu a la bassa de la costa de l'Alou (CAC).

Els dies 5.IX i 11.X, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera (CAC).

El 23.X, un individu a la bassa de Sant Llorenç, Llagostera (CAC).



Gamba roja vulgar (*Tringa totanus*). És una migradora escassa però regular. Detectada de la primera quinzena de març a primers de juny i de la segona quinzena de juny fins a la primera de setembre.

Els dies 30.III i del 16.V al 22.V, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 19.V dos (CAC*, JFB, XTG).



Valona (*Tringa glareola*). És una migradora regular. El pas de primavera va de primers de març a mitjans de maig. Al de tardor es comença a veure algun exemplar a primers de juliol i es perllonga fins a primers d'octubre.

Els dies 1.IV, 7.IV i 8.IV, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Gamba verda (*Tringa nebularia*). És una migradora escassa però regular. El pas de primavera abraça l'abril i la primera quinzena de maig i, el de tardor, de la segona quinzena de juliol a mitjans d'octubre.

El 23.VIII, un individu en vol sobre S'Agaró (EBX).

Gavina riallera (*Chroicocephalus ridibundus*). És una migradora abundant i una hivernant comuna i regular. Detectada de mitjans de juny a finals d'abril, amb dades d'immadurs de finals de maig.

Del 13.I al 3.III, a la desembocadura del Ridaura, un individu anellat (NK15) a l'abocador de Botarell, Tarragona, el març de 2021, que ja s'havia observat a Platja d'Aro a finals de febrer i principis de març de 2023 (CAC*, XTG, RMT, XIP). El 3.XII es localitza al port de Sant Feliu de Guíxols (RMT). Els dies 9.XII, 23.XII i 27.XII, és a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC, RMT).





El 17.I, un individu anellat amb anella vermella de lectura a distància (HT9G), a la platja Gran de Platja d'Aro; ocell anellat a Sárbogárd, Hongria (a uns 1.358 km en línia recta), com a poll el 30.V.2015 i ja controlat els mesos de gener i desembre de 2021 a Palamós i a Calonge (XTG*, RMT).

El 16.III uns cinc-cents individus a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC)

El 25.VI, un individu a les defenses del port de Sant Feliu

de Guíxols; primera citació post-nupcial (CAC).

El 36.XII, un individu anellat amb anella de lectura a distància (EY8H), a la platja Gran de Platja d'Aro; ocell marcat el 2023, a Beers NB, als Països Baixos (a uns 1.124 km en línia recta), i que ja havia estat observat diverses vegades a Palamós els anys 2023 i 2025 (CAC*).



Gavina menuda (*Hydrocoloeus minutus*). És una migradora comuna, especialment a la primavera, i divagant hivernant irregular i escassa. Les observacions s'han fet de primers de novembre a primers de maig.

El 9.III, uns cent quaranta individus davant de la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 22.III, no menys de quinze individus davant de la desembocadura del Ridaura (RMT).

Gavina corsa (*Ichthyaetus audouinii*). És una migradora regular i escassa i una divagant estival. Totes les observacions s'han fet entre primers de març i primers de desembre. La lectura d'anelles a distància ha permès saber que els individus anellats provenien majoritàriament dels deltes de l'Ebre i del Llobregat i dels ports de Barcelona i de Tarragona.

El 8.III, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 19.III, 23.III i 29.IV, dos individus al port de Sant Feliu de Guíxols; els dies 22.III i 14.V un (RMT, CAC).

El 22.III, quatre individus davant de la desembocadura del Ridaura; el 30.IV un (RMT).

El 29.III, dos individus a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Els dies 6.IV i 29.IV, tres individus davant Pot Salvi, a Sant Feliu de Guíxols; el 14.IV un, el 8.V quatre (CAC, RMT).

El 9.IV, un individu a prop de la punta de ses Mongetes de Sant Feliu de Guíxols (PAB).

El 10.IV, cinc individus entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar, dos d'ells anellats (CM62 i CM5Y), el 2021, un al port i l'altre a la Zona Franca de Barcelona (JBL, CTX).

El 27.IV, un individu a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols, anellat (CSJ0) com a poll, el 14.VI.20, al Prat de Llobregat (RMT).

L'1.VI, dos individus entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar (JSR).


El 4.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 12.VI dos (CAC).

El 6.VI, dos individus a Canyet (ADZ).

El 7.VI, un individu a les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols (ADZ).

El 27.VIII, un individu a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

Episodi de presència estival regular i amb xifres inusuals al port de Sant Feliu de Guíxols. Des del 23.V al 2.VIII, s'ha fet un total de 222 avistaments, tots els individus en plomatge de sub-adult o adult. Les xifres màximes s'assoliren els dies 20.VI amb 22 individus, el 23.VI amb 18 i el 25.VI amb 15. D'aquest total de 222 d'avistaments, 92 correspongueren a 34 individus anellats diferents. Si als 130 avistaments d'ocells no anellats s'aplica la mateixa taxa de repetició dels ocells anellats, podria ser que correspongueren a uns 48 individus diferents, per un total estimat de 82 ocells diferents.



Els ocells anellats ho havien estat com a polls: 26 a Barcelona (port i Zona Franca), 7 al port de Tarragona i 1 a Castelló de la Plana; 2 el 2018, 5 el 2019, 1 el 2020, 10 el

2021, 11 el 2022 i 5 el 2023. Malgrat que s'ha buscat, no s'ha trobat cap punt de reproducció proper i tampoc s'ha observat cap ocell en plomatge juvenil, nascut aquest any.

Un individu no anellat romangué (un segon el 18.IX) al port de Sant Feliu de Guíxols fins el 5.XII, data molt tardana per l'espècie. (CAC*, RMT, XTG, MAC).

Gavina capnegra (*Ichthyæetus melanocephalus*). És una migradora i hivernant regular i escassa. Detectada des de la segona quinzena de juliol a la segona quinzena de maig. El 22 de maig de 2023 se'n va fer una observació excepcional per un estol d'uns 300 individus sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

El 6.I, dos individus a prop del Port d'Aro; els dies 8.I, 17.I, 26.I i 28.I un (RMT, NFM, XTG, CAC, PCF).

Els dies 10.I, 28.III, 10.IV, 16.IV, 17.IV, 18.IV i 26.IV dos individus de segon any a la desembocadura del Ridaura; el 16.III dotze, els dies 17.III un adult, del 22.III al 28.IV un individu de segon any, coix, el 29.III vuit individus de segon any, els dies 30.III i 3.IV quatre, el 31.III, un adult i dos individus de segon any, els dies 4.IV, 5.IV, 14.IV, 15.IV, 19.IV, 20.IV, 25.IV i 28.IV (última citació prenupcial) tres individus de segon any, el 6.IV cinc individus de segon any, els dies 22.IV i 23.IV un individu de segon any (XTG, RCA, CAC, RMT, JCC, MAL, JFB).



El 20.III, trenta-set individus davant de la desembocadura del Ridaura; el 22.III no menys de cinquanta-cinc (RMT).

El 23.III, tres individus davant del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 14.IV, quatre individus davant Pot Salvi, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 19.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (FLX).

El 23.VII, un adult a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 28.VII i 31.VII, un individu a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols; el 18.IX un primer any (CAC, XTG).

Els dies 20.XI i del 3.XII al 30.XII, un individu adult al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC*, RMT).

El 10.XII, un adult a la desembocadura del Ridaura; el 23.XII, vuit individus, dels que set eren adults (CAC).

L'abocador de Solius, lloc de concentració alimentària de les espècies de gavians (*Larus* sp.), continuà funcionant només com a planta de transferència. La limitació de l'accés a aquesta font d'aliment comporta una forta davallada del nombre d'efectius de les diferents espècies presents a la Vall, la qual cosa aconsella prendre amb precaució les dades d'abundància i presència d'aquestes espècies, en espera de veure com evoluciona la seva situació.

Gavià argentat (*Larus michahellis*). És present durant tot l'any i és un nidificant abundant. Les quasi 16.000 lectures d'anelles a distància han permès saber l'origen dels individus anellats. S'han observat ocells de les Illes Medes, de tota la costa mediterrània francesa, del golf de Gènova, de l'Adriàtic, de prop de Venècia, de Sardenya, d'Algèria, de Múrcia, de les Illes Balears, dels Columbrets, del delta de

l'Ebre i de Barcelona. Es coneixen tres citacions de la raça cantàbrica (*Larus michahellis* "lusitanius") de mitjan desembre, primers de gener i de mitjans de març, d'ocells marcats com a polls, amb anella de lectura a distància, a Sant Sebastià i Gijón.

El 30.V, un individu a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols, marcat amb anella negra (G:ATW), marcat a Pasaia, Guipúscoa, encara que no nascut allà (CAC*).



El 7.VI, primers polls volanders, a Platja d'Aro i a Sant Feliu de Guíxols (SJA, CAC).

Els dies 9.VII i 14.VII, un individu de primer any a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols, marcat amb anella verda (30X:C), marcat, essent un poll, a Carteau - Port-Saint-Louis-du-rhône - Bouches-du-Rhône, França, el 15.V.25 (CAC*).



Gavià fosc (*Larus fuscus*). És un hivernant i migrador escàs, i regular i estival en petit nombre. És observable tot l'any en petit nombre a la costa i, sobretot, a l'abocador de Solius. Els màxims es produeixen durant els passos migratoris als mesos d'octubre i de març i abril; els mínims es donen entre la fi del pas prenupcial i la dispersió postnupcial, al període maig-juliol. Les subespècies habitualment observades són: *L. f. graellsii* i *L. f. intermedius*. De tota manera, disposem d'una única citació homologada de primers d'agost d'un individu de l'espècie nominal (*L. f. fuscus*) anellat com a juvenil a Finlàndia. Aquesta és l'única citació d'aquesta rara subespècie homologada a Catalunya. A part d'aquesta, hi ha una observació, ben documentada amb imatges, d'un ocell adult nascut i anellat a Noruega com a pertanyent a aquesta subespècie, però les característiques de l'ocell no s'hi acaben d'ajustar.

Paràsit cuaample (*Stercorarius pomarinus*). Probablement es tracti d'un migrador regular, encara que molt escàs, mar endins.

El 6.IV, un individu de fase clara, costa avall, davant de Port Salvi, a Sant Feliu de Guíxols; segona citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (CAC).

Curroc (*Gelochelidon nilotica*). Estatut: migrador irregular.

El 29.IV, set individus davant Pot Salvi, a Sant Feliu de Guíxols; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (RMT).

Xatrac gros (*Hydroprogne caspia*). Probablement es tracti d'un migrador regular, encara que molt escàs, mar endins.

El 13.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (CAC*).



Fumarell carablanc (*Chlidonias hybrida*). És un migrador irregular, detectat entre finals de març i la primera quinzena de setembre.

El 22.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 4.VII dos (CAC*, JFB, MAC, XTG).



Xatrac beclarg (*Thalasseus sandvicensis*). És un migrador i hivernant regular. Detectat tots els mesos de l'any, però amb dades comptades de maig a juliol.

El 18.I, no menys de quaranta-set individus a la platja Gran de Platja d'Aro. Un d'ells anellat amb anella groga de lectura a distància (M96), a la Punta del Fangar, al delta de l'Ebre, quan era un poll, el 9.VII.24 (XTG*).

El 19.IV, quatre individus davant la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; última citació prenupcial (RMT).

El 24.VII, un individu davant de la desembocadura del Ridaura;



primera citació postnupcial (CAC).

Baldriga cendrosa (*Calonectris diomedea*). És una migradora regular, escassa a l'estiu. Detectada de mitjan març a finals de novembre.

El 22.III, no menys de 75 individus davant la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (RMT).

Baldriga mediterrània (*Puffinus yelkouan*). És comuna durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escassa a l'estiu. La subespècie baldriga balear (*P. y. mauretanicus*) és comuna durant els passos migratoris i a l'hivern. Detectada de la segona quinzena de setembre a mitjans de juny.

Cigonya blanca (*Ciconia ciconia*). És una espècie migradora escassa i regular a la Vall, tot i que, determinats anys, pot ser abundant, especialment als mesos d'agost i setembre. Detectada de finals de gener a primers de juny i de primers de juliol a finals de novembre. El 2009-2010, dos individus procedents d'un projecte de reintroducció a Gallecs van hivernar a la Vall. Les lectures d'anelles a distància ens han permès conèixer l'origen de moltes de les cigonyes blanques que han passat per la Vall: Alemanya, França, Suïssa, Bèlgica i l'estat espanyol.

El 18.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ECP).

Els dies 24.VIII i 25.VIII, dos individus a un camp proper a Castell d'Aro (JRD, ECP, CAC*, JFB, JRG, XTG).

Del 27.XI al 31.XII, un individu als magatzems de la Brigada municipal i rodalies, a Castell d'Aro (LCY, CAC, JRG).



Mascarell (*Morus bassanus*). És relativament comú durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escàs a l'estiu, estació durant la qual només s'observen exemplars immadurs.

El 14.V, almenys un individu davant de Sant Feliu de Guíxols; última citació prenupcial (RMT).

El 23.VI, set immadurs davant de Sant Feliu de Guíxols; els dies 3.VII i 14.VII, almenys un (RMT, CAC).

L'1.XI, un individu davant de la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (CAC).

Corb marí gros (*Phalacrocorax carbo sinensis*). És una espècie abundant durant l'hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra des de final de juliol a primers de maig, amb algun tocatardà immadur fins a final d'aquest mes i principis de juny. La lectura d'anelles a distància ens ha permès conèixer l'origen d'alguns dels ocells d'aquesta espècie: Estònia, Dinamarca i Suïssa. Un dels ocells danesos va ser detectat a la Vall diversos hiverns entre el gener de 2006 i el febrer del 2014.

Aquest any, durant el cens efectuat a mitjan gener només es detectà un total de disset individus (CAC, RMT, JRG, MAL).

Un individu de segon any roman al Parc dels Estanys de Platja d'Aro fins el 7.VIII, protagonitzant una estada estival inèdita a la Vall (CAC*).

El 2.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).



Corb marí emplomallat (*Gulosus aristotelis desmarestii*). Tenim una petita població reproductora, que augmenta amb l'arribada d'ocells procedents, fonamentalment, de les Illes Balears, un cop finalitzada l'estació reproductora.

El 10.I, al Port d'Aro, s'observa un individu anellat (K69) a Arenys de Mar, el 2019 (XTG*).

Aquest any s'ha detectat quatre nius. Dos a prop de la cova de les Rates penades, un amb dos polls i l'altre abandonat. Dos nius més a la cala del Molí, un amb un poll i l'altre amb dos (JBL).

Els dies 10.XI i 24.XI, al port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un individu anellat (K19) a Calella, el 2018. (RMT)

El 23.XI, un individu de primer any mort (anellat V86) en aigües de la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols (MMX).



Capó reial (*Plegadis falcinellus*). Ha passat de ser un migrador esporàdic a ser regular, cada vegada més freqüent. Detectat entre la primera quinzena de gener a primers d'octubre. En tot cas, el gros dels passos migratoris es concentren al febrer-març i entre mitjan juny i mitjan agost.

El 9.III, un estol de no menys de vuitanta-quatre individus en vol, costa amunt, davant de la desembocadura del Ridaura; el 10.III un altre d'una trentena d'individus (NFM, CAC).

El 9.III, un estol de quaranta-un



individus en vol, costa amunt, davant de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 17.III i 31.III, no menys de vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 18.III, onze, del 20.III al 30.III dotze, l'1.IV dos, el 2.IV quatre, el 6.IV tres, els dies 10.IV i 7.V un (RMT, NFM, CAC*, XTG).

Els dies 2.IV, 3.IV, 5.IV i 7.IV, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 4.IV, 23.IV i 24.IV tres, els dies 6.IV, 18.IV, 20.IV, 21.IV i del 6.V a l'11.V (última citació prenupcial) un, el 12.IV set (CAC, MAL, RMT, MAC, SJA, XTG, ALM).

Els dies 28.VII (primera citació post-nupcial), 1.IX, 3.IX, 10.IX i 20.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, ALM, RMT, LTA, XTG).

Els dies 23.VIII, 4.IX i 5.X, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Becplaner (*Platalea leucorodia*). És un migrador esporàdic a la Vall. Comptem amb set observacions de final de març a finals de maig, i una a finals d'agost i una altra a primers de novembre. Un dels ocells observat durant el pas primaveral era originari de la Camarga, a França.

Els dies 29.III i 30.III, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, un individu nascut i marcat (AJZN) el 2014 a la Camarga, França; vuitena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (CAC*, JFB, JCC)

El 24.V, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Martinet menut (*Botaurus minutus*). És un migrador molt escàs i irregular, present, sobretot, durant el pas prenupcial. S'ha detectat des de primers d'abril a mitjans d'octubre amb una dada de mitjans de novembre i una altra de la primera quinzena de desembre; aquestes citacions semblen indicar la hivernada d'aquest exemplar. També durant l'època de reproducció, ja que, recentment, s'ha confirmat la cria d'almenys una parella, diversos anys, al Parc dels Estanys.

El 27.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació prenupcial (CAC). Des de llavors, fins el 14.IX presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura, amb màxims de quatre individus adults els dies 12.VI i el 15.VI (MAL, CAC, JCC, ALM, RMT, MAC, JFB, XTG, NFM, JMX, EFX, FLX, JSC, JCC, AMS, ATX, BOC, JPC).



El 8.V, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (XTG).

El 30.VI, primer poll volander al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC*).

Martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*). És escàs però regular, sobretot durant els passos migratoris. Normalment comptem amb la presència d'alguns ocells estivals no reproductors. Detectat de febrer i la primera quinzena d'octubre.

El 9.II, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i molt primerenca citació de l'any (XTG).

Del 15.II al 13.X, presència regular al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim d'onze individus el 10.IV durant el pas primaveral i de trenta-vuit individus el 6.IX en el pas de tardor, xifra rècord a la Vall (CAC*, CFQ, JRY, XTG, NFM, MAC, JCC, JFB, ATX, RMT, ABX).

L'1.V, un estol de catorze individus a S'Agaró (AMP).



Martinet ros (*Ardeola ralloides*). És escàs però regular, sobretot durant els passos migratoris. Alguns anys disposem de la presència estival esporàdica d'algun ocell no reproductor. Detectat des de primers d'abril a primers d'octubre.

El 14.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC*).

El 22.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 8.VI, un individu a S'Agaró (SAX).

El 22.VI, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JFB, JMX).

El 8.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; única citació postnupcial (XTG).



Esplugabous (*Ardea ibis*). És un hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les condicions de determinats indrets. Hi ha observacions de tot l'any, tot i que escasseja molt durant l'època reproductora. Un joc hivernal establert al Parc dels Estanys de Platja d'Aro des de 2010, acull màxims entre 200 i 400 exemplars.

Aquest any, durant el cens efectuat a mitjan gener es detectà un total de cent catorze individus (CAC).


El 27.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació pre-nupcial (JFB).

L'1.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (XTG).

Bernat pescaire (*Ardea cinerea*). És un migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors durant l'època de cria.

Presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura, amb màxims de quinze individus el 9.IV durant el pas primaveral i deu el 26.VIII durant el de tardor.

(CAC, MTM, ATX, XTG, VDX, RMT, JFB, AMS, ALM, JCO, JRY, NFM, MAC, JSC, JCC, AMS, LTB, JBL, MAL, OCY, JVM, LVY, ACY).



Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2025).

El 26.I, l'individu nascut i marcat (WC4) el 2016 a la Comunitat Valenciana s'observa per

última vegada aquest hivern al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 9.I, un individu prop del mas Candell, a Platja d'Aro (ATX).

Els dies 21.II i 6.III, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG, CAC).

El 27.VII, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

Els dies 29.VII, 31.VII, 6.IX, 11.X, 23.X, 24.X, 25.X, 27.X, 28.X, 30.X, 3.XI, 6.XI, 8.XI, 9.XI, 10.XI, 14.XI, 15.XI, 16.XI, 17.XI, 20.XI, 23.XI, 24.XI, 28.XI, 30.XI, 1.XII, 4.XII i 6.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 31.X dos (CFQ, XTG, NFM, CAC, MAC, JFB, JCO, RCA).

El 21.VIII, un individu sobrevola Panedes, Llagostera (CAC).

El 2.X, un individu a la bassa de can Puig de Sant Llorenç, Llagostera (CAC).

L'11.X, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera (CAC).

Els dies 16.X, 20.X i 26.X, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 21.X, l'individu nascut i marcat (WC4) el 2016 a la Comunitat Valenciana torna, per desè hivern consecutiu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i s'hi està almenys fins a final d'any. Una consulta al portal de la *Oficina de Anillamiento de la Estación Biológica de Doñana*, que és qui gestiona aquests anellaments, ha permès saber que aquest ocell havia estat observat a la colònia de naixença el 15.III.24, on probablement torna a reproduir-se (RMT, CAC*, XTG).



El 13.XII, dos individus a Santa Cristina d'Aro (RMT).

Agró roig (*Ardea purpurea*). És un migrador escàs i regular, sobretot durant el pas prenupcial, que comença a finals de març. Comptem amb la presència estival esporàdica d'algun ocell no reproductor. El pas de tardor es perllonga fins a primers d'octubre.

El 22.III, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC, CFQ, NFM).

Els dies 24.III, 6.IV, 7.IV, 12.IV, 14.IV, 20.IV, 23.IV, 10.V, 11.V, 12.V, 17.V, 19.V, 22.V, 25.V, 28.V i 29.V (última citació prenupcial) un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 5.IV, 10.IV, 11.IV, 27.IV, 28.IV, 8.V i 16.V dos, el 19.IV quatre, el 24.V tres (CAC, NFM, MAC, JFB, RMT).

Els dies 16.VI (primera citació postnupcial), 9.VII i 17.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 26.VIII dos (MAC*, XTG, CAC, JFB).

El 17.VII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 8.IX, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (XTG).



Agró blanc (*Ardea alba*). Es pot afirmar que és una espècie en expansió i ja es tracta d'un migrador regular, encara que escàs. La primera observació d'aquesta espècie no es va produir fins el 2005. Detectat tots els mesos de l'any però, especialment, en els passos migratoris: de la segona quinzena de febrer a la primera de maig i de la segona quinzena d'agost a primers de novembre. A l'hivern i a l'estiu és un divagant molt escàs. A l'agost del 2017 es va detectar un ocell que havia estat marcat amb anella llegible a distància a Hongria.

Els dies 17.III, 27.III, 31.III, del 3.IV al 5.VI (estada molt llarga d'aquest individu immadur) i els dies 27.V i 13.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 29.III i 30.III tres, els dies 2.IV i 15.IV dos (CAC*, XTG, JFB, RMT, JFB).

El 30.IX(primera citació postnupcial), sis individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).


El 5.X, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Els dies 9.XI i 23.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, ALM, JFB).



Martinet blanc (*Egretta garzetta*). És un migrador i hivernant escàs i regular. De manera irregular, hi ha alguns ocells no reproductors durant l'època de cria. El 1992 es va controlar un individu nascut i marcat a la Camarga, a França. Presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura, amb màxims de disset individus sobre la desembocadura del Ridaura, el 25.V, en el pas de primavera i setze individus, el 4.IX, també a la desembocadura del Ridaura

(CAC*, MTM, XTG, VDX, RMT, JFB, ATX, ALM, AMS, JCO, JRY, NFM, MAL, MAC, FLX, JSC, JCC, AMS, LTB, XCX, BOC, JCJ, OCY, ACY).



Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2025).

Els dies 5.I, 6.X i 24.X, dos individus al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; els dies 22.III, 4.X, 5.X, 17.X, 18.X, 20.X, 23.X, 25.X i 27.X un (CAC).

Els dies 5.I, 6.I, 8.I, 10.I i 11.I, un individu al Port d'Aro; el 7.I tres (RMT, NFM, ADY, XTG, PBC).

Els dies 8.I i 19.I, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 9.I, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 18.IV un la sobrevola (CAC).

Els dies 16.I i 19.I, un individu a la punta d'en Pau, a S'Agaró (CAC, RMT).

Els dies 11.IV i 23.XI, un individu al Ridaura, al passallís de can Bada (CAC).

El 14.IV, un individu davant Port Salvi, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 4.V, un individu al camí de ronda de S'Agaró (MCS).

Els dies 10.VIII, 25.IX i 25.X, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 12.VIII, 13.VIII, 14.VIII, 17.VIII, 18.VIII, 19.VIII, 20.VIII, 21.VIII, 22.VIII, 23.VIII, 26.VIII, 1.IX, 2.IX, 13.IX, 17.IX, 18.IX, 22.X, 27.IX, 31.X, 23.XI, 8.XII i 26.XII un, els dies 24.VIII i 25.VIII quatre, el 27.VIII tres (CAC, JRG, MAC, RMT, JFB, JGV, BOC, XTG).

Els dies 25.VIII, 31.VIII, 15.IX i 19.IX, un individu a l'escullera del Port d'Aro (CAC).

El 27.VIII, un individu a S'Agaró (JFB).

Els dies 20.IX, 26.IX, 10.X, 27.X, 2.XI, 8.XI, 9.XI i 20.XII, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC, RMT).

El 8.X, un individu a la Conca (MAC).

El 12.X, dos individus a S'Agaró; els dies 25.X i 12.XII un (JFB, MAC).

El 28.X, un individu al Ridaura, al passallís de can Bada (XCY).



El 24.XI, un individu a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols (SNX).

El 5.XII, un individu a la platja dels banys de S'Agaró (CAC).

Els dies 8.XII i 24.XII, un individu al Port d'Aro (CAC).

El 8.XII, un individu al S'Adolix, Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Àguila marcenca (*Circaetus gallicus*). És una espècie estival i migradora regular, encara que escassa. Present des de finals de febrer a la segona quinzena de setembre, amb una citació de mitjans d'octubre. Malgrat les sospites i les observacions de vols nupcials en època reproductora, no es va arribat a confirmar la cria a la Vall fins el 2024.

El 26.II, dos individus sobre Castell d'Aro; primera citació pre-nupcial (JBL).

Aquest any s'ha tornat a confirmar la cria amb èxit als dos nius ocupats a les Gavarres sud-orientals, al terme de Santa Cristina d'Aro. El 12.III ja estan fixades als nius o als territoris de cria. El 12.IV s'observa una còpula a un dels nius. 16.IV s'observa una femella incubant en un dels dos nius. Els dos polls han reeixit (JRG, RMT, AMS, AMX, JBL).

Els dies 31.X i 4.XI, un individu a cavall dels termes de Santa Cristina d'Aro i Castell d'Aro; últimes citacions post-nupcials (JBL).

Àguila calçada (*Hieraaetus pennatus*). És una migradora regular, encara que escassa, durant el pas de tardor i molt escassa al de primavera. Del pas primaveral tenim tres úniques dades, d'abril a començament de maig. Al pas de tardor, de mitjans d'agost a primers de novembre, amb màxims concentrats la primera quinzena d'octubre. Durant el pas de tardor, la majoria d'exemplars s'observen en migració "indirecta", és a dir, en direcció nord. Sembla que la causa d'aquest fenomen, també observat en altres punts, és que alguns exemplars ibèrics creuen el Mediterrani per Itàlia, on arriben seguint la línia de la costa (Premuda i altres, 2007). També s'ha detectat la presència d'algun divagant hivernal i, fins i tot, d'una vertadera hivernada d'una parella, el 2018-19.

El 10.IX, un individu de fase clara sobre Castell d'Aro (JBL).

Àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*). Era una espècie divagant molt irregular i escassa. Fins el 2012, la majoria d'ocells observats eren immadurs. El 2012 però, es va detectar una parella jove en hàbitat i època adequats per a la reproducció i el 2013 es produí el primer intent de reproducció a la zona, intent que fracassà a causa de les molèsties ocasionades per la presència humana, massa a prop del niu. L'episodi es repeteix el 2014. Per fi, el 2015 neix el primer poll a la Vall. De llavors ençà, la parella ha tingut èxit reproductiu cada temporada de cria. La lectura de les anelles llegibles a distància ens ha permès saber que la femella és nascuda al sud de França i el mascle a Catalunya, lluny, però, de la demarcació de Girona. Un dels polls, nascut el 2018 i sexat com a mascle, s'ha establert com a reproductor a l'Alt Empordà.

Aquest any, la parella resident a l'Ardenya torna a treure endavant dos polls (JBL).

Esparver (*Accipiter nisus*). Si bé és un migrador regular i un hivernant comú, és una espècie molt escassa com a sedentària. No se n'ha comprovat la cria a la Vall. De fet, les dades del període estival (mitjans de juny a mitjans d'agost) són molt escasses.

Els dies 4.I, 6.II, 9.II, 25.II, 19.III i 1.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ATX, CAC, XTG).

Els dies 11.I, 9.II, 22.II, 28.III i 1.IV un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, JFB, RPE, XTG).

El 16.I, un individu al puig Pinell (ATX).

Els dies 8.II, 15.II i 2.IV, un individu a Panedes, Llagostera (JSR, CAC).

El 22.III, un individu a cal Ralet, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 2.IV, un individu prop de Solius (JSR).

El 6.IV (última citació pre-nupcial), un individu a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro (CAC*).

El 3.IX (primera citació post-nupcial), un individu a Panedes, Llagostera; l'1.XII tres (JSR).

El 7.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

L'11.XI, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 21.XI, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (CAC).

Els dies 22.XI, 4.XII i 26.XII un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 8.XII, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols, direcció el Salvament (CAC).

El 25.XII, un individu a prop de Sant Amanç, Sant Feliu de Guíxols (EPB).



Astor (*Astur gentilis*). És sedentari. No és fins el 2013 que se'n va constatar la cria a la Vall, en trobar un niu de l'any anterior i en ser ocupat aquest mateix any. El major nombre d'observacions es fa els mesos de novembre i desembre.

Els dies 19.I, 24.I i 6.II, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RAI, ALM, ATX, ORX, XTG, CAC).

El 7.VIII, es localitza un nou niu a cavall dels termes de Castell d'Aro i Santa Cristina d'Aro amb polls ja volanders. La resta de territoris coneguts no han estat prospectats (JBL).

Els dies 9.VII, 16.VIII, 7.IX i 28.XII, un individu a Panedes, a Llagostera; el 22.VIII tres (JSR).

Els dies 17.XI i 17.XII, un individu captura un esplugabous al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC*, RMT).



Arpella comuna (*Circus aeruginosus*). És una migradora escassa però regular. El pas de primavera s'estén des de la segona quinzena de febrer fins a final de maig; el de tardor comença a mitjans d'agost i es perllonga fins a mitjans de



novembre. Es pot arribar a observar algun divagant hivernal.

El 15.III, dos individus a Panedes, Llagostera; el 7.V una femella (JSR*).

Els dies 16.III i 29.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 29.VIII, un mascle a Panedes, Llagostera (JCO).

Els dies 4.IX, 7.IX, 13.IX i 20.IX, un individu a Panedes, Llagostera; el 9.IX tres (JSR).

Milà negre (*Milvus migrans*). Fins enguany ha estat un migrador abundant que, en determinats moments, pot presentar elevades concentracions. S'ha arribat a comprovar la nidificació d'almenys tres parelles prop de l'abocador de Solius i, d'almenys una, al pla de Panedes. Present des de finals de febrer fins a finals de setembre i, ocasionalment, a primers d'octubre. Esporàdicament es pot observar algun divagant hivernal. Amb la recent clausura de l'abocador de Solius, lloc de concentració alimentària d'aquesta espècie, veurem com evoluciona la població de la Vall.

El 7.III, un individu a la costa de l'Alou; primera citació de l'any (JSR).

Milà reial (*Milvus milvus*).

Migrador regular, encara que cada vegada més escàs. Detectat al pas de primavera de la segona quinzena de març a la primera de maig i al de tardor, a l'octubre i novembre. Puntualment, també s'observa algun divagant hivernal.

El 9.X, un individu al Pla d'en Tapioles, a Santa Cristina d'Aro (XVG).

L'11.X, un individu a Llagostera; en direcció a l'Ardenya (JSR*).



Aligot comú (*Buteo buteo*). És una espècie amb una petita població sedentària que augmenta durant els passos migratoris i a l'hivern. Després de molts indicis, el 2016 se'n confirma definitivament la cria a la Vall amb la localització d'un niu amb dos polls.

Òliba (*Tyto alba*). És una espècie resident, nidificant escassa i en forta regressió. Els atropellaments a l'autovia al seu pas per Santa Cristina d'Aro constitueixen un greu problema per la supervivència de la ja minsa població de la Vall.

Aquest any, la tendència segueix sent preocupant. Tot i així, algunes caixes niu han estat ocupades i alguna parella nova s'ha establert. Al Monestir de Solius han criat i comenten que ho fan regularment (MMC). Al pla de Panedes nien en una caixa niu nova. S'anellaren els tres polls i la



femella també amb anelles de PVC. La fenologia de cria estimada seria: data de posta: 14.III; data de naixement dels polls: 14.IV (JRG, JSR, RMT*, GAZ).

A la zona del Molí de les Comes, Sant Feliu de Guíxols, es localitza una parella. Al niu trobem restes d'un poll mort d'aquesta temporada (JRG, DMM).

A can Llac de Romanyà es detecta un individu dins la casa. S'hi instal·la una caixa niu. El 17.XII, s'hi observa també un gamarús. Una evidència de la competència per l'espai (JRG, AMS).

El 14.IX es detecta una nova parella a les naus de la brigada municipal de Casell d'Aro. S'hi col·loca una caixa niu (JRG).

La resta de caixes niu o forats naturals resten desocupats (JRG).

Mussol comú (*Athene noctua*). És una espècie resident, nidificant escassa i en regressió.

Actualment es coneix no més de 10 parelles reproductores a la Vall. En indrets com el pla de Castell d'Aro Oest, Platja d'Aro, S'Agaró o Sant Feliu no es detecta cap parella reproductora. Sí es detecten a Santa Cristina d'Aro (nucli urbà), pla de Solius o Panedes.

Enguany es col·locaren diferents teules "mussoleres" per reforçar els llocs de cria (JRG, JBL, RMT*).

Al mas Pla de Solius cauen dos polls del niu. La fenologia de cria estimada seria: data posta: 20.IV; data naixement dels polls: 22.V (JRG).

Al nucli de Santa Cristina (zona església) cau un pol del niu. La fenologia de cria estimada seria: data posta: 20.IV; data naixement dels polls: 22.V (JRG).

El 13.IX es van alliberar quatre individus al pla de Castell d'Aro, provinents del Centre de Fauna dels Aiguamolls, com a mesura de reforç (JRG, RMT).



Xot (*Otus scops*). És un migrador i nidificant, detectat des de primers de març a primers d'octubre. La instal·lació de caixes niu pretén incentivar la cria de noves parelles a la Vall. Hi ha indicis d'alguna hivernada puntual.

El 26.II, un individu canta entre a Sant Llorenç, a Llagostera; primera citació de l'any (JSR).

Aquest any hagué poca ocupació de les caixes niu. De nou caixes revisades només dues estaven ocupades, una d'elles amb dos ous abandonats. A la zona del Hapimag es troba 2 polls morts (PMC) que, un cop datats, permeten estimar la següent fenologia: data de posta: 26.V; naixement dels polls: 21.VI. A l'única caixa ocupada amb èxit a



Sant Feliu de Guíxols s'hi troba cinc polls. La fenologia estimada, seria: posta 20.V; naixement dels polls 13.VI (JRG).

El 6.VIII s'alliberen 21 xots procedents del Centre de Fauna, en grups de tres, a les caixes niu de St. Feliu de Guíxols i de Castell d'Aro (JRG, RMT*).

El 8.XI, un individu al Mas Nou; última citació post-nupcial (MDX).

Mussol emigrant (*Asio flammeus*). És un migrador esporàdic.

El 30.XII, un individu a l'Ardenya, al SOCC de la baga del Montclar; quarta citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (JCO).

Mussol banyut (*Asio otus*). És un nidificant molt escàs i localitzat al pla de Panedes, que ha desaparegut del fons de la vall del Ridaura. A finals del 1991 encara es va capturar un individu per al seu anellament a on ara hi ha el Parc dels Estanys.

Aquest any s'instal·laren tres noves cistelles, per fer un total de sis, tot i que algunes ja s'estan deteriorant. El 30.III cap d'elles estava ocupada. El 15.V a una d'elles hi havia 3 ous. Aquesta posta es perdé, suposadament, per unes fortes pluges (55mm en 2 hores) (JRG*).

El 17.IV es trobà un niu natural amb, com a mínim, dos polls. Es reporten dos nius més a la zona, però fora de l'àmbit d'estudi (JSR).



Duc (*Bubo bubo*). És un resident nidificant, encara comú. La població d'aquesta espècie a la Vall sembla estabilitzada al voltant de les cinc parelles, tot i que se'n coneixen set territoris. Un ocell nascut i anellat a la Vall fou controlat criant l'any següent a Pineda de Mar.

Bon any pel que fa a la cria d'aquesta espècie. A la vall del Ridaura nidificaren amb èxit 5 parelles, més una de la que no es localitzà la cria, però s'hi observà presència durant tot l'any. Amb un total de 11 polls nascuts, la mitjana queda amb 2,2 polls per niu. Segueixen sense ocupar-se alguns territoris històrics però es recupera, per segon any consecutiu, la parella de Roca Ponça (GSD*).



Gamarús (*Strix aluco*). És un resident nidificant escàs, amb territoris cada vegada més propers a les zones baixes i periurbanes.

L'1.I, un individu atropellat a l'autovia C-31, a l'alçada de Treumal de Dalt, a Platja d'Aro (RMT).

El 23.III, un individu a Solius (VPR).

El 29.III, un individu atropellat a l'autovia C-35, a l'alçada de can Roure, Llagostera (ACS).

El 10.IV, un individu a Fenals d'Amunt (EPB).

Cria al Monestir de Solius; un poll cau d'un xiprer. S'han arribat a sentir quatre mascles simultàniament als voltants del Monestir (MMC). Amb la datació del poll es pot estimar la fenologia següent: 10 març posta; 8 abril naixement polls (JRG).

Els dies 15.IX i 16.IX, un individu cantant a S'Agaró (EFX).

El 28.IX, un individu atropellat a l'autovia C-31, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 22.X, un individu a prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 13.XII, un individu a prop de can Llac, a Santa Cristina d'Aro (MAL).

El 27.XII, un individu a Sant Amanç, Sant Feliu de Guíxols (EPB).

Puput (*Upupa epops*). És una nidificant cada vegada més escassa i hivernant regular, encara que molt escassa. (Només es recullen dades de gener i desembre).

Els dies 4.I i 5.I, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ATX*, CAC, MTM).

El 4.I, un individu a l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 7.I, un individu prop del Port d'Aro (ATX).

L'11.I, no menys de tres individus al Golf de Mas Nou (CAC, JFB).

L'11.I, un individu al Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (CAC, JFB).

El 18.I, un individu al comal de la Coma, a Castell d'Aro (RMT).

Els dies 1.XII, 6.XII i 31.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, ATX, ACY).

El 4.XII, un individu a Panedes, Llagostera (CAC).

Els dies 5.XII, 12.XII i 18.XII, almenys un individu a la desembocadura del Ridaura; el 28.XII dos (CAC, JFB).

Els dies 7.XII i 12.XII, un individu al costat de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).



Gaig blau (*Coracias garrulus*). És un migrador molt escàs però regular. Més de tres quartes parts de les observacions es concentren entre final d'abril i, principalment, el mes de maig; les observacions més tardanes són de la segona quinzena de setembre. Les citacions continuades del mes de juliol i agost de 2014 suggereixen la possibilitat de cria, tot i que la inspecció de les caixes niu no va donar resultats positius.



El 26.IV, dos individus a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (ALM).

El 14.V, dos individus a Panedes, Llagostera; el 24.V un (JCO, JSR*).


El 20.V, un individu a Castell d'Aro (JBL).

Els dies 16.VIII, 24.VIII i 25.VIII, un individu a Panedes, Llagostera; els dies 22.VIII, 3.IX i 8.IX (última citació de l'any), dos, els dies 30.VIII i 1.IX quatre (JSR, LGL).

El 5.IX, un individu a Sant Llorenç, Llagostera (CAC).

Blauet (*Alcedo atthis*). És un migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins a la primera d'abril.

Presència hivernal al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura. La darrera citació pre-nupcial es produí el 13.IV i la primera postnupcial, el 20.VI. El màxim fora de cinc individus alhora, els dies 11.IX i 8.X (CAC, ORX, RMT,



JCC, JFB, MAC, XTG, FLX, JSC, JCC, AMS, ATX, LTB, XCX, BOC, MAL, NFM, JPC, BOC, OCY, CVX, JVM).

Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2025).

Els dies 5.I, 11.I i 26.II, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (RMT, MVS).

Els dies 14.I i 3.II, un individu al Port d'Aro (VDX, RMT).

Els dies 28.II, 3.III, 10.VIII i 14.III, un individu prop de la desembocadura del Ridaura; el 17.III dos (ATX, CAC, RMT).

Els dies 13.VII, 25.VII, 29.VII, 7.VIII, 8.VIII, 11.VIII, 17.VIII i 6.IX, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 14.VII, 30.VII, 31.VII, 1.VIII, 10.VIII, 12.VIII, 14.VIII, 18.VIII, 26.VIII, 29.VIII, 31.VIII, 2.IX, 14.IX, 22.XI, 28.XI, 30.XI, 5.XII, 6.XII i 7.XII un (CAC*, XTG, CFQ, GAB, MAC, JRG, RMT, NFM).

Els dies 27.VII i 10.VIII, un individu al tram mig-alt del Ridaura (CAC).

El 28.X, tres individus al Ridaura, al passallís de can Bada (XCX).

Els dies 8.XI, 10.XI, 3.XII i 10.XII, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (RMT).



Abellerol (*Merops apiaster*). És migrador relativament comú i nidificant cada vegada més escàs, present de la segona quinzena de març a finals de setembre.

El 4.IV, dotze individus prop del Mas Trempat, a Sant Feliu de Guíxols; primera citació pre-nupcial (RMT).

El 10.IX, diversos individus juvenils a can Llac de Romanyà i no menys de vint al Mas Nou de Platja d'Aro; últimes citacions postnupcials (CAC, MDX).

Colltort (*Jynx torquilla*). És un ocell poc conegut, podria tractar-se d'un migrador irregular. Detectat a la primavera, entre finals de març i primers de maig, i a la tardor, durant la segona quinzena d'agost i la primera quinzena de setembre, i una dada tardana, a la primera quinzena d'octubre.

Del 2.IV a l'11.IV, almenys un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 12.IV, un individu a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro (CAC*).



Picot garser petit (*Dryobates minor*). És un ocell sedentari en forta expansió, tant a la Vall com a la resta del territori català. La primera observació a la vall del Ridaura, es feu a finals de 2006 i, des de llavors, s'ha convertit en un ocell relativament comú. Se n'ha constatat la cria a la Vall. Es disposa de dades de tots els mesos de l'any.

Els dies 18.I, 14.II, 22.II, 23.II, 27.II, 1.III, 24.IV, 25.IV, 2.V, 8.V, 15.V, 17.V, 14.VII, 12.VIII, 13.VIII, 24.VIII, 25.VIII, 31.VIII, 4.X, 17.XII i 20.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 28.II dos (ATX, CAC, RMT*, JFB, AMS).

El 24.I, almenys un individu sentit al Ridaura, a l'alçada del Balcar, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 2.II, un individu prop del Tennis d'Aro (RMT).

Els dies 7.II, 15.II, 16.II, 21.II, 24.II, 28.II, 7.III, 10.III, 24.III, 23.IV, 25.IV, 28.IV, 24.VIII i 12.IX, un individu prop de la desembocadura del Ridaura (CAC, ATX).

Els dies 8.II, 18.IV i 9.VII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 9.II, dos individus sentits al Ridaura, a l'alçada de la Costa de l'Alou (CAC).

El 24.II, un individu entre can Palahí i can Barcelona, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 22.III, 12.IV, 24.V, 14.VI, 6.VII, 22.VII, 12.VIII, 22.VIII i 3.IX, un individu al comal de la Coma, a Castell d'Aro (JRG, CAC).

El 4.IV, un individu al Ridaura, a prop de Mobles Mulà (CAC).

El 10.IV, un individu a Romanyà de la Selva (RBV).

El 23.IV, un individu a la bassa de can Puig de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

El 16.V, un individu al mas Candell de Platja d'Aro (CAC).



El 6.VI, un individu al SOCC de la baga del Montclar (JCO).
El 7.VI, un individu a prop de la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro (SJA, CAC).
El 24.VI, un individu a Sant Llorenç, Llagostera (CAC).
El 6.VII, un individu a cal Ralet, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 18.VII, un individu a prop de l'església de Santa Cristina d'Aro (JSR).
El 26.VII, dos individus al tram alt del Ridaura (CAC).
El 15.VIII, un individu a prop del Tennis d'Aro (RMT).
Els dies 16.VIII, 7.IX i 28.XII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).
El 30.XII, un individu davant de Fruites Ramot (CA, JRG).

Picot garser gros (*Dendrocopos major*). És un resident nidificant, relativament abundant i en franca expansió.

Picot verd (*Picus sharpei*). És un resident nidificant relativament comú, tot i que la seva presència s'ha vist eclipsada per la de les altres dues espècies de picot presents a la Vall.

Xoriguer comú (*Falco tinnunculus*). Manté unes poques parelles reproductores i és un migrador regular i hivernant relativament comú.

El 25.V, s'observen quatre polls a una caixa niu de l'església de Castell d'Aro (JRG). Es detecta parella molt activa a Roca Ponça. La resta de territoris no s'han mostrejat. No hi ha cap notícia de presència al Monestir de Sant Feliu de Guíxols (JRG).

Falcó camarroig (*Falco tinnunculus*). És un migrador molt escàs, de presència fortament condicionada per les condicions meteorològiques durant el seu viatge migratori, que pot ocasionar irrupcions com la de finals de maig del 2015. Detectat especialment durant el pas primaveral, de finals d'abril a primers de juny. El pas de tardor, molt més escàs, es produeix al setembre.
El 29.IX, un juvenil a Panedes, Llagostera (JSR*, JCO).



Falcó mostatxut (*Falco subbuteo*). És un migrador regular. Tot i haver-se detectat de la primera quinzena d'abril a mitjans d'octubre, no se n'ha comprovat la cria a la Vall.
El 10.IX, dos individus al tram alt mitjà del Ridaura (JSR).

Falcó pelegrí (*Falco peregrinus*). Hi ha dues o tres parelles reproductores. En migració i a l'hivern, el nombre d'efectius augmenta.

Del 5.I al 7.VII, diversos individus prop del port de Sant Feliu de Guíxols, amb un màxim de quatre el 24.V (RMT*, CAC, PBA).

El 30.III, un individu prop del Montclar (MBC).

Els dies 2.V i 31.VII, un individu al litoral sud de Sant Feliu de Guíxols (PAB, FMX).

El 4.V, un individu a prop de la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro (ACS).

El 7.V, s'anellen quatre polls volanders al litoral nord de Sant Feliu de Guíxols (GJP, JRG).

El 12.X, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).



Cotorreta pitgrisa (*Myiopsitta monachus*). La primera citació a la Vall es produí el 1998, a Castell d'Aro. Després d'eradicar la incipient colònia establerta al nucli urbà de Castell d'Aro, no va ser fins el 2008 que va començar a nidificar en una palmera de S'Agaró i a les palmeres dels jardins de Juli Garreta, a Sant Feliu de Guíxols, on s'ha consolidat el principal nucli reproductor de la Vall, amb una població creixent.

Durant tot l'any, presència regular a la zona de la desembocadura del Ridaura, el Parc dels Estanys i rodalies, regularitat que no s'havia observat en anys presedents (CAC).

Escorxador (*Lanius collurio*). És un migrador escàs. Esporàdic a la primavera, entre mitjans de maig i primers de juny, i escàs, encara que regular, durant el pas de tardor, majoritàriament protagonitzat per joves de l'any, des de la primera quinzena d'agost fins a primers d'octubre, amb màxim marcat la primera quinzena de setembre. Es va detectar un mascle adult en una data excepcionalment tardana per l'espècie, durant la primera quinzena de novembre.

El 9.V, un mascle a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro (ALM, CAC*).



Capsigrany (*Lanius senator*). Ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant, a migrador i nidificant molt escàs, encara que regular. Detectat entre la primera quinzena de març i la segona quinzena de setembre. De primers d'abril a primers de maig no és infreqüent l'observació de la subespècie balear (*L. s. badius*).

El 4.IV, un individu a Panedes, a Llagostera; primera citació pre-nupcial (JSR).

Els dies 5.IV i 22.IV, un individu a Panedes, a Llagostera (JSR).

Els dies 5.IV, 20.IV, 21.IV, 22.IV, 25.IV, 27.IV, 28.IV, 30.IV i 3.V, un individu a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro; el 19.IV dos (RMT, CAC, ALM).

L'11.IV, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 17.IV, un mascle de la subespècie balear (*L. s. badius*), prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC*).

Els dies 19.IV, 23.IV, 8.V i 11.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM, RMT, CAC).

El 20.IV, un individu prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 8.V, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 24.VI, un individu al Mas Nou de Platja d'Aro (AHC).

El 3.VII, un individu a Sant Llorenç, Llagostera (CAC).

El 5.VII, un adult i un poll volander al Balcar, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

El 25.VIII, un individu de primer any a Panedes, Llagostera; els dies 31.VIII i 3.IX dos (JSR).

El 30.VIII, un individu a prop de can Puig de Sant Llorenç, Llagostera (CAC).



Oriol (*Oriolus oriolus*). És un migrador i estival en declivi. S'ha detectat des de mitjans d'abril a mitjans de setembre.

El 25.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (CAC).

L'11.IX, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; última citació de l'any (CAC).

Gaig (*Garrulus glandarius*). És un ocell present tot l'any, abundant.

Garsa (*Pica pica*). És una espècie present tot l'any, molt abundant.

Els dies 24.I i 9.II, un centenar d'individus al capvespre, al joc del Parc dels Estanys (XTG).

Cornella negra (*Corvus corone*). És una resident escassa, amb clars indicis de cria.

El 19.IV, un individu traginant branques per fer niu a Castell d'Aro (CAC).

Corb (*Corvus corax*). És present tot l'any, en molt petit nombre. Espècie en regressió, el nombre d'individus de la qual augmenta per alliberaments, portats a terme per l'Administració, d'ocells capturats a altres zones del país, on causaven perjudicis a la ramaderia. Se n'ha comprovat la cria en penya-segat i en arbre.

A finals de març, es detecta un niu ocupat a Roca Rovira (JRG).

Mallerenga petita (*Periparus ater*). És present tot l'any, escassa i localitzada com a nidificant a les pinedes litorals i una mica més abundant a l'hivern.

Mallerenga emplomallada (*Lophophanes cristatus*). És present tot l'any i és relativament comuna.

Mallerenga blava (*Cyanistes caeruleus*). És comuna i present tot l'any, més nombrosa a l'hivern amb l'arribada d'ocells hivernants.

Mallerenga carbonera (*Parus major*). És comuna i present tot l'any, lleugerament més nombrosa a l'hivern, amb l'arribada d'alguns ocells hivernants.

Teixidor (*Remiz pendulinus*). És un migrador i hivernant esporàdic molt afectat per la desaparició de les zones humides de la Vall. Detectat de primers de setembre a mitjans de gener. Un ocell marcat a la Vall fou controlat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

El 2.I, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 25.XII, no menys de quatre individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 27.XII i 28.XII un (MFR, CAC).

Cotoliu (*Lullula arborea*). És una espècie sedentària, present tot l'any, escassa i localitzada.

Alosa comuna (*Alauda arvensis*). És una migradora i hivernant escassa i localitzada al pla de Panedes. Ha estat detectada des de finals d'agost fins a la primera quinzena d'abril.

El 14.III, diversos individus a Panedes, Llagostera; última citació pre-nupcial (CAC).

El 13.X, primers individus a Panedes, Llagostera (JSR).

Cogullada comuna (*Galerida cristata*). És una espècie sedentària, comuna a les zones agrícoles de la Vall.

Terrerola comuna (*Calandrella brachydactyla*). Probablement havia estat comuna a casa nostra, com suggereix l'observació d'una trentena d'individus a l'abril del 1953. Actualment, és una migradora esporàdica de la qual només tenim quatre dades recents, totes del mes d'abril.

El 18.IV, tres individus a Panedes, Llagostera; sisena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (JSR*).



Oreneta de ribera (*Riparia riparia*). És una migradora no gaire abundant. Detectada des de primers de març a mitjans d'octubre.

El 15.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (XTG).

El 7.V, sengles individus a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; últimes citacions pre-nupcials (CAC).

El 25.VIII, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (XTG).

El 8.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació post-nupcial (CAC).


Roquerol (*Ptyonoprogne rupestris*). És un hivernant escàs i localitzat. Tot i que hi ha observacions a la primera quinzena d'agost, és present de primers d'octubre a primers d'abril, amb una dada aïllada d'un exemplar al Masnou a primers de maig i una altra de quatre exemplars a la segona quinzena de maig, que suggereixen una possible cria.

El 17.II, no menys de tres-cents individus posats a les parets de Roca Ponça; xifra rècord a la Vall (JRG*).

El 23.III diversos individus al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; última citació pre-nupcial (CAC).

El 10.X, primers individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 21.XII, no menys de cent quaranta-un individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Oreneta comuna (*Hirundo rustica*). És una migradora abundant i nidificant cada vegada més escassa, detectada des de la primera quinzena de febrer a la primera quinzena de desembre. Ocells anellats a la Vall han estat controlats a Nigèria, Croàcia, Hongria, Alemanya, França i Tarragona.

El 5.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (CAC).

A mitjan juliol es comença a formar el gran joc estival al canyissar del tram final del Ridaura, on s'hi ajoquen millers d'individus que l'abandonen cada dia a l'alba en un espectacle impressionant, que es manté fins a mitjan setembre (CAC).

L'1.XI, almenys un individu a la desembocadura del Ridaura; última citació post-nupcial (CAC).

Oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*). És una migradora abundant i nidificant cada vegada més escassa, detectada de mitjans de febrer a finals d'octubre, amb dues citacions molt tardanes del 22.XI.11 i del 23.XI.19.

El 21.II, diversos individus al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; primera citació de l'any (CAC, JRG).

El 6.X, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació post-nupcial (CVX).



El seguiment de nius d'oreneta cuablanca és una iniciativa d'estudi dels ocells i el medi urbà basada en la participació ciutadana i en el seguiment dels nius d'aquesta espècie dels pobles i ciutats de Catalunya (<https://www.orenetes.cat/>). A la vall del Ridaura, liderat per Rosa Matesanz Torrent, es fa un seguiment des del 2021, sent la unitat de mostreig el casc urbà de Santa Cristina d'Aro. Els resultats són els següents:

	Primer dia de cens	Darrer dia de cens	Nius en bon estat (total)	Nius en bon estat (actius)	Nius en construcció	Minuts d'observació
2021	30/05	08/06	281	194	9	469
2022	01/06	10/06	234	176	6	357
2023	02/06	04/06	278	217	0	447
2024	31/05	03/07	228	174	7	480
2025	03/07	11/07	283	221	3	284

Oreneta cua-rogenca (*Cecropis rufula*). És una migradora i nidificant escassa, detectada des de la primera quinzena de febrer fins a primers de novembre.

El 9.III, almenys un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; primera citació de l'any (CAC).

El 14.XI, almenys un individu a la desembocadura del Ridaura; última i tardana citació post-nupcial (CAC).

Rossinyol bord (*Cettia cetti*). És present tot l'any i és relativament comú.

Mallerenga cuallarga (*Aegithalos caudatus*). És present tot l'any, relativament comuna, tot i que darrerament s'ha notat una certa disminució dels seus efectius.

Mosquiter pàl·lid (*Phylloscopus bonelli*). És un migrador i nidificant escàs, detectat de finals de març a agost.

El 5.IV, sengles individus a Sant Llorenç i a Panedes, a Llagostera; primera citació pre-nupcial (CAC, JSR).

El 22.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació post-nupcial (XTG).

Mosquiter de passa (*Phylloscopus trochilus*). És un migrador regular. Detectat en pas de final de març a primers de maig i de mitjans d'agost a finals d'octubre.

Els dies 15.IV i 17.IV, un individu al costat de la vinya del mas Candell de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

El 24.IV, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 28.IV, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'1.V almenys dos (CAC, JFB).

El 28.IV, dos individus al costat de la vinya del mas Candell de Platja d'Aro; l'1.V un (CAC).

El 28.IV, un individu a Panedes, a Llagostera (JCO).

Els dies 24.VIII (primera citació post-nupcial), 30.VIII, 1.IX i 6.IX, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, NFM*).

El 26.VIII, dos individus a prop de la desembocadura del Ridaura; els dies 11.IX i 3.X un. (CAC, JFB)

El 26.VIII, un individu al Ridaura, a l'alçada del Parc de Bombers. (CAC).

El 26.VIII, un individu al Port d'Aro (JSR).

Els dies 27.VIII, 31.VIII i 6.IX, dos individus al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro; els dies 1.IX, 3.IX, 4.IX, 8.IX, 9.IX, 12.IX, 13.IX i 26.IX almeys un (CAC, MAL).

El 30.VIII, un individu al Parc de Bombers (CAC).

El 18.IX, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (CAC).

L'11.X, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera; última citació de l'any (CAC).



Mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*). És un migrador i hivernant abundant. No se n'ha comprovat la cria, encara que hi ha indicis que la suggereixen. Hi ha una observació al Ridaura, ben documentada amb imatges, almenys de finals de desembre de 2013 a finals de gener del 2014, de dos exemplars amb caràcters de la raça siberiana (*P. c. tristis*). Una altra al mateix lloc, la primera quinzena d'abril de 2016, també documentada amb imatges i una tercera observació al Parc dels Estanys, amb imatge, a finals de gener de 2023.

El 26.V, un individu a a la desembocadura del Ridaura; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 28.IX, un individu a a la desembocadura del Ridaura; primera citació post-nupcial (CAC).

Balquer (*Acrocephalus arundinaceus*). És un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la Vall. A la primavera s'ha detectat de finals de març a finals de juny, amb una dada de finals de juliol (no se n'ha constatat la cria), i el pas post-nupcial va de l'agost a mitjans de setembre.

El 15.IV, un individu al costat de la vinya del mas Candell de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

Els dies 25.IV, 27.IV i 28.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 27.IV, 28.IV, 5.V i 8.V (última citació prenupcial), un individu al costat de la vinya del mas Candell de Platja d'Aro (CAC, ALM, MAC).

El 4.V, un individu canta al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JFB).

Boscarla mostatxada (*Acrocephalus melanopogon*). Podria tractar-se d'una espècie divagant hivernal esporàdica. En tot cas, recents observacions de 2023, confirmaren la hivernada d'almenys dos individus.

El 25.XII, un individu a la desembocadura del Ridaura (MFR).

Boscarla dels joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*). És una migradora molt escassa, encara que regular, molt afectada per la desaparició de les zones humides de la Vall. El pas de tardor va de mitjans de juliol a mitjans d'octubre. El de primavera, de la primera quinzena de març a la primera de maig.

El 10.IV, un individu canta a la desembocadura del Ridaura; primera i única citació de l'any (CAC).

Boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*). És una migradora relativament comuna i nidificant molt escassa i localitzada al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys. Les primeres arribades es poden produir a primers de març i s'han detectat ocells en pas durant la primera quinzena de novembre. A primers de maig del 1993, es controla un individu que havia estat anellat a mitjan agost del 1990 a Alemanya.

L'11.IV, un individu canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació pre-nupcial (CAC).

Unes sis o set parelles nidificants al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys (CAC).

El 30.IX, un individu al Parc dels Estanys; última citació post-nupcial (RMT).

Busqueta comuna (*Hippolais polyglotta*). És una migradora i nidificant, relativament comuna. Detectada des de finals d'abril a finals de setembre.

El 20.IV, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any; primera citació de l'any (JSR).

Boscaler pintat gros (*Locustella naevia*). És un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la Vall. Detectat a l'abril fins a mitjans de maig i al setembre.

Els dies 27.IV i 28.IV, un individu canta a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 28.IV, un individu a Panedes, a Llagostera (JCO).

L'1.V, un individu canta a prop de la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro (CAC).

Trist (*Cisticola juncidis*). És present tot l'any, en nombre més aviat escàs i localitzat.

Tallarol de casquet (*Sylvia atricapilla*). És present tot l'any i especialment abundant en migració i a l'hivern. A mitjans d'abril de 1998, es controla un individu que havia estat anellat l'any anterior a Bèlgica.

Tallarol capnegre (*Curruca melanocephala*). És comú i present tot l'any.

Tallarol de garriga (*Curruca iberiae*). És un migrador i nidificant, relativament comú, present de final de març a octubre.

El 22.III, un mascle als horts de Castell d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

El 14.IX, un individu al Parc dels Estanys; última citació post-nupcial (CAC).

Tallareta comuna (*Curruca communis*). És una migradora escassa, encara que regular. Detectada de la segona quinzena de març a primers de maig i de la primera quinzena d'agost a la segona de novembre.

El 24.III, un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC).

El 6.IV, un mascle a la desembocadura del Ridaura; el 28.IV, dos individus (CAC).

Els dies 15.IV, 17.IV i 18.IV, un individu al costat de la vinya del mas Candell de Platja d'Aro; el 27.IV dos (CAC*, ALM).



Tallareta cuallarga (*Curruca undata*). És present tot l'any, en nombre escàs.

El 18.I, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (RMT).

El 6.VI, un individu a la бага del Montclar (JCO).

El 30.XII, dos individus al SOCC de la бага del Montclar (JCO).

Bruel (*Regulus ignicapilla*). És comú i present tot l'any.

Reietó (*Regulus regulus*). És un migrador i hivernant escàs, detectat des de primers de novembre a mitjans de març.

Els dies 24.XI i 5.XII, un individu a S'Agaró (SNX, CAC).

El 13.XII, un individu al Parc dels Estanys; el 31.XII dos (CAC, ACY).

Els dies 20.XII, 29.XII i 31.XII, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 28.XII dos (CAC).

El 30.XII, un individu a l'Ardenya, al SOCC de la бага del Montclar (JCO).

Durant el final d'any, s'han fet més observacions que altres anys, fet que també s'ha fet notar a la resta del territori català (https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=1164&a=N428#FN428). L'excepcionalitat d'aquest any es pot veure clarament al portal OrnithoListes, on el percentatge de llistes amb reietons és molt més alta que la mitjana

Cargolet (*Troglodytes troglodytes*). És relativament comú i present tot l'any.

Pica-soques blau (*Sitta europaea*). És un nidificant, en franca expansió. Mentre que la primera citació a la Vall és de 2011, no va ser fins el 2016 que es va confirmar la cria a la Vall per primera vegada.

Els dies 24.I i 2.II, almenys un individu sentit al Ridaura, a l'alçada del Balcar, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 24.I, 1.II, 9.II, 8.III, 27.IX i 4.X, almenys un individu sentit al Ridaura, a l'alçada de la Costa de l'Alou (CAC).

El 4.IV, no menys de dos individus al Ridaura, a prop de Mobles Mulà; el 7.XII un (CAC).

Els dies 5.IV, 25.IV i 1.V, un individu a Panedes, a Llagostera; els dies 15.IV, 9.VII i 16.VIII dos (JSR, TST*).

El 6.VI, tres individus al SOCC de la бага del Montclar (JCO).

El 10.VII, tres individus al tram alt del Ridaura; el 26.VII un (CAC).

L'11.VII, no menys de dos individus a la bassa de can Puig, a Sant Llorenç, Llagostera; el 30.VIII un (CAC).

El 17.VII, un individu al Prat de Romanyà (CAC).

L'11.X, no menys de quatre individus al tram mig alt del Ridaura (JSR).

El 18.X, sengles individus a les rieres de Salenys i de Font Picant (CAC).

El 7.XI, un individu al costat de la resclosa de can Salvador (CAC)

L'11.X, tres individus al tram mig del Ridaura (JSR).



Raspinell comú (*Certhia brachydactyla*). És una espècie comuna i present tot l'any.

Estornell comú (*Sturnus vulgaris*). És present tot l'any, especialment abundant en migració i a l'hivern.

Estornell negre (*Sturnus unicolor*). És molt més escàs i localitzat que el comú i no es descarta que formi parelles mixtes amb l'estornell comú i doni individus de trets mesclats.

Tord comú (*Turdus philomelos*). És un nidificant molt escàs i migrador i hivernant comú. Un individu anellat a la Vall el desembre del 1992 fou caçat pocs dies després a Porreres, a Mallorca. Un individu marcat a la Comunitat Valenciana, fou mort prop de Romanyà, a Santa Cristina d'Aro, a finals del 2000.

Griva comuna (*Turdus viscivorus*). Present tot l'any, és una nidificant molt escassa i hivernant escassa.

Aquest any s'ha observat criant al Ridaura, a l'alçada del Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (CAC*).



Merla comuna (*Turdus merula*). És una espècie comuna i present tot l'any.

Papamosques gris (*Muscicapa striata*). És un migrador regular i reproductor escàs. Detectat entre mitjans d'abril i la primera quinzena d'octubre.

El 22.IV, un individu al costat de carril bici, al final del terme de Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any (CAC).

El 28.IV, individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 9.V, 10.V i 14.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11.V dos (NFM, CAC, ALM).

El 8.V, un individu de la subespècie balear (*M. s. balearica*). a la desembocadura del Ridaura (CAC*).

El 16.V, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

L'1.VI, un individu a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 7.VI, un individu al Balcar, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

El 9.X, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).



Pit-roig (*Erithacus rubecula*). És un nidificant escàs i un migrador i hivernant abundant.

Cotxa blava (*Luscinia svecica*). És una migradora molt escassa, molt afectada per la desaparició de les zones humides de la Vall. S'ha detectat al març i la primera quinzena d'abril i de final d'agost a primers de novembre. A finals de març de 2015 es fotografià un individu de la subespècie escandinava (*L. s. svecica*).

El 13.X, un individu captat per una càmera trampa a Panedes, Llagostera; espècie que no es citava a la Vall des de 2018 (JSR*).

El 25.XII, un individu sentit a la desembocadura del Ridaura (MFR).



Rossinyol (*Luscinia megarhynchos*). És un migrador i nidificant relativament comú, que s'ha detectat de finals de març a finals de setembre.

El 9.IV, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR).

El 5.IX un individu a Panedes, Llagostera; última citació post-nupcial (CAC).

Mastegatatxes (*Ficedula hypoleuca*). És un migrador regular. S'ha detectat des de primers d'abril a finals de maig i de la segona quinzena d'agost a mitjans d'octubre.

El 22.IV, un individu a prop del Tennis d'Aro; primera citació pre-nupcial (JRG).

Els dies 24.IV i 28.IV, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

Els dies 27.IV, 10.V i 11.V (última citació prenupcial), un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 8.V dos (CAC, XTG).

Els dies 27.IV i 28.IV, un individu a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro (ALM, CAC).

El 29.IV, un individu a les Bernades, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 3.IX, un individu a Castell d'Aro; primera citació post-nupcial (JRG).

Els dies 9.IX, 10.IX i 11.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 10.IX i 22.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (XTG*, CAC).

El 18.IX, un individu a prop de la urbanització Rosamar de Santa Cristina d'Aro (EFX).

El 28.IX, un individu a Panedes, Llagostera; última citació post-nupcial (JSR).



Cotxa fumada (*Phoenicurus ochruros*). Mentre que fa uns anys, només ens visitava a l'hivern, actualment, a més, s'ha convertit en un nidificant relativament comú, especialment als nuclis urbans.

Cotxa cua-roja (*Phoenicurus phoenicurus*). És una migradora regular i escassa. El pas de primavera va de primers de març a finals de maig i, el de tardor, de mitjans d'agost a mitjans d'octubre. S'ha detectat un mascle cantant en plena estació reproductora, el que pot suposar que, esporàdicament, criï a la Vall.

El 22.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre al Ridaura; primeres citacions de l'any (NFM*).

Els dies 3.IV i 26.IV, un mascle a Panedes, Llagostera (JCO, JSR).

Els dies 3.IV i 25.IV, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (XTG, CAC).

Els dies 27.IV, 28.IV i 30.IV (última citació prenupcial) un individu a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro (ALM, CAC, MAC).

Els dies 3.X i 9.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; úniques citacions postnupcials (CAC, XTG).



Merla blava (*Monticola solitarius*). És present tot l'any, relativament comuna als indrets adients i, per tant, localitzada.

Bitxac rogenç (*Saxicola rubetra*). És un migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de mitjans de març a mitjans de juny i, al de tardor, de finals d'agost a final d'octubre.

El 5.IV, un individu a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro; primera citació de l'any (RMT).

Els dies 15.IV i 18.IV, un individu a Panedes, a Llagostera; el 25.IV deu, el 27.IV tres, el 28.IV quatre, l'1.V dos (JSR*, JCO, CAC).

Els dies 19.IV i 9.V, dos individus a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro; els dies 24.IV, 30.IV i 2.V, el 27.IV nou, el 28.IV set, els dies 30.IV, 2.V i 10.V un (última citació prenupcial) (CAC, ALM).

Els dies 19.IV i 27.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 25.IV dos (XTG, NFM, RMT).

El 18.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura; única citació post-nupcial (RMT).



Bitxac comú (*Saxicola rubicola*). És un reproductor escàs que ha patit força els efectes de la davallada de l'agricultura tradicional. A l'hivern els efectius s'incrementen amb l'arribada d'ocells hivernants.

Còlit gris (*Oenanthe oenanthe*). És un migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de finals de març a primers de juny i, al de tardor, de finals d'agost a finals d'octubre, amb una dada extrema a primers de novembre.

El 2.IV, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació pre-nupcial (JSR).

Els dies 19.IV, 28.IV i 9.V, dos individus a la vinya del mas Candell de Platja d'Aro; el 27.IV un (CAC, ALM).

Els dies 25.IV i 1.V, dos individus a Panedes, Llagostera; el 26.IV quatre (JCO, JSR).

El 4.IX, dos individus a Panedes, Llagostera (primera citació post-nupcial); el 13.X tres (JSR).

El 2.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; última citació post-nupcial (CAC).

Còlit ros (*Oenanthe hispanica*).

És un migrador molt escàs i irregular, amb dades de finals de març a mitjans del maig, a l'agost i al setembre.

El 27.III, un mascle a Panedes (JSR*, JCO).



Pardal roquer (*Petronia petronia*). Fins al 2019 es considerava accidental, ja que només es comptava amb una citació de finals de juliol i una segona a cavall de desembre i gener. El 2019 es descobreix una petita colònia de cria que té continuïtat fins a l'actualitat.

El 21.I, un individu a Panedes, Llagostera; els dies 8.II i 19.III uns deu, el 14.III tres (JCO, JSR, CAC).

El 9.II, quatre individus al viaducte de la Costa de l'Alou (CAC).

Els dies 29.IV i 24.V, un individu prop de l'Aquadiver de Platja d'Aro (JBL, CAC).

El 18.V, força moviment a la colònia de cria de l'Alou, també el 25.VI i el 9.VII (CAC*).

El 23.VI, es detecta criant, a uns nius d'oreneta cua-rogenca, sota un pont del Ridaura, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 22.XI, diversos exemplars al mas Candell de Platja d'Aro (ALM).



Pardal xarrec (*Passer montanus*). És present tot l'any i relativament comú, encara que menys que anys enrere.

Pardal comú (*Passer domesticus*). Ha patit una forta davallada poblacional, fent-se rar o, fins i tot, desapareixent de determinats indrets.

Bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*)

Es constata la reproducció, cada any, des d'almenys 2016 i ja es pot considerar que aquesta població s'ha establert de manera definitiva i autosuficient a la Vall (CAC).

Almenys els dies 15.VII, 1.IX, 17.X i 6.XI diversos individus juvenils, encara amb boqueres i amb el plomatge en creixement, al Ridaura (almenys des del seu pas a l'alçada del poble de Santa Cristina d'Aro fins la desembocadura). El 24.VII, una llocada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. El 5.XII una llocada reclamant becada als adults a les Eroles, a Castell d'Aro (CAC*).

No es descarta que s'hagi reproduït a altres punts de la Vall, per exemple a la bassa de la costa de l'Alou o a la de les Reinetes (CAC).



Pardal de bardissa (*Prunella modularis*). És un hivernant relativament comú, detectat des de mitjans d'octubre a la segona quinzena d'abril.

Els dies 11.I i 19.I, un individu a can Roig, Llagostera (PPF, JSR).

El 19.I, dos individus prop de Llagostera Residencial (JSR).

El 26.I, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JFB).

Cuereta groga (*Motacilla flava*). És una migradora relativament abundant, sobretot durant el pas primaveral, que s'estén de primers de març a finals de maig-primers de juny; al de tardor, s'ha detectat de mitjans d'agost a finals d'octubre.

El 19.III, no menys de cinc individus a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JCO).

El 28.IV (última citació pre-nupcial), almenys un mascle de la subespècie escandinava *M. f. thunbergi* al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC*).

El 21.IX, una vintena d'individus a Panedes, Llagostera (JSR).



Cuereta torrentera (*Motacilla cinerea*). És present tot l'any, escassa com a reproductora i més nombrosa a l'hivern.

Cuereta blanca (*Motacilla alba*). És comuna i present tot l'any. El 2015 es va fotografiar un individu de la raça britànica, la cuereta blanca endolada (*M. a. yarrellii*).

Titella (*Anthus pratensis*). És una migradora i hivernant comuna, present des de primers d'octubre a la primera quinzena d'abril.

El 28.III, quatre individus al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro; última citació pre-nupcial (CAC).

El 14.X, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació post-nupcial (JSR).

Trobat (*Anthus campestris*). És un migrador molt escàs. Detectat principalment a la primavera, des de mitjans d'abril a finals de maig, el pas de tardor, menys intens, es produeix al setembre.

El 27.IV, un individu a Panedes, Llagostera (CAC).

Els dies 1.IX i 4.IX, un individu a Panedes, Llagostera (JSR*).



Piula dels arbres (*Anthus trivialis*). És una migradora regular, encara que escassa, essent el pas de tardor, de mitjans d'agost a mitjans d'octubre, més evident que el de primavera, de final de març a mitjan maig. A mitjans d'abril de 2004 es recupera un individu que havia estat anellat a Hongria a finals de juny de 1998.

L'11.IV, dos individus a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JCO*).

El 7.IX (primera citació post-nupcial), sis individus a Panedes, Llagostera; el 8.IX un, el 29.IX dos (JSR).



Pinsà comú (*Fringilla coelebs*). És un nidificant escàs i un migrador i hivernant abundant.

Pinsà mec (*Fringilla montifringilla*). És un hivernant molt escàs, detectat de finals d'octubre a finals de març. Els dies 1.III, 14.III, 15.III, 16.III i 17.III, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ALM, CAC*, XTG).



Durbec (*Coccothraustes coccothraustes*). És un migrador i hivernant escàs, que s'ha detectat des de setembre al juny. Es tracta d'una espècie en expansió de la qual s'ha comprovat la cria a la Vall, encara que en nombre molt escàs.

El 29.I, dos individus al SOCC de la baga del Montclar, Santa Cristina d'Aro (JCO).

Els dies 9.III i 22.III, un individu als horts de Castell d'Aro (CAC*).

L'1.V, no menys de quatre individus a Panedes, Llagostera; el 24.V un, el 9.VII, no menys d'onze, el 16.VIII un (JSR).

El 9.VII, quatre individus a la resclosa de can Salvador (JSR).



Verdum (*Chloris chloris*). És una espècie resident, comuna tot l'any.

Passerell comú (*Linaria cannabina*). És present tot l'any, escàs. Els estols més grans s'observen a l'hivern, al pla de Panedes.

Cadenera (*Carduelis carduelis*). És una espècie resident, comuna tot l'any.

Gafarró (*Serinus serinus*). És una espècie resident, comuna tot l'any.

Lluer (*Spinus spinus*). És un migrador i hivernant, relativament abundant segons els anys, detectat des de mitjans d'octubre a primers d'abril.

El 19.I, dos individus prop de les gorgues de Salenys (CMG).

El 28.I, un individu prop de Llagostera Residencial (JCO).

El 29.I, dos individus al SOCC de la baga del Montclar, Santa Cristina d'Aro (JCO).

El 24.III, quatre individus a Panedes, Llagostera (JSR).

El 2.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAL).

El 3.V, un individu al puig del Molí de Vent de Castell d'Aro; data excepcionalment tardana per l'espècie (MFR).

L'1.XI, no menys de set individus al tram alt del Ridaura; primera citació post-nupcial (JSR).

El 17.XI, un individu als horts de Castell d'Aro (JCO, RCA).

El 30.XII, quatre individus al SOCC de la бага del Montclar (JCO).

Cruixidell (*Emberiza calandra*). És un migrador i nidificant, escàs.

Sit negre (*Emberiza cia*). És un migrador i hivernant, molt escàs, detectat de finals d'octubre a mitjans de maig.

El 18.I, un individu al comal de la Coma, a Castell d'Aro (RMT).

Verderola (*Emberiza citrinella*). És un migrador molt rar.

El 16.XI, un individu a Panedes, Llagostera; cinquena citació d'aquesta espècie a la Vall on no es citava des de 2013 (JSR*)



Gratapalles (*Emberiza cirlus*). És present tot l'any, relativament comú.

Repicatalons rústic (*Emberiza rustica*). **Accidental.** El 16.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, sotmesa a homologació pel CR-SEO (CAC*).



Repicatalons (*Emberiza schoeniclus*). És un migrador i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la desaparició de les taques de canyissar de la Vall. Comptem amb la seva presència des de mitjans d'octubre a la primera quinzena d'abril. L'anellament ens ha permès saber que els individus que ens visiten provenen de Finlàndia, Noruega, Suècia, Dinamarca, Alemanya, Suïssa, Txèquia, Itàlia i França.

El 6.III, diversos individus a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; últimes citacions pre-nupcials (CAC).

El 6.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (CAC).

LLISTAT D'ESPÈCIES NO NATIVES

Emú (*Dromaius novaehollandiae*)

El 5.V, un individu a la carretera de Pedralta (JCB*).



Ànec de les Bahames (*Anas bahamensis*)

El 9.II, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (probablement el mateix detectat l'any passat i, anteriorment, als Parcs Naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter) (CAC*).

Del 20.IV al 21.IV, s'observa a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RAI, JMA, MAS, XTG).



Periquito (*Melopsittacus undulatus*)

El 3.V, un individu al costat del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JFB*).



Cacatua nimfa (*Nymphicus hollandicus*)

L'11.I, un individu al costat de l'església de Castell d'Aro (JBL).

LLISTAT DE MAMÍFERS

Durant el 2025 es fan diverses actuacions de rescat i assessorament en relació als ratpenats a diferents propietaris així com també amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (JVO). El 7.X s'instal·len dues caixes niu per ratpenats a la zona industrial de Castell d'Aro (JRG). El 21.XI s'instal·len, amb la col·laboració de la propietat, dos refugis per colònies de ratpenat encastades a la paret d'una masia, a prop del Puig d'Arques; es reforça amb dues caixes més en el seu entorn forestal (JVO).

Ratpenat de ferradura petit (*Rhinolophus hipposideros*)

Estatus: insuficientment estudiat. És difícil detectar els seus ultrasons ja que són molt fluixos i cal que l'individu passi molt a prop del micròfon (menys de 5 m).

Les revisions al Monestir de Sant Feliu de Guíxols donen el resultat de 3 individus el 16.IV i 6 el 9.X (JVO, DMM).

Ratpenat de musell llarg o rater gros (*Myotis myotis*)

Estatus: insuficientment estudiat.

Sota el pont de l'autovia que creua la riera de Salenys es va portar a terme una actuació per sorrejar els conductes de desguàs i posar tubs de pvc, així com tapar escletxes. Tot plegat va foragitar alguns individus d'aquesta espècie que els feien servir de refugi. Per tal de corregir aquesta actuació, s'hi instal·là una caixa niu però, després de diverses inspeccions, no se n'ha pogut constatar l'ocupació (JVO, CAC*).



Pipistrel·la comuna (*Pipistrellus pipistrellus*)

Estatus: espècie distribuïda extensament a la Vall.

El 18.IV un individu rescatat amb el patagi d'una ala trencat; derivat al Centre de Recuperació de Fauna a través dels AA.RR. El 26.VII rescat d'un altre individu a la zona de Mascanada de Sant Feliu. (JVO).

Pipistrel·la nana (*Pipistrellus pygmaeus*)

Estatus: espècie distribuïda extensament a la Vall i en zones urbanes.

L'1.IV, un individu a Romanyà de la Selva (EJA*).

El 25.VI una cria observada en el barri Salom de Santa Cristina d'Aro (JVO).

El 26.VIII una serp de ferradura regurgita un ratpenat del gènere



pipistrel·lus caçat d'una teulada d'una masia aïllada en els Camps de Santa Maria de Santa Cristina d'Aro (NSK).

Orellut gris (*Plecotus austriacus*)

Estatus: insuficientment estudiat. És difícil detectar els seus ultrasons ja que són molt fluixos i cal que l'individu passi molt a prop del micròfon (menys de 5 m).

El 9.X un individu a la teulada del Monestir, primera cita en aquest refugi (DMM, JVO).

El dia 20.XI es trasllada al refugi sota la teulada un individu penjat en els passadissos del Monestir de Sant Feliu de Guíxols (DMM, JVO).

Els dies 23.IX i 12.XI un exemplar observat a l'edifici de les Vetlladores, al centre urbà de Sant Feliu (DMM, JVO).

Llebre europea (*Lepus europaeus*)

Estatus: espècie que només és relativament comuna al pla de Panedes i no és rara al pla de la Vall i a d'altres sectors, com els vessants assolellats de Gavarres

Els dies 8.IV i 3.V, un individu a Panedes, Llagostera (JCO, CAC).

El 10.IV, un individu a Fenals d'Amunt, Castell d'Aro (EPB).

El 25.VII, un individu a prop de la urbanització Vall Repòs, Santa Cristina d'Aro (JBX).

Conill de bosc (*Oryctolagus cuniculus*)

Estatus: espècie relativament comuna a la que s'afegeix una certa quantitat d'efectius producte dels alliberaments portats a terme pel col·lectiu de caçadors. Addicionalment també es produeixen alliberaments d'individus domèstics, amb el risc de contaminació genètica de la població salvatge que això comporta.

Eriçó comú, eriçó fosc (*Erinaceus europaeus*)

Estatus: espècie relativament comuna. Es tracta d'una espècie molt afectada pels atropellaments a les diferents vies rodades de la vall, ja que el seu únic mecanisme de defensa és fer-se una bola de punxes, la qual cosa no el protegeix en absolut contra les rodes de cotxes i camions.

El 15.III, dos individus atropellats a l'autovia C-250, a Sant Feliu de Guíxols (ANA).

El 26.III un exemplar atropellat a la carretera de Palamós, a l'alçada de Sant Pol (JVO).

El 30.III un exemplar creuant la via de la carretera de Palamós, a l'alçada de Sant Pol (JVO).

El 8.VII, un individu atropellat a la GIV-6613 a Bell-Lloc, Santa Cristina d'Aro (JBX).

El 10.VIII, es rescata un individu al Guíxols Arena (ECP*).

El 15.IX, es rescata un individu a una carretera de Castell-Platja d'Aro (ECP).



Guilla (*Vulpes vulpes*)

Estatus: espècie relativament comuna.

Mostela (*Mustela nivalis*)

Estatus: espècie molt escassa i en regressió.

El 28.III, un individu a Panedes, Llagostera. (JSR).

Fagina, gorjablanc (*Martes foina*)

Estatus: espècie relativament comuna, que acostuma a sortir quan es posen càmeres fotogràfiques trampa o en atropellaments.

El 30.IV, un individu atropellat a la C-65 a l'alçada de les Barnades (ACS).

El 6.IX, un individu atropellat a la C-31 a l'alçada de Fenals d'Aro, a Platja d'Aro (XIP, LTB, GAZ, JRG, JBX, ANA).

El 8.XI, un individu atropellat a la C-31 a l'alçada del Remei (PMC).

Toixó (*Meles meles*)

Estatus: espècie comuna encara que poc abundant.

El 24.VII, un individu atropellat a la carretera de Bell-Lloc a Romanyà de la Selva (NAR*).



Llúdriga (*Lutra lutra*)

Estatus: espècie molt escassa, en expansió.

Continuen els rastres i les observacions al tram final del Ridaura, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a les basses de reg de Panedes, a Llagostera (JGV, CAC*, JFB, RMT, JRG, XTG, ALM, JVM).



A cavall dels mesos juny i juliol, tres individus (un adult i dos juvenils) captats de manera regular per una càmera trampa al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

Geneta (*Genetta genetta*)

Estatus: espècie relativament abundant.

El 27.VI, un individu a Fenals d'Amunt, a Platja d'Aro (EPB).

El 18.XII, un individu atropellat a la C-65 a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (JBL).

Senglar (*Sus scrofa*)

Estatus: espècie abundant, que arriba a indrets prou humanitzats, per exemple al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, dins l'abocador de Solius o als cascs urbans dels municipis de la Vall.

Cabirol (*Capreolus capreolus*)

Estatus: espècie en expansió, encara que escassa.

El 4.IV, un mascle va saltar el mur perimetral i es trobava dins dels jardins del monestir de Sant Feliu de Guíxols (DMM).

El 13.VII, un individu al Balcar, a Santa Cristina d'Aro (TST).

El 22.VIII, tres individus junts a Panedes, Llagostera (JSR).

Esquirol (*Sciurus vulgaris*)

Estatus: espècie en regressió, encara que relativament comuna.

El 22.VII, un adult seguit per un cadell al càmping del costat dret de la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 22.VII, una parella a un jardí del carrer Salvador Espriu de Platja d'Aro, al sud del puig Pinell (ECP).

El 2.VIII, un adult a tocar de la platja, davant del càmping del costat dret de la desembocadura del Ridaura (CAC).

Ratolí de bosc (*Apodemus sylvaticus*)

Estatus: espècie abundant.

El 21.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT*).



Rata comuna (*Rattus norvegicus*)

Estatus: espècie molt abundant.

Ratolí mediterrani (*Mus spretus*)

Estatus: espècie abundant.

El 28.III, un individu ofegat a una palangana a les costes de Panedes, Llagostera (CAC*).



Dofí mular (*Tursiops truncatus*)

Estatus: espècie regular. Sol ser la de cetaci que es veu més a prop de la costa i, en algun cas, seguint barques d'arrossegament. El 29.IV, uns sis individus davant Pot Salvi, a Sant Feliu de Guíxols (RMT*).



Catxalot (*Physeter macrocephalus*)

Estatus: espècie de presència escassa però regular. El 27.XII, apareix el cadàver d'una cria a la platja Gran de Platja d'Aro (PMC*).



LLISTAT D'ESPÈCIES NO NATIVES

Gat domèstic (*Felis catus domesticus*)

Estatus: espècie molt abundant, amb moltes poblacions assilvestrades, sovint a indrets propers a llocs tan sensibles com el Parc dels Estanys o la bassa del Dofí, a Castell-Platja d'Aro. Està abastament documentat que constitueix un greu problema mediambiental, ja que és un depredador implacable de petits mamífers, ocells, rèptils i tota mena de petits organismes. D'altra banda, és un potencial contaminador genètic si solapa els seus territoris amb el del gat salvatge (*Felis silvestris*), espècie amb la que s'hibrida.

Visó americà (*Neovison vison*)

Estatus: espècie no nativa cada vegada més abundant.

El 10.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (RAM*).



Coipú (*Myocastor coypus*)

Estatus: espècie no nativa molt escassa i localitzada.

El 16.X, un individu a la zona del port de Sant Feliu de Guíxols; segona observació a la Vall (DCX*).



LLISTAT DE RÈPTILS

Tortuga babaua (*Caretta caretta*)

Estatus: espècie escassa a la vall.

El 25.VI, un individu fa una posta de cent un ous a la platja de Sant Feliu de Guíxols; primera vegada que es documenta la reproducció a la vall del Ridaura (PMS*, PBA, ECP, CAC). Aquest individu fou equipat amb un aparell de seguiment per satèl·lit, la qual cosa permeté comprovar que el 8.VII, realitzà una nova posta de cent vint-i-nou ous a la platja del Puig (València). El 15.VII és al mar de Balears, entre el nord d'Eivissa i Mallorca. El 19.VII, pon 127 ous a la platja de Piles (València). La nit del 12.VIII al 13.VIII neixen les primeres vin-i-cinc tortugues a Sant Feliu de Guíxols i les següents nits s'assolí la xifra total de quaranta-vuit, que foren alliberades a la platja de Sant Pol. El 19.VII, un segon individu fa una posta de setanta-quatre ous (se'n deixen 60 i 14 es porten al CRAM) a la platja Gran de Platja d'Aro. Malauradament, va resultar que els ous d'aquesta posta no estaven fecundats (PMC).

El 17.X, apareix el cadàver d'un individu a S'Agaró (ECP).



Tortuga mediterrània (*Testudo hermanni*)

Estatus: espècie d'aparició ocasional, els exemplars de la qual provenen de captivitat, ja que la població salvatge més propera d'aquesta espècie es troba a l'Albera i serres veïnes, a l'Alt Empordà.

El 10.IX, un individu és rescatat per la Policia Municipal de Castell-Platja d'Aro al nucli urbà de castell d'Aro (PMC*).



Tortuga de rierol (*Mauremys leprosa*)

Estatus: espècie escassa, però que, tal i com ha passat en altres zones de Catalunya, poc a poc recupera terreny. És present de manera ocasional, ara per ara, a els contraforts de l'Ardenya, des de Sant Feliu de Guíxols fins a Solius. No és descartable, com ja ha passat en diverses ocasions, que aparegui al llarg del Ridaura o en altres zones de la Vall. Tot i així, ara per ara, no sembla que les seves poblacions siguin gaire abundants ni establertes a la zona.

Tortuga d'estany (*Emys orbicularis*)

Estatus: espècie que sembla que era present als aiguamolls de S'Agaró. L'última citació de l'espècie en aquella zona és del 1970, amb el que la podem donar per extingida a la Vall. De tant en tant es produeix alguna citació d'individus aïllats. Per exemple, fa un parell d'anys se'n va trobar una a la riera de Sant Amanç, de Sant Feliu de Guíxols, els anàlisis de la qual van revelar que es tractava d'un individu procedent de l'est d'Europa.

El 17.VI, un individu d'origen desconegut al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG*).



Dragó comú (*Tarentola mauritanica*)

Estatus: espècie molt abundant en zones humanitzades, present fora d'aquestes de manera àmplia. Requereix la presència de roquissars, pedregams o hàbitats verticals assolellats.

Sargantana cuallarga (*Psammodromus algirus*)

Estatus: espècie molt comuna, sobretot en zones de bosc obert i màquia, o marges de camins. És possiblement el rèptil més abundant de la Vall a nivell numèric.

Llangardaix ocel·lat (*Timon lepidus*)

Estatus: espècie que abans era comuna i ara és escassa a moltes zones, sobretot degut al tancament o pèrdua d'hàbitats oberts. Segueix present amb algunes bones poblacions a zones de mosaic agro-forestal com Solius, els contraforts de l'Ardenya i Gavarres, per passar a ser escassa de les zones forestals més contínues i de les zones més humanitzades.

El 20.VI, un individu a Panedes, Llagostera (JBX).

Sargantana iberoprovençal (*Podarcis liolepis*)

Estatus: espècie relativament comuna, ben distribuïda en tots els punts de roquissar o construcció rural de la Vall. Molt aficionada a les roques o talussos i superfícies inclinades o verticals. Possiblement sigui el segon o tercer rèptil més abundant de la vall, junt amb el dragó comú i la sargantana cua-llarga. (CAC*).



Vidriol (*Anguis fragilis*)

Estatus: Espècie més aviat escassa, però que probablement sigui present en la majoria de fondalades humides i herboses de la Vall. Viu una vida molt discreta entre les arrels i fulles el que fa que potser la seva abundància estigui subestimada.

El 22.IV, un individu a prop del mas Ribot, a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (CVH*).



Serp ilisa meridional (*Coronella girondica*)

Estatus: espècie d'hàbits molt discrets que la fan passar força desapercibuda. Hauria de ser present a la majoria de zones de la Vall que tenen bones poblacions de sargantanes i dragons, que són la seva principal presa. Les seves costums més aviat discretes probablement la facin semblar més escassa del que és.

El 5.VII, un individu és rescatat al carrer Berlin de Platja d'Aro (ECP*).

El 2.IX, un individu juvenil a l'Ardenya (MRB).



Serp blanca (*Zamenis scalaris*)

Estatus: espècie ben distribuïda per tota la Vall, tot i que de difícil detecció, ja que té una activitat parcialment nocturna. S'alimenta sobretot de petits ocells i micro-mamífers.

L'1.X, un individu juvenil a Castell d'Aro (MGM*).

Serp de ferradura (*Hemorrhois hippocrepis*)

Estatus: espècie cada vegada més abundant a la Vall, propera al límit septentrional de l'espècie, que es va expandint cap al nord.

El 12.IV, un individu probablement atropellat a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRT, EPB).

El 26.VI, un individu mort a Santa Cristina d'Aro (JBX).

El 29.IX, un individu juvenil al puig de les Forques, a Sant Feliu de Guíxols (GNS).

Serp de collaret mediterrània (*Natrix astreptophora*)

Espècie present a les zones més mitjanament humides i/o amb presència d'aigua de la Vall, ben distribuïda però de manera escassa excepte en algunes zones amb abundància de basses i preses com amfibis i peixos de petita mida.

El 25.III, dos individus, a Sant Amanç, Sant Feliu de Guíxols (EPB).

Els dies 1.V i 3.V, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CFQ*, JMA).

El 13.V, una femella i dos mascles intentant acoblar-s'hi, a Sant Amanç, Sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 2.VII, un individu rescatat prop del mas Riera, a Santa Cristina d'Aro (PMC).

El 16.X, un juvenil a Llagostera, al principi de la carretera se Sant Llorenç (EJA).



Serp d'aigua (*Natrix maura*)

Estatus: espècie present, tot i que de manera escassa, en la majoria de punts d'aigua i rierols de la Vall. Més lligada a l'aigua que l'espècie anterior, i que hi pot arribar a ser més abundant si les condicions ecològiques hi són bones.

Serp verda (*Malpolon monspessulanus*)

Estatus: l'espècie de serp més abundant (o com a mínim més fàcilment detectable) a la Vall, present gairebé arreu. Una espècie generalista i adaptable que pot aparèixer des de petites clarianes enmig de bosc continu, fins a zones gairebé urbanes.

El 18.III, un individu d'uns 1,7m capturada a S'Agaró i alliberada a un lloc segur (PMC*).

El 26.V, un individu atropellat a l'entrada est de Castell d'Aro (ECP).

L'11.VI es rescata un juvenil caigut a un forat d'aigües a Castell-Platja d'Aro (PMC).

El 3.VII, un individu a tropellat la C-65, a l'alçada de Mobles Mulà (MGX).

El 16.VII, es troba un individu mort a S'Agaró (MLG).

El 4.VIII, un individu immadur ponent ous a prop de les gorgues de Salenys, Santa Cristina d'Aro (SPB).

El 26.IX es rescata una femella de dins un registre d'aiGües de Platja d'Aro (ATG, PMC).



LLISTAT D'ESPÈCIES NO NATIVES

A cavall dels mesos d'abril i maig es porta a terme una acció de retirada del medi de tortugues no natives de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. A més de diversos individus de *Trachemys scripta*, es retira una *Graptemys ouachitensis* i dues *Mauremys sinensis*, que són lliurats als Agents Rurals.

Tortuga d'aigua americana (*Trachemys scripta*)

Estatus: espècie no nativa.

Molt estesa, present a la majoria de masses d'aigües quietes de la vall i al tram final del Ridaura.

Tortuga aligator (*Macrochelys temminckii*)

Estatus: espècie no nativa, d'aparició accidental.

El 22.III, un individu és retirat de la cala del Pi de Platja d'Aro; espècie no nativa que no havia estat citada a la vall del Ridaura (XGG*).



Tortuga tova xinesa (*Pelodiscus sinensis*)

Estatus: espècie no nativa, d'aparició accidental.

El 18.IV, un individu a Castell d'Aro; espècie no nativa que no havia estat citada a la vall del Ridaura (JCP*).



Tortuga mapa anellada (*Graptemys ouachitensis*)

Estatus: espècie no nativa.

Els dies 11.IX i 15.XI, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera; l'11.X tres (CAC*).



LLISTAT D'AMFIBIS

Salamandra comuna (*Salamandra salamandra*)

Estatus: espècie comuna a totes les zones arbrades de la vall. Tot i que no se'n fa un seguiment gaire exhaustiu, és una espècie que a la vall ocupa sobretot punts d'aigua clara i neta en zones boscoses. Si no hi ha hagut grans pertorbacions en aquests hàbitats, cal esperar que no hi hagi grans fluctuacions en les seves poblacions.

Tritó palmat (*Lissotriton helveticus*)

Estatus: espècie més aviat escassa a la zona. Ocupa basses i rieres de poca corrent. Manté algunes poblacions saludables a els contraforts de les Gavarres i de la plana de la Selva, però sembla absent a l'Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i el fons de vall, amb només alguna observació al tram mig del Ridaura.

Tritó verd (*Triturus marmoratus*)

Estatus: espècie de presència estesa a la vall però, en general, d'abundància escassa. Ocupa basses i rieres de poca corrent. De la mateixa manera que el tritó palmat, també manté bones poblacions a els contraforts de les Gavarres i la Plana de la Selva, però en aquest cas també ocupa l'Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i fins i tot apareix per zones properes al Ridaura.

El 15.III, un individu a Romanyà de la Selva (CAC*).

El 22.III, un individu a cal Ralet, Sant Feliu de Guíxols (CAC).



Gripau d'esperons (*Pelobates cultripes*)

Estatus: espècie més aviat escassa, i amb distribució bastant reduïda a la vall. Tot i que en zones properes de la plana de la Selva hi troba un dels seus punts forts a nivell català, a la vall d'Aro la seva presència està bastant restringida a les àrees de mosaic agro-forestal de l'interior, i també amb alguna població aïllada a els contraforts de les Gavarres marítimes. Per la resta, és absent de les zones més boscoses i accidentades i de gran part del fons de vall.

El 16.V, diverses larves a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro (CAC*).

Els dies 13.VI i 26.VI, diverses larves a la bassa de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro (CAC).



Gripau comú (*Bufo spinosus*)

Estatus: espècie abundant en les zones arbrades de la vall. Acostuma a reproduir-se en rieres, o en basses de gran entitat. Es manté com a espècie present a tot arreu a on hi hagi les condicions per la seva reproducció, essent sempre més abundant en zones arbrades i accidentades i una mica menys en zones planes i més obertes.

Gripau corredor (*Epidalea calamita*)

Estatus: espècie encara abundant, sobretot a zones obertes i planes de la vall. Amb unes preferències oposades a l'espècie anterior, ocupa sobretot basses (o en menor mesura, cursos d'aigua) que tendeixen a assecar-se i zones més aviat obertes i planes. Per tant, podem esperar trobar-lo a la majoria de zones excepte als punts més accidentats i més tancats.

Reineta meridional (*Hyla meridionalis*)

Estatus: espècie abundant. Es reproduïx a la majoria de basses temporànies i permanents de la vall. No acostuma a fer servir aigües corrents per reproduir-se, però per la resta és una espècie que posa música a les nits de primavera i estiu de la majoria de basses de la vall.

Granota verda (*Pelophylax perezi* / *Pelophylax kl. Grafi*)

Espècies indistingibles a nivell morfològic, que haurien de ser present a la majoria de cossos d'aigua permanent de la vall. Tot i això, prospeccions recents ens la mostren molt més escassa del que s'hauria d'esperar a Sant Feliu de Guíxols, el que fa pensar que potser l'espècie sigui més escassa del que realment sembla.

LLISTAT D'ESPÈCIES NO NATIVES

Granota pintada (*Discoglossus pictus*)

Estatus: espècie realment abundant i estesa. Invasora, malgrat que ja fa dècades que va arribar a la vall, no sembla interferir excessivament en altres espècies d'amfibi. Tot i que prefereix basses i cursos d'aigua que s'assequen fàcilment, és capaç de reproduir-se gairebé a qualsevol punt. De la mateixa manera, tot i preferir planes inundables, apareix fins ben amunt de les Gavarres i l'Ardenya, amb el que podem esperar trobar-la arreu, acostant-se fins i tot molt als pobles o entrant-hi.

PEIXOS D'AIGÜES CONTINENTALS

Espinós o escanyagats (*Gasterosteus aculeatus*)

Aquest any se'n comprova la reproducció a l'estany artificial dels Jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols, on s'havia introduït l'any 2024. D'antra banda, ja no es va detectar a la bassa dels horts municipals de Sant Feliu de Guíxols, on s'havia introduït anteriorment (DMM).

Anguila europea (*Anguilla anguilla*)

El 22.II, a la desembocadura del Ridaura, s'observà un individu depredat per un corb marí gros (CAC).

El 30.VI, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, s'observà un individu depredat per un corb marí gros de segon any, tot i que acabà encapolint-se (CAC).

El 6.VIII, després d'una avaria a l'EDAR, amb un gran vessament d'aigua bruta, es rescata fins a nou individus juvenils a la desembocadura del Ridaura, que són alliberats al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 17.XI, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, s'observà un individu depredat per un bernat pescaire (CAC*).



Es pot trobar la llista completa dels peixos marins i d'aigües continentals de la vall del Ridaura a l'enllaç:

<https://ocellsvallridaura.cat/Peixos/ELS%20PEIXOS%20DE%20LA%20VALL%20DEL%20RIDAURA.pdf>


PAPALLONES DIÛRNES

Al web *Els ocells de la vall del Ridaura ...i també altres grups d'organismes* (<https://ocellvallridaura.000webhostapp.com/les-papallones-de-la-vall-del-ridaura>), es fa una recopilació històrica de totes les espècies de papallones diürnes amb imatges a la vall del Ridaura.

Aquest any es continuà amb el recorregut CBMS (*Catalan Butterfly Monitoring Scheme*) al comal de la Coma de Castell d'Aro pel seguiment de les poblacions de papallones diürnes (RMT, CAC).

L'itinerari se situa a la falda sud del massís de les Gavarres, al municipi de Castell-Platja d'Aro. Consta de 9 seccions i una llargada total de 1.421 metres; es troba a una alçada mitjana de 68 metres sobre el nivell del mar. Els comptatges es van iniciar l'any 2024.

La major part del transsecte transcorre per la ja consolidada Ruta de les Fonts de Castell d'Aro. Comença al darrera de l'Espai Escoles Velles de Castell d'Aro i, vorejant un camp de conreu, salta cap a la part més baixa del torrent de la Coma. La secció 2 hi va paral·lela fins que s'atansa a la secció 3 on atrapa el camí que porta a la pedrera d'en Sitjar. A partir d'aquí les seccions 4, 5 i 6 pràcticament es van encadenant, endinsant-se en un bosc de ribera i seguint el torrent de ben a prop. Les seccions 7, 8 i 9 remunten el comal on el bosc es converteix en un alzinar mediterrani amb pins, que va patir un incendi el juliol de 2022.



Mostreig i sèrie de dades

Anys amb dades: 2 [2024-2025]

Espècies registrades: 45 (mitjana anual: 45)

Exemplars comptats: 1876 (mitjana anual: 1876)

Nombre de mostrejos: 30



Variables climàtiques

Temp. mitjana anual: 15 °C

Mitjana mínimes de gener: 4 °C

Mitjana màximes de juliol: 29 °C

Precipitació anual: 701 mm



La gran diferència entre els dos anys és la pluviometria. El 2024 va ser molt sec en general i el 2025 va tenir una primavera molt plujosa que va afectar seriosament al neixement de les espècies més primerenques (RMT).

Més informació sobre el projecte: <https://www.catalanbms.org/ca/> i sobre l'itinerari de la Ruta de les Fonts, a l'enllaç <https://www.catalanbms.org/ca/itineraris/247/>

Marroneta de l'om (*Satyrrium w-album*)

El 7.VI, s'observà dos individus a les Eroles, a Castell d'Aro; el 8.VI un. Aquesta espècie de papallona diürna no havia estat citada a la vall del Ridaura (RMT*).

Marroneta de l'om (*Satyrrium w-album*) (RMT*).



Monarca (*Danaus plexippus*)

El 26.VI, s'observà un individu a Platja d'Aro; espècie de papallona diürna que no havia estat citada a la vall del Ridaura (DKM*).

Monarca (*Danaus plexippus*) (DKM*).



Faune gran (*Hipparchia fagi*)

El 30.X, s'observà un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera. Data molt tardana per aquesta espècie de papallona que no havia estat citada a la vall del Ridaura des de 1928 (Agenjo, R. *Morfología y distribución geográfica en España de Hipparchia fagi* (Sc., 1763) Revista Española de Entomología, XLV, cuaderno 1º-4º: 15-28.; pàg. 22. (1969)). (CAC*).

Faune gran (*Hipparchia fagi*) (CAC*).



Malgrat no haver-se observat cap individu adult d'arlequí (*Zerynthia rumina*) a Panedes, Llagostera, sí que es va trobar posta de l'espècie sobre la seva planta nàrtica on l'any passat s'havia observat (JSR*).

Posta d'arlequí (*Zerynthia rumina*). (JSR*).



Tot i que el seguiment no ha tingut la mateixa intensitat dels darrers anys, durant aquest continuaren les observacions de sageta negra (*Gegenes nostradamus*). L'observació d'una còpula a Castell d'Aro, el 3.VIII, suggereix el possible establiment d'aquesta espècie a la Vall (CAC, RMT*).

Sageta negra (*Gegenes nostradamus*) (RMT*)



Mentre que fins l'any passat només es tenia registrades tres citacions de papallona tigre (*Danaus chrysippus*) a la vall del Ridaura, aquest any s'han registrat sis observacions de set individus: una el 9.VI a Panedes, Llagostera (JSR) i les altres cinc a Platja d'Aro, el 24.IX dos individus (RMT*), el 7.X (OCY), el 19.X (NFM), el 30.X (CRP) i el 2.XI (AMS).

Papallona tigre (*Danaus chrysippus*) (RMT*)



A continuació es relaciona totes les espècies citades recentment, ressaltant en negreta, les detectades aquest any i en grana les noves espècies a la Vall:

Capgròs comú *Carcharodus alceae*
Capgròs fosc *Muschampia floccifera*
Merlet comú *Pyrgus malvoides*
Merlet ruderal *Pyrgus armoricanus*
Murri de la pimpinella *Spialia sertorius*
Daurat fosc *Thymelicus acteon*
Dard ros *Ochlodes sylvanus*
Sageta negra *Gegenes nostrodamus*
Papallona zeburada *Iphiclides feisthamelii*
Papallona reina *Papilio machaon*
Arlequí *Zerynthia rumina*
Angelet *Leptidea sinapis*
Blanca de la col *Pieris brassicae*
Blanqueta de la col *Pieris rapae*
Blanqueta de la mitja lluna *Pieris mannii*
Blanqueta perfumada *Pieris napi*
Pòntia comuna *Pontia daplidice*
Aurora *Anthocharis cardamines*
Monarca *Danaus plexippus*
Papallona tigre *Danaus chrysippus*
Marbrada comuna *Euchloe crameri*
Safranera de l'alfals *Colias croceus*
Cleòpatra *Gonepteryx cleopatra*
Llimonera *Gonepteryx rhamni*
Coure verdet *Tomares ballus*
Morada *Favonius quercus*
Tecla *Thecla betulae*
Morada del freixe *Laeosopis roboris*
Marroneta de l'alzina *Satyrrium esculi*
Marroneta del roure *Satyrrium ilicis*
Marroneta de l'om *Satyrrium w-album*
Verdeta d'ull blanc *Callophrys rubi*
Verdeta d'ull ros *Callophrys avis*
Coure comú *Lycaena phlaeas*
Blaveta estriada *Leptotes pirithous*
Blaveta dels pèsols *Lampides boeticus*
Blaveta de l'heura *Celastrina argiolus*
Turquesa europea *Glaucopsyche alexis*
Turquesa meridional *Glaucopsyche melanops*

Blaveta de la farigola *Pseudophilotes panoptes*
Blaveta lluent *Lysandra bellargus*
Griseta mediterrània *Lysandra hispana*
Blaveta de la trepadella *Polyommatus thersites*
Blaveta comuna *Polyommatus icarus*
Moreneta meridional *Aricia agestis*
Papallona del lledoner *Libythea celtis*
Papallona tigre *Danaus chrysippus*
Bruna boscana *Pararge aegeria*
Margera comuna *Lasiommata megera*
Lleonada de matollar *Coenonympha arcania*
Saltabardisses europea *Pyronia tithonus*
Saltabardisses de solell *Pyronia cecilia*
Saltabardisses cintada *Pyronia bathseba*
Bruna dels prats *Maniola jurtina*
Escac ibèric *Melanargia lachesis*
Bruixa *Brintesia circe*
Faune gran *Hipparchia fagi*
Faune bru *Hipparchia statilinus*
Faune ziga-zaga *Hipparchia fidia*
Papallona de l'arboç *Charaxes jasius*
Tornassolada petita *Apatura ilia*
Argentada comuna *Argynnis paphia*
Mirallets *Issoria lathonia*
Donzella violeta *Boloria dia*
Nimfa boscana *Limenitis camilla*
Nimfa mediterrània *Limenitis reducta*
Vellutada del salze *Nymphalis antiopa*
Nimfa dorment *Nymphalis polychloros*
Atalanta *Vanessa atalanta*
Migradora dels cards *Vanessa cardui*
Paó de dia *Aglais io*
Papallona de la c blanca *Polygonia c-album*
Damer puntejat *Melitaea cinxia*
Damer de la centàurea *Melitaea phoebe*
Damer roig *Melitaea didyma*
Damer dels conillets *Melitaea deione*
Brocat variable *Euphydryas aurinia*

ESPÈCIES NO NATIVES

Barrinadora dels geranis *Cacyreus marshalli*

OBSERVADORS 2025: RMT, CAC, JSR, PMJ, ECP, NFM, OCY, TAJ, MBC, MLG, DKM, CRP, AMS.

PAPALLONES NOCTURNES

Al web *Els ocells de la vall del Ridaura ...i també altres grups d'organismes* (<https://ocellsvallridaura.cat/les-papallones-nocturnes-de-la-vall-del-ridaura>), es fa una recopilació històrica de totes les espècies de papallones nocturnes amb imatges a la vall del Ridaura.

Durant el mes de maig, arreu de Catalunya, es va observar una forta entrada d'individus migrants de la falena esfinx ratllada (*Hyles livornica*). Aquest fenomen també es va detectar a la nostra Vall, amb nombroses observacions (MMS, CAC, NAR*, JRT).



Des de primers de setembre a mitjan novembre es va detectar una notable presència de la falena bella carmesina (*Utetheisa pulchella*). Aquesta espècie que, no essent una migradora en el sentit estricte de terme, sí que pot protagonitzar grans desplaçaments cap al Nord d'Europa, especialment en estius càlids i ventosos. A diferents punts de Catalunya se'n va observar concentracions importants, ja que també s'ha reproduït aquí. A la nostra zona, destacaren les concentracions de can Llac de Romanyà i de Panedes on, els dies 10.IX i 11.IX, n'hi havia centenars als camps on hi creixia l'anomenada herba berruguera (també anomenada gira-sol, mira-sol, passerella, cua d'escorpí) (*Heliotropium europaeum*), una de les seves plantes preferides. A més d'aquestes concentracions s'observà arreu, tant individus solitaris com grups més o menys nombrosos (CAC*).

Hypena obsitalis

El 3.I, s'observà un individu al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (RMT*).



Atralata albofascialis

El 20.IV, s'observà un individu a les Costes de Panedes; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Anania verbascalis

El 3.V, s'observà un individu a prop de can Roig, a Llagostera; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Crombrughia cf. distans

El 17.V, s'observà un individu a prop de la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Hemithea aestivaria

El 3.VI, s'observà un individu a Panedes, Llagostera; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (JSR*).



Athetis (Proxenus) hospes

El 4.VII, s'observà un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (RMT*).



Achyra nudalis

El 5.IX, un individu al mas Roig de Llagostera; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Thyatira batis

L'1.X, un individu a Sant Feliu de Guíxols; espècie de falena que no havia estat citada a la vall del Ridaura. (CMN).



Patania ruralis

El 9.X, un individu al Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Crocallis dardoinaria

El 18.X, un individu al rètol del Mas Tapioles, Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Mniotype occidentalis

El 18.X, un individu al rètol del Mas Tapioles, Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Watsonalla binaria

El 2.XI, un individu al rètol del Mas Tapioles, Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Scopula minorata

El 2.XI, un individu al rètol del Mas Tapioles, Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Larentia clavaria

El 2.XI, un individu al rètol del Mas Tapioles, Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Nodaria nodosalis

El 2.XI, un individu al rètol del Mas Tapioles, Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Dryobotodes tenebrosa

El 16.XI, un individu al rètol del Mas Tapioles, Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Colotois pennaria

El 20.XII, dos individus al rètol del Mas Tapioles, Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Orthonama obstipata

El 20.XII, un individu al rètol del Mas Tapioles, Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



ODONATS

Al web *Els ocells de la vall del Ridaura ...i també altres grups d'organismes* (<https://ocellsvallridaura.cat/els-odonats-de-la-vall-del-ridaura>), es fa una recopilació històrica de totes les espècies d'odonat amb imatges a la vall del Ridaura.

Malgrat que aquest any les pluges van solucionar la majoria de problemes d'escassetat d'aigua a basses i rieres, els darrers anys de sequera afectaren molt significativament i negativament les diferents poblacions d'odonats de la Vall, que encara no han tingut temps de recuperar-se. Això ha comportat la no detecció d'algunes espècies més o menys comunes en anys precedents a la sequera. En tot cas s'ha produït la detecció d'una nova espècie, la **pipa aureolada** (*Trithemis kirbyi*), espècie esperada, donada la seva penetració a Catalunya de Sud a Nord.

Pipa aureolada (*Trithemis kirbyi*)

L'11.X, s'observà un mascle a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera; espècie d'odonat que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).

Pipa aureolada (*Trithemis kirbyi*) (CAC*).



Aquest any s'observà força individus d'espiadimonis blau (*Aeshna affinis*), espècie més aviat escassa a la Vall. Podria ser que, donada l'estratègia reproductora d'aquesta libèl·lula de pondre en sec en llocs d'aigües temporals, la seva població s'hagi vist afavorida pels darrers anys de sequera (CAC).

Espiadimonis blau (*Aeshna affinis*) (CAC*).



A continuació es relaciona les 44 espècies d'odonats citades a la vall del Ridaura, ressaltant en negreta, les detectades aquest any i en grana les noves espècies a la Vall:

Damisel·la endolada *Calopteryx haemorrhoidalis*

Damisel·la blava *Calopteryx virgo*

Damisel·la enguantada *Calopteryx xanthostoma*

Vimetaire occidental *Chalcolestes viridis*

Alaestès verd *Lestes barbarus*

Alaestès petit *Lestes virens*

Cavallet d'hivern comú *Sympecma fusca*

Donzell mercurial *Coenagrion mercuriale** (<1957)

Donzell de ferradura *Coenagrion puella*

Donzell de trinxant *Coenagrion scitulum*

Patge de copa *Enallagma cyathigerum*

Ullblau *Erythromma lindenii*

Ullviu petit *Erythromma viridulum*

Llantió elegant *Ischnura elegans*

Llantió iberomagribí *Ischnura graellsii*

Llantió petit *Ischnura pumilio*

Ferrer cama-negre *Pyrrhosoma nymphula*

Ferrer cama-roig *Ceragrion tenellum*

Polaines ruborós *Platycnemis acutipennis*

Polaines lívid *Platycnemis latipes*

Espiadimonis blau *Aeshna affinis*

Espiadimonis de fanal *Aeshna cyanea*

Espiadimonis tardorenc *Aeshna mixta*

Emperador divagant *Anax ephippiger*

Emperador blau *Anax imperator*

Emperador menor *Anax parthenope*

Espectre clar *Boyeria irene*

Rodadits de bassa *Gomphus pulchellus*

Tallanassos petit *Onychogomphus forcipatus*

Tallanassos gros *Onychogomphus uncatus*

Passabarrancs comú *Cordulegaster boltonii*

Esparver de l'aigua *Oxygastra curtisii*

Sagnador escarlata *Crocothemis erythraea*

Libèl·lula quadrimaculada *Libellula quadrimaculata*

Libèl·lula ampla *Libellula depressa*

Parot cuanegre *Orthetrum cancellatum*

Parot blau *Orthetrum coerulescens*

Parot pruinós *Orthetrum brunneum*

Pixaví nervat *Sympetrum fonscolombii*

Pixaví llis *Sympetrum meridionale*

Pixaví de lligacama *Sympetrum sinaiticum*

Pixaví estriat *Sympetrum striolatum*

Pipa vinosa *Trithemis annulata*

Pipa aureolada *Trithemis kirbyi*

OBSERVADORS 2025: CAC, RMT, PMJ, JSR, NFM.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES: * Wenger, O. P. 1963. *Libellenbeobachtungen in Südfrankreich und Spanien (Odonata)*. Mitt. Schweizer Ent. Ges., 35: 255-269.

NOTES ADDICIONALS D'ALTRES GRUPS D'INVERTEBRATS TERRESTRES

Es pot trobar la llista completa d'invertebrats terrestres a l'enllaç:

<https://ocellsvallridaura.cat/ALTRES%20INVERTEBRATS%20TERRESTRES%20-V5.pdf>

ORTOPTERS


Tètrix de les llacunes (*Tetrix ceperoi*). El 2.VIII, almenys un individu (confirmat per Axel Hochkirch a iNaturalist) a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Grill dels torrents (*Pteronemobius lineolatus*)

El 24.VIII, es grava el cant (confirmat per Rafael Carbonell) de no menys de dos individus al tram alt del Ridaura; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).

El 26.VIII, es grava el cant d'almenys un individu a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).



MOL·LUSCS CONTINENTALS

Monacha cartusiana


L'1.I, almenys un individu adult al costat del Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Euconulus alderi



L'1.I, mitjançant un microscopi portàtil, es confirmà que els individus observats a la llera del Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro, pertanyen a aquesta espècie, que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).

Més endavant, trobat a diversos indrets de la Vall (CAC).



Euconulus fulvus

El 3.I, sota el pont de carril bici que salva la riera de Salenys es trobà una conquilla que, mitjançant un microscopi portàtil, s'identificà com a pertanyent a aquesta espècie, que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Trochulus hispidus

El 3.I, un individu a la riera de Salenys, sota el pont del carril bici; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Carychium minimum

El 4.I, diversos individus al Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).

Més endavant, trobat al Ridaura, a l'alçada de la Costa de l'Alou (CAC).



Pupilla bigranata

L'11.I, un individu prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Lauria sempronii

El 17.I, almenys dos individus al costat del pont del carril bici, sobre la riera de Salenys; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Truncatellina callicratis

El 19.I, almenys dos individus al costat del Ridaura, prop de Mobles Mulà; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).

Més endavant, trobat a diversos indrets de la Vall (CAC).



Arion magnus / vulgaris

El 25.I, un individu a la riera de Salenys; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Vallonia pulchella

El 26.I, diversos individus al Ridaura, a l'alçada de la Costa de l'Alou; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Vertigo moulinsiana

El 26.I, diversos individus al Ridaura, a l'alçada de la Costa de l'Alou; espècie que no se citava a la vall del Ridaura des del sgle XIX (CAC*).



Llimac eriçat (*Arion intermedius*)

L'1.II, un individu al Ridaura, a l'alçada de la Costa de l'Alou; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Trochoidea trochoides

El 6.II, diversos individus a les dunes de Sant Pol; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Helicigona lapicida

El 25.II, almenys dos individus a can Llac de Romanyà; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).

Més endavant, trobat a diversos indrets de la Vall (CAC).



Ferussacia folliculum

El 25.II, diversos individus a can Llac de Romanyà; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).

Més endavant, trobat a diversos indrets de la Valls (CAC).



Vallonia enniensis

El 27.II, diversos individus al comal de la Coma de Castell d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).




Acanthinula aculeata

El 2.III, un individu a Solius, a Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (MLX*).



Vitrea subrimata

El 2.III, un individu a Solius, a Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (MLX*).



ESPÈCIES NO NATIVES

Drusia valenciennii

El 6.III, un individu a cal Ralet, a Sant Feliu de Guíxols; espècie de distribució natural al sud-oest peninsular, que no havia estat citada a Catalunya (CAC*). El 8.III s'hi observà una còpula, la qual cosa indica la presència d'una població establerta (CAC*).



El 22.IV, s'observà una altra còpula al carril bici, a prop del puig de la Gramoia, a Castell d'Aro, a uns 3,1 Km en línia recta de les citacions anteriors (CAC*).



Succinea costaricana

El 20.VIII, un individu sobre la farigola de l'oasi de papallones del Parc dels Estanys de Platja d'Aro; espècie no nativa de cargol que no havia estat citada a la vall del Ridaura (JRG*).



DADES D'ANYS ANTERIORS

Deroceras altimirai

L'1.XII.2024, almenys un individu adult al Ridaura, a l'alçada de cal Cuc, a Castell d'Aro, identificat per Omar Sánchez Fernández mitjançant anàlisi de genitèlia interna; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*). El 3.I, un altre individu adult al Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro. Més endavant se'n troben diferents individus a diferents llocs de la Vall (CAC).



GASTERÒPODES AQUÀTICS PULMONATS

Galba truncatula

El 3.I, un individu a la riera de Salenys, sota el pont del carril bici; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).

Més endavant, trobat al Ridaura (CAC).



Ancylus fluviatilis

El 12.I, diversos individus a la riera de la Coma, a Castell d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).

Més endavant, trobat a les rieres de Salenys de Canyet i al Ridaura (CAC).



ESPÈCIES NO NATIVES

Potamopyrgus antipodarum

El 31.I, diversos individus al Ridaura, a l'alçada de la Costa de l'Alou; espècie no nativa invasora que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).




ESCARABATS CERAMBÍCIDS

Certallum ebulinum

El 13.IV almenys un individu prop de la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro; espècie citada a la bibliografia, a Sant Feliu de Guíxols però no fotografiada recentment (CAC*).


González Peña, C.F., Vives, E. & de Sousa, A.J.; (2007); *Nuevo catálogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira.*; Monografías S.E.A., 12.



Stenurella nigra

L'1.V, diversos individus a prop de la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro; espècie citada a la bibliografia, a Santa Cristina d'Aro però no fotografiada recentment (CAC*).

González Peña, C.F., Vives, E. & de Sousa, A.J.; (2007); *Nuevo catálogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira.*; Monografías S.E.A., 12.



Paracorymbia stragulata

El 31.V, diversos individus al comal de la Coma de Castell d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Pseudovadonia lívida

L'1.VI, diversos individus a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Clytus rhamni

L'1.VI, diversos individus a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Stictoleptura scutellata

L'1.VI, un individu a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Chlorophorus sartor

El 21.VI, diversos individus a la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Ergates faber

El 14.VII, un individu al carrer Cim d'Aro de Castell-Platja d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (JRT*).



BERNATS (*PENTATOMIDAE*)

Aquest any s'ha continuat la recerca de camp d'aquesta família d'hemípters, de la que no s'ha trobat dades bibliogràfiques concretes de la vall del Ridaura.

Ancyrosoma leucogrammes

El 15.VII, diversos individus prop de la bassa de la Costa de l'Alou; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



MANTODEUS

DADA D'ALTRES ANYS

Iris oratoria

El 8.X.2020, un individu entre l'Institut de Castell d'Aro i la carretera de S'Agaró; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (AGB*).



CIGALES

Cigala grossa (*Lyristes plebejus*)

El 22.VI, un individu a prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; tercera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (TAJ).

ARÀCNIDS

Es pot trobar la llista completa dels aràcnids de la vall del Ridaura a l'enllaç:

<https://ocellsvallridaura.cat/AR%C3%80CNIDS%20VALL%20DEL%20RIDAURA.pdf>

1.ORDRE ARANEAE

Amaurobius sp.

El 12.I, un individu al torrent de Canyet, Castell d'Aro, espècie d'aràcnid que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Cyrba algerina

El 12.I, un individu al torrent de Canyet, Castell d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Euophrys sp.

El 13.I, un individu al nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols, espècie d'aràcnid que no havia estat citada a la vall del Ridaura (RMT*).



Trochosa ruricola

El 19.I, un individu al tram mig del Ridaura, Santa Cristina d'Aro d'Aro; espècie d'aràcnid que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Liophrurillus flavitarsis

El 25.II, un individu a can Llac de Romanyà; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Amaurobius erberi

El 27.II, un individu a la Ruta de les Fonts, Castell d'Aro; espècie d'aràcnid que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Icius sp.

El 12.IV, al pla de les Eroles, Castell d'Aro, espècie d'aràcnid que no havia estat citada a la vall del Ridaura (RMT*).



Frontinellina frutetorum

El 14.IV, dos individus a les Costes de Panedes; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (RMT*).



Aphantaulax trifasciata

L'11.V, al pla de les Eroles; espècie d'aràcnid que no havia estat citada a la vall del Ridaura (RMT*).



Zilla diodia

L'1.VI, un individu a can Llac, a Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Neoscona adianta

L'1.VI, un individu a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



Scytodes velutina

El 12.VIII, un individu al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (RMT*).



Cyrtarachne ixoides

El 28.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (RMT*).



Philodromus cf margaritatus

El 13.XII, un individu al tram alt del Ridaura, Llagostera; espècie d'aràcnid que no havia estat citada a la vall del Ridaura (RMT*).



2.ORDRE OPILIONS

Odiellus sp.

El 15.III, dos individus a Romanyà; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



ASCALÀFIDS

Aquest any s'ha portat a terme una certa prospecció d'aquest grup d'insectes, així com una revisió dels arxius fotogràfics d'alguns membres del G. N. Sterna (CAC*, RMT, NFM, MRC) per tal de detectar les diverses espècies presents d'aquest grup a la vall del Ridaura. Malgrat que també s'ha fet una recerca bibliogràfica, aquesta no ha aportat dades concretes de la Vall de cap espècie d'aquest grup.

Tant aquest any, com les imatges d'arxiu només han aportat dades de les dues següents espècies:

Libelloides cunii

Aquesta és l'espècie més comuna a la Vall.



Libelloides longicornis



NOTES ADDICIONALS D'INVERTEBRATS MARINS

Durant el mes de març, l'hidrozoï anomenat popularment barqueta de Sant Pere (*Verella vellella*) protagonitzà arribades massives a les nostres platges. Aquest fet és un efecte de la sobrepesca de les espècies que s'alimenten d'aquests animals, així com de l'augment progressiu de la temperatura de l'aigua (RMT*).



NO NATIVA

Bursatella leachii

El 8.XI, dos individus copulant i ponent a la badia de Sant Feliu de Guíxols; espècie de llebre de mar que no havia estat citada a la vall del Ridaura. Aquesta espècie no nativa, procedent del Mar Roig, és de gran mida (els exemplars fan uns 20-25 cm). Està documentada a pocs llocs a Catalunya (Badia d'Alfacs, Central de Cubelles, Piscines del Fòrum a Barcelona, l'Espigonet de Roses) i ara al fons fangós de la badia de Sant Feliu de Guíxols, a partir de 6 metres de profunditat. És una raresa i no ha de preocupar que pugui esdevenir invasora, ja que s'alimenta bàsicament de biofilms de cianobacteries i necessita aigües molt tranquil·les amb fons fangosos per viure (XSC*).



NOTES ADDICIONALS DE VEGETALS

ARBRAT SINGULAR

Aquest any es va reiniciar la recerca d'arbrat singular a la vall del Ridaura, amb la creació d'un grup de treball dins el G. N. Sterna, liderat per Carles Palacios Ruzafa. Es poden veure les primeres fitxes d'arbres avaluats i les referències de nous arbres pendents d'avaluació a l'enllaç: <https://ocellsvallridaura.cat/larbrat-singular-de-la-vall-del-ridaura>

ARBRES AVALUATS

Plataner monumental (*Platanus x hispanica*)

Arbre que pel que sembla va ser tallat i va rebrotar en diferents besses, les quals s'han acabat soldant formant una única soca de mides gegants. Forma part d'un trio de plataners en línia (tots ells tallats i rebrotats), de mides gegants, últims exemplars del que sembla que hauria estat una antiga filada de plàtans seguint el rec.

Situació: bosquet al cantó de la Llar d'Infants Municipal, Castell-Platja d'Aro.
UTM 31T / 502968,449E / 4628777,828N.

Volt del canó: 8,33m (a 20cm del sòl).

Alçària total: 18.8m.

Capçada mitjana: 13m.

(CPR*, JPR, CAC).



Pinastre 1 monumental (*Pinus pinaster*)

En algun moment va ésser escapçat i presenta un cim característic, molt dens, ample, arrodonit i planer.


Situació: en un prat entre la carretera de s'Agaró, el Ridaura i l'escola Vall d'Aro., Castell-Platja d'Aro. Es troba situat just tocant les baranes de la carretera de s'Agaró, al mateix tal·lus de la via. UTM 31T / 502898,782E / 4628682,8N.

Volt del canó: 2,93m (a 1,30m del sòl).

Alçària total: 15,3m.

Capçada mitjana: 14,15m.

(CPR*, JPR, CAC).



Pinastre 2 (*Pinus pinaster*)

La banda Est no presenta gaire branques i algunes es veuen mortes.

Situació: en un prat entre la carretera de s'Agaró, el Ridaura i l'escola Vall d'Aro, Castell-Platja d'Aro. Es troba situat molt a prop de la carretera de s'Agaró. UTM 31T / 502908,763E / 4628655,419N.

Volt del canó: 2,59m (a 1,30m del sòl).

Alçària total: 24,9m.

Capçada mitjana: 11,85m.

(CPR*, JPR, CAC).



Pinastre 3 aïllat (*Pinus pinaster*)

Té a pocs metres un parell més d'exemplars de pinastres però de mida més petita. Presenta una ferida amb pèrdua d'escorça de la qual li raja una columna de resina ja solidificada i gruixuda.

Situació: entre la carretera de s'Agaró, el Ridaura i l'escola Vall d'Aro, Castell-Platja d'Aro. Es troba situat molt a prop de la carretera de s'Agaró. UTM 31T / 502984,874E / 4629346,427N.

Volt del canó: 1,97m (a 1,30m del sòl).

Alçària total: 18,45m.

Capçada mitjana: 13m.

(CPR*, JPR, CAC).



Alzina 1 pessebre (*Quercus ilex ilex*)

Juntament amb dos lledoners de mides també remarcables formen un conjunt molt bell que atrau l'atenció.

Situació: carrer de la Coma, zona alta del pessebre vivent, Castell-Platja d'Aro. UTM 31T / 502581,924E / 4628715,949N.

Volt del canó: 2,55m (a 1,30m del sòl).

Alçària total: 24,05m.

Capçada mitjana: 11,05m.

(CPR*).



Lledoner 1 triple del pessebre (*Celtis australis*)

Juntament amb una alzina i un altre lledoner de mides també remarcables formen un conjunt molt bell que atrau l'atenció. La seva morfologia és realment curiosa, sortint les tres besses a 40 cm del sòl.

Situació: carrer de la Coma, zona alta del pessebre vivent, Castell-Platja d'Aro. UTM 31T / 502588,441E / 4629345,486N.

Volt del canó: 3,74m (a 0,4m del sòl).

Alçària total: 14,5m.

Capçada mitjana: 14,3m.

(CPR*).



Lledoner 2 del pessebre (*Celtis australis*)

Juntament amb una alzina i un altre lledoner de mides també remarcables formen un conjunt molt bell que atrau l'atenció.

Situació: carrer de la Coma, zona alta del pessebre vivent, Castell-Platja d'Aro. UTM 31T / 502572,094E / 4629346,784N.

Volt del canó: 2,10m (a 1,30m del sòl),

Alçària total: 10,95m.

Capçada mitjana: 13m.
(CPR*).



ARBRES PENDENTS D'AVALUACIÓ

Pollancre (*Populus nigra*).

Sant Llorenç, Llagostera. 2°54'29" E / 41°48'30" N

Uns 30 metres d'altura i 4.05 metres de perímetre de tronc.

(CAC*).



Lledoner (*Celtis australis*)

Sant Llorenç, Llagostera. 2°55'15" E / 41°48'53" N

Uns 12 metres d'altura i més de 4 metres de perímetre de tronc (diverses besses).

(CAC*).



Pi pinyer (*Pinus pinea*).

Tram alt del Ridaura, Llagostera. 2°54'29" E / 41°48'30" N

Uns 2.45 metres de perímetre de tronc.
(CAC*).



Pinastres (*Pinus pinaster*).

Tram alt del Ridaura, Llagostera. 2°56'52" E / 41°47'30" N – 2°56'58" E / 41°47'33" N

Alguns de més de 2 metres de perímetre de tronc;
els dos més grans tenen 2.50 i 2.57 metres de
perímetre de tronc.
(CAC*).



Suro (*Quercus suber*).

Safareig de Romanyà de le Selva, Santa Cristina d'Aro. 3°00'11" E / 41°51'43" N

Uns 13 metres d'altura i uns 3,1 metres de perímetre de tronc.

(CAC*).



Servera (*Sorbus domestica*).

Can Llac de Romanyà de le Selva, Santa Cristina d'Aro. 2°59'12" E / 41°53'01" N

Uns 8 metres d'altura i uns 1,63 metres de perímetre de tronc.

(CAC*).




Suro (*Quercus suber*).

Can Llac de Romanyà de le Selva, Santa Cristina d'Aro. 2°58'57" E / 41°53'06" N

Uns 13 metres d'altura i uns 2.63 metres de perímetre de tronc. Al costat n'hi ha un d'uns 2.23 metres de perímetre de tronc.

(CAC*).




Suro -del penjat- (*Quercus suber*).

Can Llac de Romanyà de le Selva, Santa Cristina d'Aro. 2°59'03" E / 41°53'02" N

Uns 11 metres d'altura i uns 2.89 metres de perímetre de tronc.

(CAC*).



Suro (*Quercus suber*).

Prop de Can Llac de Romanyà de le Selva, Santa Cristina d'Aro. 2°59'12" E / 41°53'13" N

Uns 15 metres d'altura i uns 3.35 metres de perímetre de tronc.

(CAC*).



Alzina (*Quercus ilex*).

Can Llac de Romanyà de le Selva, Santa Cristina d'Aro. 2°58'54" E / 41°52'59" N

Uns 18,5 metres d'altura i uns 3.93 metres de perímetre de tronc.

(CAC*).



Pollancre (*Populus nigra*).

Riera de la Costa de l'Alou, Llagostera. 2°56'24" E / 41°50'20" N

Uns 3.95 metres de perímetre de tronc.
(CAC*).



Lledoner (*Celtis australis*).

La Pata, Santa Cristina d'Aro. 2°56'34" E / 41°50'02" N

Uns 14.5 metres d'altura i 6 metres de perímetre de tronc (diverses besses).
(CAC*).



Vern (*Alnus glutinosa*).

Llera del Ridaura a l'alçada de la Costa de l'Alou, Santa Cristina d'Aro. 2°56'13" E / 41°49'40" N
Uns 4.15 metres de perímetre de tronc (tres besses).
(CAC*).



Pollancre (*Populus nigra*).


Llera del Ridaura a l'alçada de la Costa de l'Alou, Santa Cristina d'Aro, 2°56'13" E / 41°49'40" N
Uns 5.45 metres de perímetre de tronc (diverses besses).
(CAC*).



Suro (*Quercus suber*).

Parc dels Estanys, Platja d'Aro. 3°03'22" E / 41°48'46" N

Uns 2.7 metres de perímetre de tronc. (CAC*).



Roure martinenc (*Quercus pubescens*).

Al costat dret del Ridaura a l'alçada de la Costa de l'Alou, Santa Cristina d'Aro, 2°56'40" E / 41°50'03" N

Uns 26 metres d'altura i 3 metres de perímetre de tronc. (CAC*).



Moreres (*Morus alba*).

Al costat dret del Ridaura a l'alçada de la Costa de l'Alou, Santa Cristina d'Aro, 2°56'34" E / 41°49'39" N

Quatre peus junts amb aquestes voltes de canó: 1.95, 2.45, 1.60 i 2.20 metres. El de 2.45 té una altura aproximada de 15.5 metres. (CAC*).



Alzines (*Quercus ilex*).

Can Pata, Llagostera. 2°55'32" E / 41°49'29" N
Diversos individus junts. Una, de tres besses, d'uns 5.85 metres de perímetre de tronc (les besses, a 1.30m: 2.45, 2.15 i 2.10 metres) i una altura d'uns 28 metres. Una segona, de dues besses, fa uns 3.05 metres de perímetre de tronc. Una tercera, de quatre besses, no s'ha arribat a mesurar.
(CAC*).



Pi pinyer (*Pinus pinea*).

Can Pata, Llagostera. 2°55'34" E / 41°49'30" N
Uns 17 metres d'altura i 2.63 metres de perímetre de tronc.
(CAC*).



Suro (*Quercus suber*).

Can Pata, Llagostera. 2°55'33" E / 41°49'31" N
Uns 15 metres d'altura i 3.88 metres de perímetre de tronc (4.50 metres si s'agafa una segona bessa).
(CAC*).



3 Pins pinyers (*Pinus pinea*).

Can Ramot. Carretera de S'Agaró, 55, Castell

d'Aro. 3°02'02" E / 41°48'39" N

Uns 2.56, 2.62 i 2.72 metres de perímetre de tronc.
(CAC*, JRG).




Grèvols (*Ilex aquifolium*).

Font de l'Arítjol, Santa Cristina d'Aro. 2°57'13" E /

41°45'59" N

Diversos peus grans i altres de més petits.
(JPR*).



Xiprer (*Cupressus sempervirens*)

En algun moment va ésser escapçat i presenta un cim característic, molt dens, ample, arrodonit i planer.


Situació: cantonada de les Escoles, davant del "Rancho Catalán", Castell-Platja d'Aro.

tal·lus de la via. UTM 31T / 503046,137E / 4628737,269N.

Volt del canó: 2,73m (a 10cm del sòl).

Alçària total: 14,3m.

(CPR*, JPR, CAC).



ALTRES VEGETALS

Posidònia (*Posidonia oceanica*)

Aquesta tardor la floració en aigües de Sant Feliu de Guíxols ha estat escassa. Les praderies no es poden considerar florides. Només es veuen inflorescències aïllades amb una densitat que no supera una inflorescència/m². No és preocupant, la posidonia funciona així. És curiós que hi haguéssim algunes mates aïllades al mig de la sorra, amb superfície inferior a 1 m² que podien presentar 6, 7, 8 o més inflorescències. Una altra dada curiosa i poc habitual és que aquest any només s'han vist inflorescències a profunditats superiors a 12 metres (entre 12 i 22m). En les observacions dels darrers 13 anys, les praderies d'aigües més superficials, fins a 10 metres, sempre presentaban més o menys inflorescències, però sempre es veia flor; a més profunditat, menys o nula floració (JLM*).



Ametller (*Prunus dulcis*)

El 26.XII, un exemplar amb flor a prop del mas Candell de Castell-Platja d'Aro; data de floració molt primerenca per l'espècie (JRG, CAC*).

MOLSES

Segueix un llistat de tàxons com a resultat d'una cerca bibliogràfica al BDBC (Banc de dades de biodiversitat de Catalunya) dels líquens de la vall del Ridaura. Després del nom figura el lloc d'observació i, entre parèntesi, el número de la referència bibliogràfica, que es pot trobar al final d'aquest apartat. També es relacionen els taxons citats a la zona però que no es pot assegurar que siguin dins els límits de la vall del Ridaura.

Archidium alternifolium

Gavarres, Penedes. (12)

Atrichum angustatum

Carretera de Llagostera a Sant Grau, abans del repetidor. (2)

Bartramia aprica

Santa Cristina d'Aro. (8)

Bryum dichotomum

Sant Feliu de Guíxols. (3)

Bryum gemmilucens

Gavarres, Penedes. (12)

Bryum gemmiparum

Capçalera del Ridaura fins a l'EDAR de Castell-Platja d'Aro. (10)

Campylium stellatum

Torrent de Plana Basarda. (1)

Campylopus brevipilus

Santa Cristina d'Aro, a Can Dalmau. (2)

Campylopus introflexus

Gavarres, Penedes. (12)

Campylopus pilifer

Santa Cristina d'Aro. (7)

Cephaloziella stellulifera

Gavarres, Penedes. (12)

Dicranella heteromalla

Carretera de Llagostera a Sant Grau, abans del repetidor. (2)

Entosthodon attenuatus

Santa Cristina d'Aro. (9)

Entosthodon obtusus

Santa Cristina d'Aro, barranc de Plana Basarda. (2)

Santa Cristina d'Aro, can Dalmau. (9)

Gavarres, Penedes. (12)

Ephemerum crassinervium subsp. sessile

Gavarres, Penedes. (12)

Ephemerum serratum

Gavarres, Penedes. (12)

Epipterygium tozeri

Santa Cristina d'Aro, can Dalmau. (11)

Torrent de Plana Basarda. (1)

Fissidens adianthoides

Torrent de Plana Basarda vora can Mingo. (1)

Llagostera, can Crispins. (5)

Fissidens curvatus

Santa Cristina d'Aro. (6)

Santa Cristina d'Aro, can Dalmau. (2)

Fissidens viridulus

Santa Cristina d'Aro. (2)

Fossombronia caespitiformis

Torrent de Plana Basarda vora can Mingo. (1)

Grimmia laevigata

Sant Grau, a la costa just després dels primers apartaments. (2)

Romanyà de la Selva. (2)

Grimmia pulvinata

Ermita de Sant Grau. (2)

Hedwigia ciliata

Romanyà de la Selva. (9)

Hypnum cupressiforme

Santa Cristina d'Aro, can Dalmau. (4)

Vessant meridional de la Serra d'en Bous, entre Sant Feliu de Guíxols i Llagostera. (15)

Imbricaria mildeanum

Capçalera del Ridaura fins a l'EDAR de Castell-Platja d'Aro. (10)

Pellia epiphylla

Torrent de Plana Basarda. (1)

Phymatoceros bulbiculosus

Gavarres, Penedes. (12)

Pleuridium acuminatum

Santa Cristina d'Aro, can Dalmau. (2)

Gavarres, Penedes. (12)

Pleuridium subulatum

Gavarres, Penedes. (12)

Pogonatum aloides

Carretera de Llagostera a Sant Grau, abans repetidor. (2)

Polytrichum juniperinum

Entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar. (15)

Pseudephemerum nitidum

Gavarres, Penedes. (12)

Ptychostomum imbricatum

Gavarres, Penedes. (12)

Ptychostomum pseudotriquetrum

Carretera de Llagostera a Sant Grau, abans repetidor. (2)

Gavarres, Penedes. (12)

Reboulia hemisphaerica

Torrent de Plana Basarda. (1)

Riccia beyrichiana

Torrent de Plana Basarda. (1)

Riccia fluitans

Gavarres, Penedes. (12)

Sphagnum subnitens

Llagostera, Massís de l'Ardenya, prop de la Font de la Taverna. (13)

Llagostera, Pas dels Arrepentits. (2)

Massís de Cadiretes, Pas dels Arrepentits pròxim a Can Crispins, dessota de l'anomenada Font de la Taverna. (14)

Tortella nitida

Torrent de Plana Basarda. (1)

Tortella squarrosa

Vessant meridional de la Serra d'en Bous, entre Sant Feliu de Guíxols i Llagostera. (15)

Tortella squarrosa

Vessant meridional de la Serra d'en Bous, entre Sant Feliu de Guíxols i Llagostera. (15)

Taxons citats a la zona però no es pot assegurar que siguin dins els límits de la vall del Ridaura

Amblystegium serpens

Anthoceros punctatus

Barbula unguiculata

Brachytheciastrum velutinum

Bryum argenteum

Bryum radiculosum

Calliergonella cuspidata

Ceratodon purpureus

Corsinia coriandrina

Cratoneuron filicinum

Dicranum scoparium

Drepanocladus aduncus

Eucladium verticillatum

Fissidens crispus

Fissidens dubius

Fissidens taxifolius

Fontinalis hypnoides

Fossombronia wondraczekii

<i>Frullania dilatata</i>	<i>Ptychostomum torquescens</i>
<i>Frullania tamarisci</i>	<i>Pulviger a lyellii</i>
<i>Funaria hygrometrica</i>	<i>Radula complanata</i>
<i>Gongylanthus ericetorum</i>	<i>Rhizomnium punctatum</i>
<i>Grimmia orbicularis</i>	<i>Rhynchostegium riparioides</i>
<i>Grimmia trichophylla</i>	<i>Schistidium crassipilum</i>
<i>Hypnum jutlandicum</i>	<i>Southbya tophacea</i>
<i>Imbriobryum alpinum</i>	<i>Syntrichia ruralis</i>
<i>Leptodictyum riparium</i>	<i>Thamnobryum alopecurum</i>
<i>Microbryum starkeanum</i>	<i>Tortula acaulon</i>
<i>Orthotrichum diaphanum</i>	<i>Tortula caucasica</i>
<i>Oxyrrhynchium hians</i>	<i>Tortula truncata</i>
<i>Philonotis marchica</i>	<i>Tortula viridifolia</i>
<i>Plagiomnium affine</i>	<i>Tortula wilsonii</i>
<i>Plagiomnium rostratum</i>	<i>Trichostomum brachydontium</i>
<i>Polytrichum formosum</i>	<i>Trichostomum crispulum</i>
<i>Pseudocrossidium hornschuchianum</i>	<i>Vinealobryum vineale</i>
<i>Pseudoscleropodium purum</i>	<i>Weissia longifolia</i>

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

- (1) Ballesteros, E.; (1984); Sobre l'estructura i la dinàmica de les comunitats terofítiques humides (classe Isoeto-Nanojuncetea) i els pradells amb *Ophioglossum lusitanicum* L. del massís de Cadiretes (la; Collect. Bot. (Barcelona).
- (2) Brugués, M. & Ruiz, E.; (2022); Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal. Plecs Herbari BCB Briòfits; Herbari BCN - Universitat de Barcelona. Barcelona.
- (3) Brugués, M. & Ruiz, E.; (2023); Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal. Plecs Herbari BCB Briòfits; Herbari BCN - Universitat de Barcelona. Barcelona.
- (4) Brugués, M. & Ruiz, E.; (2024); Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal. Plecs Herbari BCB Briòfits; Herbari BCN - Universitat de Barcelona. Barcelona.
- (5) Casas, C.; (1986); Brioteca Hispànica; Acta Botanica Malacitana 11.
- (6) Casas, C., Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C.; (1985); Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira; 1. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. Barcelona.
- (7) Casas, C., Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C.; (1989); Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira; 2. Institut d'Estudis Catalans & Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.
- (8) Casas, C., Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C.; (1992); Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira; 3. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. Barcelona.

(9) Casas, C., Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C.; (1996); Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira; 4. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. Barcelona.

(10) Diversos autors; (2019-2024); Programa de seguiment i control 2019-2024 (ACORD GOV/80/2019, de 4 de juny, pel qual s'aprova el Programa de seguiment i control del Districte de conca fluvial de Catalunya pe; Generalitat de Catalunya.

(11) Guerra, J., Brugués, M., Cano, M.J. & Cros, R.M.; (2010); Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

(12) Jover, Benjumea, M.; (2016); La flora de briòfits dels prats mediterranis de les Gavarres; Premi Joan Xirgo, atorgat pel Consorci de les Gavarres.

(13) Vilar, L., Font, B., Jover, M., Viñas, X. & Lapeña, R.; (2015); La població de *Sphagnum subnitens* al Massís de l'Ardenya (nordest de Catalunya); Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 79. Barcelona.

(14) Viñas i Teixidor, X.; (1982); Distribució de *Drosera rotundifolia* L. i presència d'*Sphagnum subnitens* Russ. & Warnst. (= *S. plumulosum* Röhl) al Massís de Cadiretes (La Selva); Anales de la Sección de Ciencias del Colegio Universitario de Girona 7.

(15) Zeller, W.; (1958); *Étude phytosociologique du chêne-liège en Catalogne*. Pirineos, 47-50: 1-194.

NOTA ADDICIONAL DE BOLETS

Gírgola (*Pleurotus ostreatus*)

El 16.XI, diversos exemplars sobre alzina, al mas Roig, Llagostera; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC*).



NOTES ADDICIONALS DE LÍQUENS

Segueix un llistat de tàxons com a resultat d'una cerca bibliogràfica al BDBC (Banc de dades de biodiversitat de Catalunya) dels líquens de la vall del Ridaura. Després del nom figura el lloc d'observació i, entre parèntesi, el número de la referència bibliogràfica, que es pot trobar al final d'aquest apartat (CAC).

Alyxoria varia

Llagostera, Penedes (4).

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Santa Cristina d'Aro (2).

Llagostera, Penedes (4).

Amandinea punctata

Llagostera, Penedes (4).

Diploicia canescens

Castell d'Aro (2).

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Santa Cristina d'Aro (2).

Arthonia atra

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Santa Cristina d'Aro (2).

Endohyalina ericina

Castell d'Aro (2).

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Arthonia melanophthalma

Sant Feliu de Guíxols (5).

Santa Cristina d'Aro (2).

Evernia prunastri

Llagostera, Penedes (4).

Athallia holocarpa

Sant Feliu de Guíxols (5).

Santa Cristina d'Aro (2).

Flavoparmelia caperata

Llagostera, Penedes (4).

Blastenia ferruginea

Sant Feliu de Guíxols (5).

Santa Cristina d'Aro (2).

Flavoparmelia soredians

Castell d'Aro (2).

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Llagostera, Penedes (4).

Buellia erubescens

Llagostera, Penedes (4).

Huneckia pollinii

Sant Feliu de Guíxols (5).

Santa Cristina d'Aro (2).

Chaenotheca chrysocephala

Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Les

Taules (7).

Hyperphyscia adglutinata

Sant Feliu de Guíxols (5).

Santa Cristina d'Aro (2).

Llagostera, Penedes (4).

Chrysothrix candelaris

Llagostera, Penedes (4).

Hypogymnia physodes

Llagostera, Penedes (4).

Cladonia humilis

Llagostera, Penedes (4).

Cladonia subulata

Llagostera, Penedes (4).

Lecania naegelii

Sant Feliu de Guíxols (5).

Santa Cristina d'Aro (2).

Llagostera, Penedes (4).

Coenogonium pineti

Llagostera, Penedes (4).

Lecanographa lyncea

Sant Feliu de Guíxols (5).

Dendrographa decolorans

Castell d'Aro (2).

Santa Cristina d'Aro (2).

Lecanora albella

Llagostera, Penedes (4).

Lecanora argentata

Castell d'Aro (2).

Lecanora conizaeoides

Llagostera, Penedes (4).

Lecanora conizella

Llagostera, Penedes (4).

Lecanora expallens

Llagostera, Penedes (4).

Lecanora horiza

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Santa Cristina d'Aro (2).

Lecanora hybocarpa

Llagostera, Penedes (4).

Lecanora strobilinoides

Llagostera, Penedes (4).

Lecanora rubicunda

Castell d'Aro (2).

Sant Feliu de Guíxols (5).

Santa Cristina d'Aro (2).

Lepra amara

Castell d'Aro (2).

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Llagostera, Penedes (4).

Lepraria lobificans

Llagostera, Penedes (4).

Melanelixia subaurifera

Llagostera, Penedes (4).

Naevia punctiformes

Llagostera, Penedes (4).

Opegrapha niveoatra

Llagostera, Penedes (4).

Parmelia sulcata

Llagostera, Penedes (4).

Parmelina tiliàcia

Llagostera, Penedes (4).

Parmotrema hypoleucinum

Llagostera, Penedes (4).

Parmotrema perlatum

Llagostera, Penedes (4).

Parmotrema reticulatum

Castell d'Aro (2).

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Llagostera, Penedes (4).

Pertusaria heterochroa

Castell d'Aro (2).

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Santa Cristina d'Aro (2).

Llagostera, Penedes (4).

Physcia adscendens

Sant Feliu de Guíxols (5).

Santa Cristina d'Aro (2).

Llagostera, Penedes (4).

Physcia leptalea

Castell d'Aro (2).

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Santa Cristina d'Aro (2).

Punctelia subrudecta

Llagostera, Penedes (4).

Ramalina calicaris

Llagostera, Penedes (4).

Ramalina canariensis

Castell d'Aro (2).

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Llagostera, Penedes (4).

Ramalina farinacea

Castell d'Aro (2).

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Llagostera, Penedes (4).

Ramalina panizzei

Llagostera, Penedes (4).

Ramalina subgeniculata

Llagostera, Penedes (4).

Roccella phycopsis

Platja d'Aro, cala Pedrosa, cales de Pi i Belladona (6).

Scoliciosporum gallurae

Llagostera, Penedes (4).

Teloschistes chrysophthalmus

Llagostera, Penedes (4).

Thelenella modesta

Castell d'Arco, Sta. Cristina d'Aro, Les Taules (3).

Usnea filipèndula

Sant Feliu de Guíxols (5).

Usnea glabrescens

Llagostera, Penedes (4).

Usnea mutabilis

Llagostera, Penedes (4).

Usnea rubicunda

Llagostera, Penedes (4).

Usnea subscabrosa

Llagostera, Penedes (4).

Xanthomendoza ulophyllodes

Llagostera, Penedes (4).

Xanthoria parietina

Sant Feliu de Guíxols (5), (1).

Santa Cristina d'Aro (2).

Llagostera, Penedes (4).

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

(1) BCN; (2018). Plecs Herbari BCN.; CEDOCBIV. Barcelona.

(2) BOQUERAS, M., GOMEZ-BOLEA, A. (1986). Líquens epífits, i els seus fongs paràsits, observats sobre *Quercus suber*, a Catalunya. Folia Bot. Misc., 5.

(3) ETAYO, J. & MAYRHOFER, H. (2003). *Thelenella melanospora* (Thelenellaceae, lichenized Ascomycetes), a new species from the Mediterranean region. Nova Hedwigia, 77

(4) GISPERT, G. (2017). Els líquens epífits de *Quercus súber* L. a les Gavarres (Girona). Distribució espacial en els microambients dels arbres. Treball final de Màster de Biodiversitat. Universitat de Barcelona. Barcelona.

(5) GOMEZ-BOLEA, A. (1985). *Líquenes epífits en Catalunya*. Resum Tesis Centre Publ. Univ. Barcelona. Barcelona.

(6) LLUENT, A., GÓMEZ-BOLEA, A. (2021). Distribució de macrolíquens a Catalunya amb noves dades corològiques sobre líquens protegits; Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 85 (1).

(7) MUÑIZ, D. (2013). *Hongos Calicioides en la Península Ibérica*. Tesis Doctoral. Universitat de Barcelona. Barcelona.

TAULA D'OBSERVADORS

<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>	<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>
ABX	Anna Brú	JBL	Josep Ma Bas Lay
ACY	Adrià Compte Ferrer	JBX	Joan Bohigas
ACS	Albert Compañia Sabrià	JCB	Josep Clos Buxó
ADY	Andreu Duclau	JCC	Juan Carlos Calderón Caro
ADZ	Àlex Domec	JCJ	Jaume Campderròs Jordà
AGB	Antonio Garballo Barrionuevo	JCO	Joan Cortés Olea
AHC	Alexis Herce Carmona	JCP	Josep Callol Pérez
ALM	Àlex Lizano Mesa	JFB	Josep Maria Flores Buch
AMP	Àlex Massana Pernias	JGV	Joan Gil Vergés
AMS	Antoni Mariné Sanz	JLM	Juan Lázaro Mateo
AMX	Aleix Monguillot Serra	JMA	Jordi Massoni Alemany
ANA	Aniol Negre Albertí	JMX	Joan Molinas
ATG	Aitor Tendero Guirado	JPC	Joan Pujol Collet
ATX	Adrian Trost	JPR	Joan Pujol Roma
BOC	Beñat Olano Casasús	JRD	Jaume Ramot Duran
CAC	Carlos Alvarez Cros	JRG	Jaume Ramot García
CAR	Cos Agents Rurals	JRT	Josep Rubiano Tena
CFQ	Carlos Fernández Quicios	JRY	Jordi Romaguera Güell
CMG	Carles Martorell Gendra	JSC	Jordi Sànchez Cabra
CMN	Carol Martínez Noguera	JSR	Jordi Soler Ramionet
CPR	Carles Palacios Ruzafa	JVM	Jordi Véliz Monrabà
CRP	Carmen Royo Ponce	JVO	Josep Vidal Oliveras
CTX	Carles Tobella	JXA	Judith Xiberta Armengol
CVH	Cristian Vico Hernández	LCY	Lito Campos
CVX	Consol Vendrell	LGL	Lluís Guixé Llobet
DAX	Daniel Anton	LTB	Lluís-Xavier Toldrà Bastida
DCX	Daniel Cullerés	LTM	Lourdes Torres Montoliu
DKM	Dirk Kosidlo Montijano	LVY	Lluís Vilamajó
DMM	David Miret Martí	MAC	Manel Alvarez Cros
EBX	Eduard Batista	MAL	Marti Alsina Lobo
ECP	Esther Callol Pérez	MAS	Marcel·lí Armengou Safont
EFX	Enric Fontcuberta	MAX	Miquel Arxer
EJA	Eduard Jou Ardiaca	MBC	Miguel Angel Benedicto Calpe
EPB	Eudald Pujol Buxó	MBX	Marc Bonjoch
FLX	Franck Lehmans	MCS	Marc Cisa Serra
FMX	Fabien Mercier	MDX	Michel Delleré
FRX	Freddy Rivas	MFR	Miguel Ángel Fuentes Rosúa
GAB	Guillem Alvarez Bustins	MFX	Marc Fusellas
GAX	Gina Andorrà	MGM	Marcel Gutinell Maurí
GAZ	Guillem Arrufat	MGX	Marta Giménez
GJP	Gabriel de Jesús Pinho	MJP	Maria Janoher Plaja
GNS	Grup de Natura Sterna	MLG	Mònica López García
GSD	Grup de Seguiment del duc al Baix Empordà del Grup de Natura Sterna	MMC	Monjos cistercencs de Solius
HMX	Hubert Mas	MMS	Marc Martí Sánchez
		MLX	Mireia Lara
		MLY	Marc Laurent

MMX Marc Martí
 MPM Manuel Pineda M.
 MRB Marta Roqué Bohigas
 MRC Martí Rondós Casas
 MTM Marc Torra Massana
 MVS Mireia Velasco Serrano
 NAR Nekane Ayestarán Rezola
 NDX Neus Diumenge
 NFM Núria Formatger Masferrer
 NSK Nicole Simone Krusch
 OCY Oriol Cabrero
 ORX Oriol Ribas
 PAB Pere Alzina Bilbeny
 PBA Pere Bofill Arbusà
 PBC Pere Baucells Colomer
 PCF Pau Calero Figueras
 PMJ Pere Moreno Jiménez
 PMC Policia Municipal Castell-Platja
 d'Aro
 PMS Policia Municipal Sant Feliu de
 Guíxols
 PPF Pere Pons Ferran

PRR Pili Royo Regueiro
 RAI Ricard Arias Ibáñez
 RAM Rosa Arbat Marro
 RAX Ramon Aguilar
 RBV Raúl Bastida Vives
 RCA Raül Calderón Alvarez
 RMT Rosa Matesanz Torrent
 RPE Ramon Prat Espelt
 SAX Sussi Abel
 SJA Sònia Joanals Ametller
 SNX Sandra Neißkenwirth
 TAJ Toni Alonso Jardí
 TST Toni Strubell Trueta
 VDX Víctor Díaz
 VPR Vittorio Pedrocchi Rius
 XCX Xavier Colomé
 XCY Xavi Cunill
 XGG Xavier Gallego García
 XIP Xavier Idígora Planas
 XSC Xavier Salvador Costa
 XTG Xavier Tomás Gimeno
 XVG Xon Vilahur Godoy

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

AviList Core Team. 2025. *AviList: The Global Avian Checklist*, v2025. <https://doi.org/10.2173/avilist.v2025>

Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2021. Actualització de la llista de tàxons homologables pel CAC. Butlletí del Comitè Avifaunístic de Catalunya Núm.:2. Institut Català d'Ornitologia. Barcelona. http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/cac/cac_butlleti2_de_sembre_2021.pdf

Crochet P.-A., Barthel P.H., Bauer H.-G., van den Berg A.B., Bezzel E., Collinson J.M., Dubois P.J., Fromholtz J., Helbig A.J. †, Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Kirwan G., Lagerqvist M., Le Maréchal P., van Loon A.J., Päckert M., Parkin D.T., Pons J.-M., Raty L., Roselaar C.S., Sangster G., Steinheimer F.D., Svensson L., Tyrberg T., Votier S.C., Yésou P. (2015) *AERC TAC's taxonomic recommendations: 2015 report*. <http://www.aerc.eu/tac.html>.

Fundació Barcelona Zoo; Institut Català d'Ornitologia; TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari dels ocells del món (2023). Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017-2022. (Diccionaris en Línia). <https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233>

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 2017. Nou Hipermapa. http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/hipermapa/

ICO (Institut Català d'Ornitologia). 2009-2025. www.ornitho.cat

Rouco, M., Copete, J. L., De Juana, E., Gil-Velasco, M., Lorenzo, J. A., Martín, M., Milá, B., Molina, B. & Santos, D. M. 2019. *Lista de las aves de España. Edición de 2019*. SEO/BirdLife. Madrid. https://www.seo.org/wp-content/uploads/2019/05/ListaAvesdeEspan%C3%B1a2019_CAT.pdf

ÍNDEX ALFABÈTIC

- Abellerol, 46
Acanthinula aculeata, 102
Achyra nudalis, 90
Acrocephalus arundinaceus, 54
Acrocephalus melanopogon, 54
Acrocephalus scirpaceus, 12, 55
Actitis hypoleucos, 25
Aegithalos caudatus, 53
Aeshna affinis, 94, 95
Aeshna cyanea, 95
Aglais io, 86
 Agró blanc, 38
 Agró roig, 38
 Àguila calçada, 40
 Àguila cuabarrada, 12, 40
 Àguila marcenca, 7, 40
 Alaestès petit, 95
 Alaestès verd, 95
Alauda arvensis, 51
Alcedo atthis, 46
Alectoris rufa, 17
 Aligot comú, 42
Alnus glutinosa, 125
Alopochen aegyptiaca, 8, 12, 14
 Alosa comuna, 51
Alyxoria varia, 135
 Alzina, 119, 123, 127, 139
Amandinea punctata, 135
Amaurobius erberi, 111
Amaurobius sp., 110
 Ametller, 129
Anania verbascalis, 88
Anarhynchus alexandrinus, 23
Anas bahamensis, 66
Anas crecca, 16
Anas platyrhynchos, 16
Anax ephippiger, 95
Anax imperator, 95
Anax parthenope, 95
Ancylus fluviatilis, 104
Ancyrosoma leucogrammes, 109
 Ànec collverd, 16
 Ànec cullerot, 15
 Ànec de les Bahames, 66
 Ànec gris, 15
 Ànec xiulador, 15
 Angelet, 86
 Anguila europea, 81
Anguilla anguilla, 81
Anguis fragilis, 75
Anthocharis cardamines, 86
Anthus campestris, 62
Anthus pratensis, 62
Anthus trivialis, 62
Apatura ilia, 86
Aphantaulax trifasciata, 112
Apodemus sylvaticus, 70
Apus apus, 18
Apus pallidus, 18
Aquila fasciata, 12, 40
Archidium alternifolium, 130
Ardea alba, 38
Ardea cinerea, 6, 11, 12
Ardea ibis, 36
Ardea purpurea, 38
Ardeola ralloides, 36
 Argentada comuna, 86
Argynnis paphia, 86
Aricia agestis, 86
Arion intermedius, 100
Arion magnus / vulgaris, 99
 Arlequí, 85, 86
 Arpella comuna, 41
Arthonia atra, 135
Arthonia melanophthalma, 135
 Asio flammeus, 12
Asio flammeus, 44
Asio otus, 44
 Astor, 41
Astur gentilis, 41
 Atalanta, 86
Athalia holocarpa, 135
Athene noctua, 43
Athetis (Proxenus) hospes, 89
Atrichum angustatum, 130
 Aurora, 86
Aythya ferina, 17
 Baldriga balear, 33
 Baldriga cendrosa, 33
 Baldriga mediterrània, 33
 Ballester, 18
 Balquer, 54
 Barqueta de Sant Pere, 116
 Barrinadora dels geranis, 86
Bartramia aprica, 130
 Batallaire, 23
 Bec de corall senegalès, 8, 12, 61
 Bec de serra, 17
 Becada, 24
 Becadell comú, 11, 25
 Becadell sord, 25
 Becplaner, 6, 35
 Bernat pescaire, 6, 11, 12, 37
 Bitxac comú, 59
 Bitxac rogenc, 59
 Blanca de la col, 86
 Blanqueta de la col, 86
 Blanqueta de la mitja lluna, 86
 Blanqueta perfumada, 86
Blastenia ferruginea, 135
 Blauet, 46
 Blaveta comuna, 86
 Blaveta de la farigola, 86
 Blaveta de la trepadella, 86
 Blaveta de l'heura, 86
 Blaveta dels pèsols, 86
 Blaveta estriada, 86
 Blaveta lluent, 86

<i>Boloria dia</i> , 86	<i>Celastrina argiolus</i> , 86
Boscaler pintat gros, 55	<i>Celtis australis</i> , 119, 120, 124
Boscarla de canyar, 12, 55	<i>Cephaloziella stellulifera</i> , 130
Boscarla dels joncs, 54	<i>Ceriagrion tenellum</i> , 95
Boscarla mostatxada, 54	<i>Certallum ebulinum</i> , 106
<i>Botaurus minutus</i> , 35	<i>Certhia brachydactyla</i> , 56
<i>Botaurus minutus</i> , 12	<i>Cettia cetti</i> , 53
<i>Boyeria irene</i> , 95	<i>Chaenotheca chrysocephala</i> , 135
<i>Brintesia circe</i> , 86	<i>Chalcolestes viridis</i> , 95
Brocat variable, 86	<i>Charadrius hiaticula</i> , 22
Bruel, 56	<i>Charaxes jasius</i> , 86
Bruixa, 86	<i>Chlidonias hybrida</i> , 32
Bruna boscana, 86	<i>Chloris chloris</i> , 63
Bruna dels prats, 86	<i>Chlorophorus sartor</i> , 108
<i>Bryum dichotomum</i> , 130	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> , 6, 27
<i>Bryum gemmilucens</i> , 130	<i>Chrysothrix candelaris</i> , 135
<i>Bryum gemmiparum</i> , 130	<i>Ciconia ciconia</i> , 33
<i>Bubo bubo</i> , 6, 44	Cigala grossa, 109
<i>Bubulcus ibis</i> , 11, 12	Cigne vulgar, 14
<i>Buellia erubescens</i> , 135	Cigonya blanca, 33
<i>Bufo spinosus</i> , 80	<i>Circaetus gallicus</i> , 7, 12, 40
<i>Burhinus oedicephalus</i> , 21	<i>Circus aeruginosus</i> , 41
<i>Buteo buteo</i> , 42	<i>Cisticola juncidis</i> , 55
Cabirol, 70	<i>Cladonia humilis</i> , 135
Cabusset, 20	<i>Cladonia subulata</i> , 135
Cabussó collnegre, 20	<i>Clamator glandarius</i> , 18
Cacatua nimfa, 66	Cleòpatra, 86
<i>Cacyreus marshalli</i> , 86	<i>Clytus rhamni</i> , 107
Cadernera, 63	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> , 63
Calàbria grossa, 20	<i>Coenagrion mercuriale</i> , 95
<i>Calandrella brachydactyla</i> , 51	<i>Coenagrion puella</i> , 95
<i>Calidris alpina</i> , 24	<i>Coenagrion scitulum</i> , 95
<i>Calidris ferruginea</i> , 24	<i>Coenogonium pineti</i> , 135
<i>Calidris maritima</i> , 11	<i>Coenonympha arcania</i> , 86
<i>Calidris maritima</i> , 23	Cogullada comuna, 51
<i>Calidris pugnax</i> , 23	Coipú, 72
<i>Callophrys avis</i> , 86	<i>Colias croceus</i> , 86
<i>Callophrys rubi</i> , 86	Còlit gris, 60
<i>Calonectris diomedea</i> , 33	Colltort, 47
<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i> , 95	Colom roquer, 18
<i>Calopteryx virgo</i> , 95	<i>Colotois pennaria</i> , 93
<i>Calopteryx xanthostoma</i> , 95	<i>Columba livia</i> , 18
Cames llargues, 21	<i>Columba palumbus</i> , 18
<i>Campylidium stellatum</i> , 130	Conill de bosc, 68
<i>Campylopus brevipilus</i> , 130	<i>Coracias garrulus</i> , 45
<i>Campylopus introflexus</i> , 130	Corb, 50
<i>Campylopus pilifer</i> , 130	Corb marí emplomallat, 6, 34
Capgròs comú, 86	Corb marí gros, 11, 12, 33
Capgròs fosc, 86	Cornella negra, 12, 50
Capó reial, 34	<i>Coronella girondica</i> , 75
<i>Capreolus capreolus</i> , 70	Corriol camanegra, 23
<i>Caprimulgus europaeus</i> , 18	Corriol gros, 22
Capsigrany, 49	<i>Corvus corax</i> , 50
<i>Carcharodus alpestris</i> , 86	<i>Corvus corone</i> , 12, 50
<i>Carduelis carduelis</i> , 63	Cotoliu, 51
<i>Caretta caretta</i> , 73	Cotorreta pitgrisa, 8, 49
Cargolet, 56	<i>Coturnix coturnix</i> , 17
<i>Carychium minimum</i> , 98	Cotxa cua-roja, 59
Catxalot, 71	Cotxa fumada, 58
Cavallet d'hivern comú, 95	Coure comú, 86
<i>Cecropis rufula</i> , 53	Coure verdet, 86

- Crocallis dardoinaria*, 91
Crocothemis erythraea, 95
Crombrugghia cf. distans, 89
Cruixidell, 64
Cuculus canorus, 18
Cucut, 18
Cucut reial, 18
Cuereta blanca, 62
Cuereta groga, 61
Cuereta torrentera, 61
Cupressus sempervirens, 129
Curroc, 11, 32
Curruca communis, 55
Curruca iberiae, 55
Curruca melanocephala, 55
Cyanistes caeruleus, 50
Cygnus olor, 14
Cyrba algerina, 110
Damer de la centàurea, 86
Damer dels conillets, 86
Damer puntejat, 86
Damer roig, 86
Damisel·la blava, 95
Damisel·la endolada, 95
Damisel·la enguantada, 95
Danaus chrysippus, 85, 86
Danaus plexippus, 84, 86
Dard ros, 86
Daurada grossa, 21
Daurat fosc, 86
Delichon urbicum, 52
Dendrocopos major, 48
Dendrographa decolorants, 135
Deroceras altimirai, 104
Dicranella heteromalla, 130
Diploicia canescens, 135
Discoglossus pictus, 80
Dofí mular, 71
Donzell de ferradura, 95
Donzell de trinxant, 95
Donzell mercurial, 95
Donzella violeta, 86
Dragó comú, 74
Drusia valenciennii, 103
Dryobotodes tenebrosa, 93
Duc, 6, 44
Durbec, 63
Egretta garzetta, 11, 39
Emberiza calandra, 64
Emberiza cia, 64
Emberiza cirius, 64
Emberiza citrinella, 12, 64
Emberiza rustica, 12
Emberiza rustica, 64
Emberiza schoeniclus, 64
Emperador blau, 95
Emperador divagant, 95
Emperador menor, 95
Emys orbicularis, 74
Enallagma cyathigerum, 95
Endohyalina ericina, 135
Enganyapastors, 18
Entosthodon attenuatus, 130
Entosthodon obtusus, 130
Ephemerum crassinervium, 130
Ephemerum serratum, 131
Epidalea calamita, 80
Epipterygium tozeri, 131
Ergates faber, 108
Eriçó comú, 68
eriçó fosc, 68
Erinaceus europaeus, 68
Erithacus rubecula, 58
Erythromma lindenii, 95
Erythromma viridulum, 95
Escac ibèric, 86
Escorxador, 49
Esparver de l'aigua, 95
Espectre clar, 95
Espiadimonis blau, 94, 95
Espiadimonis de fanal, 95
Espinós, 81
Esplugabous, 11, 12, 36
Esquirol, 70
Estornell comú, 57
Estornell negre, 57
Estrilda astrild, 8
Estrilda astrild, 12
Estrilda astrild, 61
Euchloe crameri, 86
Euconulus alderi, 97
Euophrys sp, 110
Euphydryas aurinia, 86
Evernia prunastri, 135
Fagina, 69
Faisà, 8, 17
Falcot negre, 18
Falcot pal·lid, 18
Falcó camarroig, 48
Falcó mostatxut, 48
Falcó pelegrí, 6, 48
Falco peregrinus, 6, 48
Falco peregrinus, 6
Falco subbuteo, 48
Falco tinnunculus, 6, 48
Falco vespertinus, 48
Faune bru, 86
Faune gran, 84
Faune ziga-zaga, 86
Favonius quercus, 86
Felis catus domesticus, 72
Ferrer cama-negre, 95
Ferrer cama-roig, 95
Ferussacia folliculum, 101
Ficedula hypoleuca, 58
Fissidens adianthoides, 131
Fissidens curvatus, 131
Fissidens viridulus, 131
Flamenc rosat, 20
Flavoparmelia caperata, 135
Fotja comuna, 11, 12, 19
Fotja vulgar, 11

Fredeluga, 22	<i>Hemorrhois hippocrepis</i> , 75
<i>Fringilla coelebs</i> , 62	<i>Hieraaetus pennatus</i> , 40
<i>Fringilla montifringilla</i> , 63	<i>Himantopus himantopus</i> , 21
<i>Frontinellina frutetorum</i> , 112	<i>Hipparchia fagi</i> , 84
<i>Fulica atra</i> , 11, 12, 19	<i>Hipparchia fidia</i> , 86
Fumarell carablanc, 32	<i>Hipparchia statilinus</i> , 86
Gafarró, 63	<i>Hirundo rustica</i> , 52
Gaig, 50	<i>Huneckia pollinii</i> , 135
Gaig blau, 45	<i>Hydrocoloeus minutus</i> , 28
<i>Galba truncatula</i> , 104	<i>Hydroprogne caspia</i> , 32
<i>Galerida cristata</i> , 51	<i>Hyla meridionalis</i> , 80
<i>Gallinago gallinago</i> , 11, 25	<i>Hyles livornica</i> , 87
<i>Gallinula chloropus</i> , 19	<i>Hypena obsitalis</i> , 88
Gamarús, 44	<i>Hyperphyscia adglutinata</i> , 135
Gamba roja vulgar, 27	<i>Hypnum cupressiforme</i> , 131
Gamba verda, 27	<i>Hypogymnia physodes</i> , 135
<i>Garrulus glandarius</i> , 50	<i>Ichthyaetus audouinii</i> , 12, 28
Garsa, 50	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> ., 30
<i>Gasterosteus aculeatus</i> , 81	<i>Icius sp.</i> , 112
Gat domèstic, 72	<i>Ilex aquifolium</i> , 128
Gavià argentat, 6, 30	<i>Imbriobryum mildeanum</i> , 131
Gavià fosc, 31	<i>Iphiclides feisthamelii</i> , 86
<i>Gavia immer</i> , 20	<i>Iris oratoria</i> , 109
Gavina capnegra, 30	<i>Ischnura elegans</i> , 95
Gavina corsa, 6, 12, 28	<i>Ischnura graellsii</i> , 95
Gavina menuda, 28	<i>Ischnura pumilio</i> , 95
Gavina riallera, 6, 27	<i>Issoria lathonia</i> , 86
<i>Gegenes nostradamus</i> , 86	<i>Jynx torquilla</i> , 47
<i>Gegenes nostradamus</i> , 85	<i>Laeosopis roboris</i> , 86
<i>Gelochelidon nilotica</i> , 11, 32	<i>Lampides boeticus</i> , 86
Geneta, 69	<i>Lanius collurio</i> , 49
<i>Genetta genetta</i> , 69	<i>Lanius senator</i> , 49
Gírgola, 134	<i>Larentia clavaria</i> , 92
<i>Glaucopsyche alexis</i> , 86	<i>Larus fuscus</i> , 31
<i>Glaucopsyche melanops</i> , 86	<i>Larus michahellis</i> , 6, 30
<i>Gomphus pulchellus</i> , 95	<i>Lasiommata megera</i> , 86
<i>Gonepteryx cleopatra</i> , 86	<i>Lauria sempronii</i> , 99
<i>Gonepteryx rhamni</i> , 86	<i>Lecanographa lyncea</i> , 135
Gorjablanc, 69	<i>Lecanora albella</i> , 136
Granota pintada, 80	<i>Lecanora argentata</i> , 136
Granota verda, 80	<i>Lecanora conizaeoides</i> , 136
<i>Graptemys ouachitensis</i> , 78	<i>Lecanora conizella</i> , 136
Gratapalles, 64	<i>Lecanora expallens</i> , 136
Grèvol, 128	<i>Lecanora horiza</i> , 136
Grill dels torrents, 96	<i>Lecanora hybocarpa</i> , 136
<i>Grimmia laevigata</i> , 131	<i>Lecanora rubicunda</i> , 136
<i>Grimmia pulvinata</i> , 131	<i>Lecanora strobilinoides</i> , 136
Gripau comú, 80	<i>Lepra amara</i> , 136
Gripau corredor, 80	<i>Lepraria lobificans</i> , 136
Gripau d'esperons, 79	<i>Leptidea sinapis</i> , 86
Griseta mediterrània, 86	<i>Leptotes pirithous</i> , 86
Griva comuna, 57	<i>Lepus europaeus</i> , 68
Grua, 19	<i>Lestes virens</i> , 95
<i>Grus grus</i> , 19	Libèl·lula ampla, 95
Guatlla, 17	Libèl·lula quadrimaculada, 95
Guilla, 68	<i>Libelloides cunii</i> , 115
<i>Gulosus aristotelis</i> , 6	<i>Libelloides longicornis</i> , 115
<i>Gulosus aristotelis desmarestii</i> , 34	Libellula depressa, 95
<i>Hedwigia ciliata</i> , 131	<i>Libellula quadrimaculata</i> , 95
<i>Helicigona lapicida</i> , 101	<i>Libythea celtis</i> , 86
<i>Hemithea aestivaria</i> , 89	<i>Limenitis camilla</i> , 86

- Limnitis reducta*, 86
Linaria cannabina, 63
Liophyrillus flavitarsis, 111
Lissotriton helveticus, 79
 Llangardaix ocellat, 74
 Llantió elegant, 95
 Llantió iberomagribí, 95
 Llantió petit, 95
 Llebre europea, 68
 Lledoner, 119, 120, 124
 Leonada de matollar, 86
 Llimac eriçat, 100
 Llimonera, 86
 Llúdriga, 12, 69
 Lluer, 63
Locustella naevia, 55
Lophophanes cristatus, 50
Lullula arborea, 51
Luscinia megarhynchos, 58
Luscinia svecica, 58
Lutra lutra, 12, 69
Lycaena phlaeas, 86
Lymnocyrtus minimus, 25
Lyristes plebejus, 109
Lysandra bellargus, 86
Lysandra hispana, 86
M. s. balearica, 57
Macrochelys temminckii, 77
 Mallerenga blava, 50
 Mallerenga carbonera, 50
 Mallerenga cuallarga, 53
 Mallerenga emplomallada, 50
 Mallerenga petita, 50
Malpolon monspessulanus, 76
Maniola jurtina, 86
 Marbrada comuna, 86
Mareca penelope, 15
Mareca strepera, 15
 Margera comuna, 86
 Marroneta de l'om, 84, 86
 Marroneta de l'alzina, 86
 Marroneta del roure, 86
Martes foina, 69
 Martinet blanc, 11, 39
 Martinet de nit, 12, 36
 Martinet menut, 12, 35
 Martinet ros, 36
 Mascarell, 33
 Mastegatxos, 58
Mauremys leprosa, 73
Melanargia lachesis, 86
Melanelixia subaurifera, 136
Meles meles, 69
Melittaea cinxia, 86
Melittaea deione, 86
Melittaea didyma, 86
Melittaea phoebe, 86
Melospiza undulatus, 66
Mergus serrator / merganser, 17
 Merla blava, 59
 Merla comuna, 57
 Merlet comú, 86
 Merlet ruderal, 86
Merops apiaster, 46
 Migradora dels cards, 86
 Milà negre, 42
 Milà reial, 42
Milvus migrans, 42
Milvus milvus, 42
 Mirallets, 86
Mniotilta occidentalis, 91
 Molstela, 68
Monacha cartusiana, 97
 Monarca, 84, 86
Monticola solitarius, 59
 Morada, 86
 Morada del freixe, 86
 Morell de cap roig, 17
 Moreneta meridional, 86
 Moreres, 126
Morus alba, 126
Morus bassanus, 33
 Mosquiter comú, 54
 Mosquiter de passa, 53
 Mosquiter pal·lid, 53
Motacilla alba, 62
Motacilla cinerea, 61
Motacilla flava, 61
 Murri de la pimpinella, 86
Mus spretus, 70
Muschampia floccifera, 86
Muscicapa striata, 57
 Mussol banyut, 44
 Mussol comú, 6, 43
 Mussol emigran, 44
 Mussol emigrant, 12
Mustela nivalis, 68
Myiopsitta monachus, 8, 49
Myocastor coypus, 72
Myotis myotis, 67
Naevia punctiformes, 136
Natrix astreptophora, 76
Natrix maura, 76
Neoscona adianta, 113
Neovison vison, 72
Netta rufina, 16
 Nimfa boscana, 86
 Nimfa dorment, 86
 Nimfa mediterrània, 86
Nodaria nodosalis, 92
Nycticorax nycticorax, 12, 36
Nymphalis antiopa, 86
Nymphalis polychloros, 86
Nymphicus hollandicus, 66
 Oca d'Egipte, 8, 14
 Oca d'Egipte, 12
Ochlodes sylvanus, 86
Odiellus sp., 114
Oenanthe oenanthe, 60
 Òliba, 6, 42
Onychogomphus forcipatus, 95
Onychogomphus uncatus, 95

- Opegrapha niveoatra*, 136
Oreneta comuna, 52
Oreneta cuablanca, 52
Oreneta cua-rogenca, 53
Oreneta de ribera, 51
Oriol, 50
Oriolus oriolus, 50
Orthetrum brunneum, 95
Orthetrum cancellatum, 95
Orthetrum coerulescens, 95
Orthonama obstipata, 93
Oryctolagus cuniculus, 68
Otus scops, 6, 43
Oxygastra curtisii, 95
P. y. mauretanicus, 33
Paó de dia, 86
Papallona de la c blanca, 86
Papallona de l'arboç, 86
Papallona del lledoner, 86
Papallona reina, 86
Papallona tigre, 85, 86
Papallona zebrada, 86
Papamosques gris, 57
Papilio machaon, 86
Paracorymbia stragulata, 106
Pararge aegeria, 86
Paràsit cuaample, 11, 31
Pardal comú, 61
Pardal de bardissa, 61
Pardal roquer, 60
Pardal xarrec, 60
Parmelia sulcata, 136
Parmelina tiliàcia, 136
Parmotrema hypoleucinum, 136
Parmotrema perlatus, 136
Parmotrema reticulatum, 136
Parot blau, 95
Parot cuanegre, 95
Parot pruinós, 95
Parus major, 50
Passabarrancs comú, 95
Passer domesticus, 61
Passer montanus, 60
Passerell comú, 63
Patania ruralis, 90
Patge de copa, 95
Pellia epiphylla, 131
Pelobates cultripes, 79
Pelodiscus sinensis, 77
Pelophylax kl. grafi, 80
Pelophylax perezii, 80
Perdiu roja, 17
Periparus ater, 50
Periquito, 66
Pertusaria heterochroa, 136
Petronia petronia, 60
Phalacrocorax carbo, 11, 12
Phalacrocorax carbo sinensis, 33
Phasianus colchicus, 8, 17
Philodromus cf margaritatus, 114
Phoenicopterus roseus, 20
Phoenicurus ochrurus, 58
Phoenicurus phoenicurus, 59
Phylloscopus bonelli, 53
Phylloscopus collybita, 54
Phylloscopus trochilus, 53
Phymatoceros bulbiculosus, 131
Physcia adscendens, 136
Physcia leptalea, 136
Physeter macrocephalus, 71
Pi pinyer, 121, 127
Pica pica, 50
Pica-soques blau, 56
Picot garser gros, 48
Picot verd, 48
Picus sharpei, 48
Pieris brassicae, 86
Pieris manni, 86
Pieris napi, 86
Pieris rapae, 86
Pigre gris, 12, 22
Pin pinyer, 128
Pinastre, 117, 118
Pinsà comú, 62
Pinsà mec, 63
Pinus pinaster, 117, 118, 121
Pinus pinea, 121, 127, 128
Pipa aureolada, 94
Pipa aureolada, 95
Pipa vinosa, 95
Pipistrel·la nana, 67
Pipistrellus pygmaeus, 67
Pit-roig, 58
Piula dels arbres, 62
Pixaví de lligacama, 95
Pixaví estriat, 95
Pixaví llis, 95
Pixaví nervat, 95
Platalea leucorodia, 6, 35
Plataner, 117
Platanus x hispanica, 117
Platycnemis acutipennis, 95
Platycnemis latipes, 95
Plegadis falcinellus, 34
Pleuridium acuminatum, 131
Pleuridium subulatum, 131
Pleurotus ostreatus, 134
Pluvialis apricaria, 21
Pluvialis squatarola, 12
Pluvialis squatarola, 22
Podarcis liolepis, 74
Podiceps nigricollis, 20
Pogonatum aloides, 132
Polaines lívid, 95
Polaines ruborós, 95
Polla d'aigua, 19
Pollancre, 120, 124, 125
Polygonia c-album, 86
Polyommatus icarus, 86
Polyommatus thersites, 86
Polytrichum juniperinum, 132
Pòntia comuna, 86

<i>Pontia daplidice</i> , 86	Sagnador escarlata, 95
<i>Populus nigra</i> , 120, 124, 125	Salamandra comuna, 79
Posidònia, 129	<i>Salamandra salamandra</i> , 79
<i>Posidonia oceanica</i> , 129	Saltabardisses cintada, 86
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> , 105	Saltabardisses de solell, 86
<i>Prunella modularis</i> , 61	Saltabardisses europea, 86
<i>Prunus dulcis</i> , 129	Sargantana cuallarga, 74
<i>Psammmodromus algerus</i> , 74	Sargantana iberoprovençal, 74
<i>Pseudephemerum nitidum</i> , 132	<i>Satyrium esculi</i> , 86
<i>Pseudophilotes panoptes</i> , 86	<i>Satyrium ilicis</i> , 86
<i>Pseudovadonia lívida</i> , 107	<i>Satyrium w-album</i> , 84, 86
<i>Pteronemobius lineolatus</i> , 96	<i>Saxicola rubetra</i> , 59
<i>Ptychostomum imbricatum</i> , 132	<i>Saxicola rubicola</i> , 59
<i>Ptychostomum pseudotriquetrum</i> , 132	<i>Sciurus vulgaris</i> , 70
<i>Ptyonoprogne rupestris</i> , 52	<i>Scoliciosporum gallurae</i> , 137
<i>Puffinus yelkouan</i> , 33	<i>Scolopax rusticola</i> , 24
<i>Punctelia subrudecta</i> , 136	<i>Scopula minorata</i> , 92
<i>Pupilla bigranata</i> , 98	Senglar, 70
Puput, 45	<i>Serinus serinus</i> , 63
<i>Pyrgus armoricanus</i> , 86	Serp blanca, 75
<i>Pyrgus malvoides</i> , 86	Serp d'aigua, 76
<i>Pyronia bathseba</i> , 86	Serp de collaret, 76
<i>Pyronia cecilia</i> , 86	<i>Serp de ferradura</i> , 75
<i>Pyronia tithonus</i> , 86	Serp llisa meridional, 75
<i>Pyrrhosoma nymphula</i> , 95	Serp verda, 76
<i>Quercus ilex</i> , 119, 123, 127	Servera, 122
<i>Quercus pubescens</i> , 126	Sit negre, 64
<i>Quercus suber</i> , 122, 123, 126, 127	<i>Sitta europaea</i> , 56
<i>Rallus aquaticus</i> , 11, 19	<i>Sorbus domestica</i> , 122
<i>Ramalina canariensis</i> , 136	<i>Spatula clypeata</i> , 15
<i>Ramalina farinacea</i> , 136	<i>Sphagnum subnitens</i> , 132
<i>Ramalina panizzei</i> , 136	<i>Spialia sertorius</i> , 86
Rascló, 11, 19	<i>Spinus spinus</i> , 63
Raspinell comú, 56	<i>Stenurella nigra</i> , 106
Rata comuna, 70	<i>Stercorarius pomarinus</i> , 11, 31
Ratolí de bosc, 70	<i>Stictoleptura scutellata</i> , 107
Ratolí mediterrani, 70	<i>Streptopelia decaocto</i> , 19
Ratpenat de ferradura petit, 67	<i>Streptopelia turtur</i> , 19
Ratpenat de musell llarg o rater gros, 67	<i>Strix aluco</i> , 44
<i>Rattus norvegicus</i> , 70	<i>Sturnus unicolor</i> , 57
<i>Reboulia hemisphaerica</i> , 132	<i>Sturnus vulgaris</i> , 57
<i>Regulus ignicapilla</i> , 56	<i>Succinea costaricana</i> , 103
<i>Regulus regulus</i> , 56	Suro, 122, 123, 126, 127
Reietó, 56	<i>Sus scrofa</i> , 70
Reineta meridional, 80	<i>Sylvia atricapilla</i> , 55
<i>Remiz pendulinus</i> , 51	<i>Sympetrum fonscolombii</i> , 95
Repicalons, 64	<i>Sympetrum meridionale</i> , 95
Repicalons rústic, 12, 64	<i>Sympetrum sinaiticum</i> , 95
<i>Rhinechis scalaris</i> , 75	<i>Sympetrum striolatum</i> , 95
<i>Rhinolophus hipposideros</i> , 67	<i>Tachybaptus ruficollis</i> , 20
<i>Riccia beyrichiana</i> , 132	<i>Tachymarptis melba</i> , 18
<i>Riccia fluitans</i> , 132	Tallanassos gros, 95
<i>Riparia riparia</i> , 51	Tallanassos petit, 95
<i>Roccella phycopsis</i> , 137	Tallareta comuna, 55
Rodadits de bassa, 95	Tallarol capnegre, 55
Roquerol, 52	Tallarol de casquet, 55
Rossinyol, 58	Tallarol de garriga, 55
Rossinyol bord, 53	<i>Tarentola mauritanica</i> , 74
Roure martinenc, 126	Teixidor, 51
Safranera de l'alfals, 86	Terrerola comuna, 51
Sageta negra, 85, 86	Territ bec llarg, 24

Territ fosc, 11	<i>Turdus merula</i> , 57
Territ fosc, 23	<i>Turdus philomelos</i> , 57
Territ variant, 24	<i>Turdus viscivorus</i> , 57
<i>Testudo hermanni</i> , 73	Turquesa europea, 86
<i>Tetrix ceperoi</i> , 96	Turquesa meridional, 86
Tètrix de les llacunes, 96	<i>Tursiops truncatus</i> , 71
<i>Thalasseus sandvicensis</i> , 32	<i>Tyto alba</i> , 42
<i>Thecla betulae</i> , 3, 86	Ullblau, 95
<i>Thelenella modesta</i> , 137	Ullviu petit, 95
<i>Thyatira batis</i> , 90	<i>Upupa epops</i> , 45
<i>Thymelicus acteon</i> , 86	<i>Usnea filipèndula</i> , 137
<i>Timon lepidus</i> , 74	<i>Usnea glabrescens</i> , 137
Titella, 62	<i>Usnea mutabilis</i> , 137
Toixó, 69	<i>Usnea rubicunda</i> , 137
<i>Tomares ballus</i> , 86	<i>Utetheisa pulchella</i> , 87
Tord comú, 57	<i>Vallonia enniensis</i> , 102
Torlit, 21	<i>Vallonia pulchella</i> , 100
Tornassolada petita, 86	Valona, 27
<i>Tortella nitida</i> , 132	<i>Vanellus vanellus</i> , 22
<i>Tortella squarrosa</i> , 132	<i>Vanessa atalanta</i> , 86
Tórtora de bosc, 19	<i>Vanessa cardui</i> , 86
Tórtora turca, 19	<i>Velella velella</i> , 116
Tortuga aligador, 77	Vellutada del salze, 86
Tortuga babaua, 73	Verderola, 12, 64
Tortuga d'aigua americana, 77	Verdeta d'ull blanc, 86
Tortuga de rierol, 73	Verdeta d'ull ros, 86
Tortuga d'estany, 74	Verdum, 63
Tortuga mapa anellada, 78	Vern, 125
Tortuga mediterrània, 73	<i>Vertigo moulinsiana</i> , 100
Tortuga tova xinesa, 77	Vidriol, 75
<i>Trachemys scripta</i> , 77	Vimetaire occidental, 95
<i>Tringa glareola</i> , 27	Visó americà, 72
<i>Tringa nebularia</i> , 27	<i>Vitrea subrimata</i> , 102
<i>Tringa ochropus</i> , 26	<i>Vulpes vulpes</i> , 68
<i>Tringa totanus</i> , 27	<i>Watsonalla binaria</i> , 91
Trist, 55	<i>Xanthomendoza ulophyllodes</i> , 137
<i>Trithemis annulata</i> , 95	<i>Xanthoria parietina</i> , 137
<i>Trithemis kirbyi</i> , 94	Xarxet, 16
<i>Trithemis kirbyi</i> , 95	Xatrac bec llarg, 6, 32
Tritó palmat, 79	Xatrac gros, 11, 32
Tritó verd, 79	Xibec, 16
<i>Triturus marmoratus</i> , 79	Xiprer, 129
Trobat, 62	Xivita, 26
<i>Trochoida trochoides</i> , 101	Xivitona, 25
<i>Trochosa ruricola</i> , 111	Xoriguer comú, 6, 48
<i>Trochulus hispidus</i> , 98	Xot, 6, 43
<i>Troglodytes troglodytes</i> , 56	<i>Zerynthia rumina</i> , 85
<i>Truncatellina callicratis</i> , 99	<i>Zerynthia rumina</i> , 86
Tudó, 18	<i>Zilla diodia</i> , 113



El Grup de Natura Sterna és una societat adherida a la

ICHN

Institució Catalana d'Història Natural

Filial de l'Institut d'Estudis Catalans