

**ANUARI ORNITOLÒGIC DE
LA VALL DEL RIDAURA
(COSTA BRAVA)
2009**



Carlos Alvarez-Cros (ed.)

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2009

Carlos Alvarez-Cros (ed.)
[\(vallridaura@yahoo.es\)](mailto:vallridaura@yahoo.es)

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2009

Coordinació i selecció de dades
Carlos Alvarez-Cros

Revisió de textos
Josep Ma Bas Lay
Jaume Ramot García

Citació bibliogràfica recomanada.

Obra completa: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2010. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2009.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2009.pdf

Espècie concreta, exemple: Ramot, J. 2010. Ànec collverd (*Anas platyrhynchos*) in: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2010. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2009.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2009.pdf

Foto portada: Cigonyes blanques (*Ciconia ciconia*) i gavians argentats (*Larus michahellis*) a l'abocador de Solius, el 30.VIII.2009. (C. Alvarez-Cros)

PRESENTACIÓ

Aquest anuari ve a iniciar la continuació del primer dels anuaris ornitològics de la vall del Ridaura (Alvarez-Cros, 2010). Mentre que aquell abraçà un període de deu anys, de 1999 a 2008, aquest i els que es té intenció que el segueixin tindran un abast anual. Amb aquests anuaris i el llibre *Els ocells de la vall del Ridaura* (Alvarez, 1999) es pretén tenir un resum de les citacions més destacades produïdes a la vall. La majoria d'observacions que es poden trobar a aquest document ja figuren publicades al web *Actualització del catàleg dels ocells de la vall del Ridaura* (Alvarez, 2005-2010). En tot cas, mentre que aquí estan ordenades per espècie, a aquell es troben en format de noticiari mensual, cosa que dificulta la consulta una vegada ha passat la immediatesa temporal.

INTRODUCCIÓ

Pel que fa a les particularitats d'aquest any 2009, es passa a enumerar les més significatives. Durant la segona meitat de 2008 es va realitzar les obres d'adequació de la zona dels estanys de Platja d'Aro segons les exigències del pla hidràulic. Això comportà la creació d'un estany de dimensions considerables, que les pluges hivernals van emplenar força i la forta sequera estival no aconseguí assecar. Tot i tenir una tardor i un començament d'hivern força secs, el darrer terç de l'any també es va mantenir un nivell d'aigua relativament important. A més, aquest espai es troba totalment tancat, la qual cosa assegura la tranquil·litat dels ocells presents. Aquest fet ha constituït una fita important per tal d'afavorir la presència de determinades espècies d'aus lligades a ambients aquàtics. Un exemple d'això podria ser la detecció, per primera vegada a la vall, de l'ànec canyella (*Tadorna ferruginea*) o la d'espècies molt escasses o rares a la vall com l'ànec blanc (*Tadorna tadorna*), l'ànec xiulador (*Anas penelope*), l'ànec cuallarg (*Anas acuta*), l'agró blanc (*Casmerodius albus*), la cigonya blanca (*Ciconia ciconia*), el territ variant (*Calidris alba*), el territ menut (*Calidris minuta*), la gamba verda (*Tringa nebularia*) o el fumarell negre (*Chlidonias niger*), així com la presència continuada de moltes espècies lligades a ambients aquàtics i no gaire corrents a la vall. Esperem que l'evolució d'aquest espai així com les posteriors actuacions que s'hi portin a terme, s'encaminin cap a l'afavoriment de la recuperació d'una mena d'ambients marjalencs que havien desaparegut totalment de la vall, sota la implacable pressió urbanística.

També es va finalitzar les obres d'adequació del tram final del Ridaura, amb la substitució de la vegetació de ribera per talussos inorgànics de formigó o pedra. Malgrat que durant el pas primaveral, la llera, neta de vegetació, va afavorir la presència de limícoles, la resta d'espècies més o menys lligades als cursos fluvials n'han estat absents. Aquests moviments de terres van fer que un nidificant oportunista com el corriol petit (*Charadrius dubius*) aprofités l'avinentsa i, almenys, tres parelles criessin a la llera del Ridaura i una als estanys de les Escoles.

Com a última modificació, s'ha d'esmentar que, a primers d'any, es portà a terme una important actuació a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro. Es va aprofundir la cubeta, extraient els llots acumulats durant quasi dues dècades i es procedí a una neteja general. S'haurà d'esperar un cert temps per tal que assoleixi una altra vegada l'equilibri ambiental.

D'altra banda, s'ha de remarcar l'excepcional episodi meteorològic esdevingut els darrers dies de desembre de 2008. Aquest fet portà ocells poc habituals a la conca

mediterrània. Exemples notoris són la massiva entrada de gavinetes de tres dits (*Rissa tridactyla*), sovint esgotades, arreu del territori català, o la presència de gavines àrtiques com el gavinot polar (*Larus glaucoides*) a la costa del Mediterrani espanyol (Gutiérrez, 2009). Aquest fenomen probablement hagi afavorit la presència a casa nostra d'espècies poc freqüents, com el flamenc (*Phoenicopterus roseus*) o, fins i tot, rares com el gavià argentat de potes roses (*Larus argentatus*), el gavià caspi (*Larus cachinnans*) o el gavià argentat cantàbric (*Larus michahellis "lusitanus"*), del que, a Solius, es realitzà el que constitueix el primer control fet a Catalunya.

Per fi, i en un altre ordre de coses, cal comentar que, a la primavera d'aquest 2009, va veure la llum el portal www.ornitho.cat. Es tracta d'una base de dades gestionada per l'ICO, que abasta el territori català. És oberta a tothom i no es necessita cap preparació especial per fer-la servir. Nascuda a Suïssa, està cridada a convertir-se en una eina cabdal en la recopilació i gestió de dades ornitològiques a Catalunya, com ja ho està sent a diversos països europeus. Ofereix molts avantatges als usuaris, com la de gestionar les dades pròpies de manera fàcil i atractiva, amb gran potència i flexibilitat de filtratge. També permet accedir a la pràctica totalitat (excepte les de determinades espècies molt sensibles) de les dades introduïdes pels altres observadors. I tot en temps real.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL

A aquest document, per vall del Ridaura, s'entén l'àrea (uns 130 km²) compresa pels termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro (amb la franja oriental del terme de Llagostera) i la part de mar prospectable des de la costa (Fig. 1).

Tal com figura al títol, l'espai temporal abraça l'any 2009.



Fig. 1. Límits, en verd, de la vall del Ridaura (Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2008)

ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI

Tal com s'ha esmentat abans, el naixement del portal www.ornitho.cat posa a l'abast de tothom una única base de dades que abasta tot el territori català. És d'accés fàcil, i és actualitzada i revisada constantment. Per això es recomana l'ús d'aquesta eina per a comunicar les dades ja que, addicionalment, podran servir, entre altres coses, per l'anuari català.

En tot cas, les dades també es poden enviar directament a l'editor d'aquest anuari, a l'adreça de correu electrònic vallridaura@yahoo.es

Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:

- Geogràfic: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de les que es té poca informació.
- Fenològic: dates de presència a la zona, tant extremes, com poc habituals.
- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona.
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona.
- Etològic: comportaments d'interès o poc habituals.
- Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

AGRAÏMENTS

Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l'aportació d'observacions i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible.

METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES

La gran majoria de les dades provenen de comunicacions personals, fruit d'una activitat d'observació ornitològica regular i constant, encara que no professionalitzada. L'altra font, correspon a l'obtenció d'observacions durant les sessions de treball de diferents projectes que s'han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.

- Anellament científic d'ocells i control d'ocells anellats.

Aquest 2009 només es va dur a terme una única jornada d'anellament hivernal als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, per la qual cosa es pot dir que aquesta activitat ha estat pràcticament inexistent. Per tant, moltes espècies d'ocells de mida petita, difícils de detectar per observació directa, continuen sense tenir cap citació addicional des de 1998.

D'altra banda, es continuà amb la labor sistemàtica de lectura d'anelles a distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat (*Larus michahellis*). Com a notes excepcionals d'aquest any, apart del ja comentat control de gavià argentat cantàbric (*Larus michahellis "lusitanius"*), s'ha d'esmentar que es va controlar un exemplar de gavià argentat procedent d'Algèria. Addicionalment, aquesta tasca ha portat associada la detecció d'un taxó que constitueix una raresa a nivell d'estat espanyol. Es tracta d'un l'exemplar de gavià fosc bàltic (*Larus fuscus fuscus*) anellat a Finlàndia que, quan s'homologui, constituirà el primer registre segur d'aquest taxó a Catalunya.

Dins l'àmbit de les lectures d'anelles a distància, també s'ha de fer referència a l'excepcional pas postnupcial de cigonyes blanques (*Ciconia ciconia*) produït aquest any. Com que d'aquesta espècie hi ha un alt percentatge d'exemplars anellats, es va poder fer una cinquantena de lectures d'anelles, la qual cosa va permetre conèixer l'origen dels ocells marcats: França, Alemanya, Suïssa i Espanya.

- Projectes coordinats per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO).

Durant el 2009, diverses persones van continuar col·laborat en diversos projectes endegats per l'ICO. Es finalitzà el treball de camp per a, l'encara inèdit, *Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern, 2006 – 2009* i es continuà amb els recorreguts pel Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC).

- Censos.

Com cada gener, es va participar en la realització del cens anual internacional d'aus aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- Altres.

Com altres anys, la recerca d'ocells marins des de la costa, va ser més aviat irregular i escassa.

Dins el marc d'un projecte més ampli, es portà a terme la col·locació d'algunes caixes niu destinades al gaig blau (*Coracias garrulus*), ocell que no cria a la vall. Malgrat la detecció d'una parella molt a prop d'una de les caixes al començament de l'època de cria, no es té evidències que acabés niant.

Per fi, comentar que es va continuar amb la recerca de rapinyaires nocturns, la qual cosa ha permès confirmar la cria del mussol banyut (*Asio otus*).

ESTRUCTURA

Les espècies d'aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2009 es relacionen en dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a casa nostra. A la segona es llisten les espècies exòtiques i/o escapades de captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s'ha inclòs espècies que, malgrat ser exòtiques com el faisà (*Phasianus colchicus*) o la cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*), mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d'algunes més o menys properes.

També s'inclou les observacions d'ocells fruit de creuaments interespecífics i dues observacions de gavines de les que no s'ha arribat a aclarir la identificació específica. D'aquestes darreres, s'agrairà qualsevol suggeriment que ajudi a la seva identificació.

Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies. L'ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions del BOURC (British Ornithologists' Union Records Committee). Els canvis que, respecte l'anuari precedent, afecten a les espècies de la vall del Ridaura són:

1) Canvis en la seqüència taxonòmica.

- Canvi de posició dels *Podicipediformes* per posar-los al costat dels *Phoenicopteriformes*, (Sangster et al. 2007).
- Reordenació interna de les espècies de les famílies *Accipitridae* (Sangster et al. 2005), *Scolopacidae* (Sangster et al. 2007), *Laridae* (Sangster et al. 2007), *Sternidae* (Sangster et al. 2005), *Hirundinidae* (Sangster et al. 2005) i *Paridae* (Sangster et al. 2005).

2) Canvis taxonòmics.

- Les àguiles calçada i cuabarrada canvien de gènere i passen a *Aquila pennata* i *Aquila fasciata*, respectivament (Sangster et al. 2005).
- El gènere *Larus*, es divideix en diversos i algunes espècies canvien de gènere. Així, la gavina capblanca i la gavina vulgar passen a *Chroicocephalus genei* i *Chroicocephalus ridibundus*, respectivament, i la gavina menuda a *Hydrocoloeus minutus* (Sangster et al. 2007).
- El gènere *Sterna*, es divideix en diversos i algunes espècies canvien de gènere. El xatrac menut passa a ser *Sternula albifrons* (Sangster et al. 2005).
- El gènere *Hirundo* es divideix en diversos i l'oreneta cua-rogenca passa a *Cecropis daurica* (Sangster et al. 2005).
- El gènere *Parus*, es divideix en diversos i algunes espècies canvien de gènere. Ara, la mallerenga blava és *Cyanistes caeruleus*, la mallerenga emplomallada *Lophophanes cristatus* i la mallerenga petita *Periparus ater* (Sangster et al. 2005).

A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la *Llista patró dels ocells de Catalunya* (Clavell i altres, 2006). Immediatament sota seu, el nom científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d'un taxó de nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l'àrea d'estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dóna la següent informació: nombre, edat i sexe dels exemplars, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de l'observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d'una citació a una altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l'observació. Quan es tracta de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d'on s'ha extret la informació. Les citacions d'espècies sotmeses a homologació per part del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (Alvarez i altres, 2008), el CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya) (CAC, 2008) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología) (Dies i altres, 2008), que encara no hagin estat homologades, figuren en lletra de color gris i duen una nota explicativa d'aquest fet. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota on es detalla el número de l'homologació.

De la majoria d'espècies comuns a la vall, sense canvis significatius d'estatus o observacions destacables, no s'inclou les citacions.

Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s'han pres a la vall durant el 2009 i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un asterisc: *.

Per fi, s'inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades.

LLISTAT GENERAL

Ànec canyella

Tadorna ferruginea

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrador esporàdic.

Del 8.VIII al 17.VIII, un jove als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Per l'època de l'any en que es produeix l'observació, l'absència de marques, el plomatge immaculat i el comportament relativament reservat, sembla probable l'origen salvatge de l'ocell (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CAC.



Ànec blanc

Tadorna tadorna

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

Un exemplar adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 25.IX al 29.IX; quarta citació d'aquesta espècie a la vall (CAC, JRG).

Una femella a la desembocadura del Ridaura del 5.XII al 19.XII; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 25.XII (RCA).



Ànec xiulador

Anas penelope

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro del 19.XII al 27.XII (CAC)*.



Xarxet comú

Anas crecca

Estatus: hivernant i migrant escàs però regular.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar del 12.IX al 20.IX (CAC); diversos exemplars del 25.IX al 19.XII, amb màxim de divuit exemplars el 19.XII (CAC)*.



Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Estatus: resident i nidificant relativament comú.

Una femella amb vuit petits a la bassa del Dofí, el 10.IV; primers pollets de la temporada de cria (JRG).

Ànec cuallarg

Anas acuta

Estatus: migrant esporàdic.

Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 25.IX al 27.IX; el 12.X encara en quedaven dos; quarta citació d'aquesta espècie a la vall (CAC).

Un mascle adult, també als estanys de les Escoles, del 7.XI al 26.XII; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*



Xarrasclet

Anas querquedula

Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas prenupcial.

2006. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un juvenil el 2.VIII (CAC).

Ànec cullerot

Anas clypeata

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle el 29.III (CAC), un exemplar de l'11.VIII al 13.VIII (CAC) i un altre del 12.IX al 13.IX (CAC)*.



Perdiu roja

Alectoris rufa

Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l'àrea d'estudi.

Un exemplar a un camp entre el mas Pla i can Dalmau, a Solius, el 15.II (CAC).

Una parella als horts de Castell d'Aro, el 21.III (CAC).

Un exemplar al costat del Ridaura, a la carretera que puja a Tallades, el 21.III (CAC).

Una parella als horts de Castell d'Aro, el 12.IV (CAC).

El 25.V, un exemplar entre can Tirans i el mas Ros, a Castell d'Aro (JBL).

Nou exemplars als horts de Castell d'Aro, el 22.IX (JBL).

Un exemplar prop de roca Tossa, a Santa Cristina d'Aro, el 6.XII (MF).

Guatlla

Coturnix coturnix

Estatus: migrant molt escassa i irregular.

Dos exemplars cantant a Castell d'Aro, el 22.IV (JBL).

Faisà

Phasianus colchicus

Estatus: resident escàs. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors.

Aquest any, almenys s'ha reproduït als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i als horts de Castell d'Aro (CAC)*.



Baldriga cendrosa

Calonectris diomedea

Estatus: migrant regular, escassa a l'estiu.

Intens pas costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 10.V (CAC). El 31.V, a la sortida del sol, 35 exemplars en 10 minuts d'observació (CAC).

Baldriga balear

Puffinus mauretanicus

De vegades, sobre tot a l'hivern, se'n pot observar estols mixtes amb l'espècie següent, molt nombrosos.

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern.

Baldriga mediterrània

Puffinus yelkouan

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; escassa a l'estiu.

Els dies 6.I i 11.I, cap a 300 exemplars s'alimenten front la marina de Platja d'Aro. Barrejades, només s'hi observa un parell de baldrigues balears (*Puffinus mauretanicus*) (CAC).

El 10.I, cap a 1500 exemplars s'alimenten front la punta de Garbí. Barrejades, només s'hi observa unes 10 baldrigues balears (*Puffinus mauretanicus*) (DVS, MCD).

Mascarell

Morus bassanus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escàs a l'estiu, estació durant la qual només s'observa exemplars immadurs.

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Estatus: abundant durant l'hivern i els passos migratoris.

El mateix exemplar, marcat com a poll a Dinamarca al 2001 amb anella de plàstic llegible a distància (T4J) (Alvarez-Cros, 2010)., és detectat per quart hivern consecutiu, al S'Adolix, l'1.I (CAC)*.

Del 9.VIII al 19.VIII, un immadur als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial (CAC).

A finals d'octubre, començament de novembre, s'observa com un grupet de quatre a sis exemplars pesquen cooperativament, resseguint les vores dels estanys (veure gavina vulgar) (CAC)*.



Corb marí emplomallat

Phalacrocorax aristotelis

Estatus: resident, relativament abundant durant tot l'any.

Una parella cria prop de can Pei, a Sant Feliu de Guíxols (RGB, JHC).

Una parella cria a la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, on els petits van descloure la setmana del 20.IV al 26.IV; un mes més tard, el 30.V, ja són completament plumats i una setmana més tard ja no hi són (CAC)*.

El 26.IV, al costat del S'Adolix, a Sant Feliu de Guíxols, una parella pesca junt amb tres joves de l'any (CAC).

El 20.VIII, 13 exemplars a la cala dels Frares, 7 a la del Vigatà i 7 a Les Penyes (CAC).

El 8.IX, es compta 43 exemplars al tram de costa entre Les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols i Punta Prima, a Platja d'Aro (CAC).



Martinet ros

Ardeola ralloides

Estatus: escàs però regular durant els passos migratoris sobre tot durant el prenupcial.

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 10.V (CAC)*.



Esplugabous

Bubulcus ibis

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les condicions de determinats indrets.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 2.V; darrera observació prenupcial (CAC).

El 10.VIII, un juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial (CAC).

Un exemplar a l'abocador de Solius, el 7.XI; primera observació postnupcial a l'abocador (CAC).

Martinet blanc

Egretta garzetta

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular.

Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 28.III (CAC).

Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 9.IV (CAC).

Sengles grups de sis exemplars en migració activa, costa amunt, front la desembocadura del Ridaura i la punta de Garbí, el 9.IV (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro els dies 11.IV i 25.IV (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 25.IV; darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.VII; primera observació postnupcial (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 26.VII (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 26.VII (CAC).

Del 6.VIII al 12.XII diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de nou els dies 19, 20 i 23.VIII, 13 i 20.IX i deu el 27.IX i el 7.XI (CAC).

Els dies 10.VIII, 17.VIII i 5.XII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

El 14.VIII, dos exemplars a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC)*.

El 18.VIII, un exemplar a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Els dies 14.XI i 15.XI i del 5.XII al 26.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Agró blanc

Casmerodius albus

Estatus: espècie en expansió, probablement ja es tracti d'un migrant regular, encara que molt escàs.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 13.IV; cinquena observació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.

Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro del 29.IX al 4.X; sisena observació d'aquesta espècie a la vall (JRG, CAC).

El migdia del 10.X, un exemplar al tram final del Ridaura (AMP).

El 15.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

El 16.X, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

El 14.XI, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).



Bernat pescaire

Ardea cinerea

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular.

El 24.III, cinc exemplars en migració activa, costa amunt, lluitant contra la tramuntana i els atacs dels gavians argentats (*Larus michiehlis*) (JRG, JBL).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, tres exemplars el 28.III; altres tres del 10.IV a l'11.IV. El 2.V encara en quedaven dos (CAC).

Un exemplar al S'Adolix, el 12.IV. En envolar-se, és encalçat pels gavians argentats (CAC).

El 31.V un exemplar en vol en direcció sudoest per sobre l'abocador de Solius; darrera observació prenupcial (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 2.VIII; primera observació postnupcial (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars del 6.VIII al 27.XII amb un màxim de set els dies 7 i 8.IX (CAC).

Un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro, el 3.X (CAC).

Un exemplar sobrevolant l'abocador de Solius, el 4.X (CAC).

El 15.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC)*.

Els dies 21.XI i 6.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Agró roig

Ardea purpurea

Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas prenupcial.

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 10.IV (JRG).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, sis exemplars l'11.IV; xifra rècord a la vall (CAC).

Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Aquest any ha estat espectacular pel que fa a la presència d'aquesta espècie a casa nostra. Només durant el pas postnupcial, el nombre d'exemplars observats ha estat més de deu vegades superior al nombre d'exemplars registrats històricament a la vall.

Estatus: migrador escàs i regular.

Dos exemplars sobrevolant Castell d'Aro el 17.IV (JBL).

Un exemplar a l'abocador de Solius, el 2.VI (CJL).

Del 6.VIII al 27.XII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, marcat amb anella metàl·lica a la tibia dreta i de plàstic blanc amb inscripció negra MA72 a l'esquerra, alliberat el 29.VI.09 del projecte d'introducció de Gallecs, a Mollet del



Vallès (CAC).

El 14.VIII, un grup d'almenys 66 exemplars s'ajoca a diversos punts de Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro. El 15.VIII, s'agrupen als estanys de les Escoles de Platja d'Aro on es llegeix 17 anelles: 15 de França i 2 d'Alemanya (CAC, JBL, JRG, LHM, VGK)*.

El 17.VIII es troben dos exemplars (un d'ells marcat a França) morts sota una torre d'electricitat a Platja d'Aro (JRG, CAC).

Del 17.VIII al 30.VIII un exemplar no anellat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

El 29.VIII, un grup d'almenys 62 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del que es llegeix 3 anelles (CAC).

El 29.VIII, 5 exemplars a l'abocador de Solius, dels que es llegeix 2 anelles (CAC).

El 30.VIII, un grup de 15 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro dels que es llegeix 5 anelles, la qual cosa permet concloure que es tracta d'un grup diferent del del dia abans (CAC).

El 30.VIII, no menys de 27 exemplars a l'abocador de Solius, dels que es llegeix 16 anelles. Una vegada aquest grup ha marxat, apareix el que s'havia observat el mateix dia als estanys de les Escoles, cosa que s'ha pogut saber per les anelles (CAC).

Un grup d'onze exemplars remuntant una tèrmica sobre els horts de Castell d'Aro, l'1.IX (JBL).

Del 5.IX al 13.IX, un grup d'un màxim de 18 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro dels que es llegeix diverses anelles, la qual cosa permet concloure que es tracta d'ocells pertanyents als grups del cap de setmana anterior. Algun d'ells es va anar observant a l'abocador de Solius. Els dies 19.IX i 20.IX només en resten tres exemplars i el 25.IX ja només queden els dos exemplars anellats a Gallecs, Mollet del Vallès, que hi romanen almenys fins el 27.XII (CAC).

Flamenc

Phoenicopterus roseus

Estatut: migrador molt escàs i irregular.

Un adult a la platja de Sant Feliu de Guíxols, el 25.I (MM, RSA)*.



Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Estatut: resident i nidificant escàs. Un increment de la prospecció ha aportat noves observacions de cria. Regular com hivernant i en migració.

De l'1.I al 7.III, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

El 10.I, cinc exemplars als estanys del golf de Mas Nou (CAC).

El 18.I, un exemplar a la bassa de can Perera, i un altre a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 13.III, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (ACH).

Del 12.IV al 2.V, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC):

Del 9.IV al 31.V, quatre exemplars als Escoles de Platja d'Aro (CAC).

El 19.IV, una parella fa niu als Escoles de Platja d'Aro (CAC).

El 13.IV, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (ACH, PFL).

El 2.V, un exemplar als estanys del golf de Mas Nou (CAC).

El 2.V, dos exemplars a la bassa de can Perera, i dos més a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes, Llagostera (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, cinc polls el 07.VI (CAC).

El 13.VI, un poll ja crescut a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 20.VI, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

El 28.VI, es constata que sengles parelles han criat als dos estanys del golf de Mas Nou (CAC).

El 10.VIII, es compta fins a 31 exemplars a la vall: nou als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, nou a l'estany est del golf de Mas Nou (dos adults, quatre primers any i tres polls), vuit a l'estany oest, quatre (dos adults i dos polls) a la bassa de l'Alou i un adult a la bassa del Dofí (CAC).

L'11.VIII, un exemplar a la bassa de les Reinetes (JRG, CAC).

L'11.XII, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Cabussó emplomallat

Podiceps cristatus

Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.

Un exemplar a la badia de Sant Pol, el 2.I (CAC).



Cabussó collnegre

Podiceps nigricollis

Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 19.IX i 20.IX (CAC).



Aligot vesper

Pernis apivorus

Estatus: migrador regular.

Milà negra

Milvus migrans

Estatus: migrant abundant que, en determinats moments, pot presentar elevades concentracions. No s'ha arribat a comprovar-ne la nidificació, però sí la presència d'exemplars no reproductors durant el període de cria, a l'abocador de Solius.

Dos exemplars, a l'abocador de Solius, el 22.III; primera observació prenupcial. Un d'ells cleptoparasita amb èxit els gavians argentats (CAC)*.

El 13.IV, de 20 a 25 exemplars a l'abocador de Solius (ACH, PFL).

Aquest any, durant l'estació reproductora, a l'abocador de Solius, només s'observa un màxim de quatre exemplars (CAC).

A l'abocador des Solius, els dos primers joves de l'any, el 18.VII (CAC).



Voltor comú

Gyps fulvus

Estatus: migrant i divagant hivernant molt escàs i irregular.

Un exemplar en vol baix i direcció nordoest, sobre la C-31 a l'alçada del km 312, a Santa Cristina d'Aro, el 2.VI; sisena citació a la vall (LZH).

Àguila marcenca

Circaetus gallicus

Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Malgrat les sospites i les observacions en època reproductora, no s'ha arribat a confirmar la cria a la vall.

Un exemplar, des de l'abocador de Solius, el 22.III; primera observació prenupcial (CAC).

El 13.IV, dos exemplars a l'abocador de Solius (ACH, PFL).

El 2.V, un exemplar a Panedes (CAC).

El 26.V, un exemplar entre la Divina Pastora i Sant Benet (JBL).

Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Estatus: migrant regular.

El 13.IV, un exemplar en migració, a Panedes (ACH, PFL).

Una femella sobrevolant els horts de Castell d'Aro, el 18.IV (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 24.X (CAC).

Astor

Accipiter gentilis

Estatus: Malgrat el seu caràcter sedentari, no s'ha arribat a constatar la cria a la vall i la majoria de les observacions es concentren a la tardor i a l'hivern..

A l'abocador de Solius, un exemplar ataca als gavians argentats (*Larus michahellis*), el 25.I i el 15.II (CAC).

Un exemplar, al pla de Solius, el 28.I (JBL).

A l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar molestar a un jove d'àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*), el 22.II (CAC).

El 25.V, un exemplar entre can Tirans i el mas Ros, a Castell d'Aro (JBL).

El 5.IX, un exemplar a l'abocador de Solius. (CAC).

El 7.IX, un exemplar al nord de roca Rovira (CAC).

El 14.XI, un exemplar sobre el Ridaura, al començament de la carretera que puja a l'abocador de Solius. (CAC).

Un exemplar a una sureda de prop de can Barella, Panedes, a Llagostera, el 19.XII (CAC).

Esparver vulgar

Accipiter nisus

Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

Una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, l'1.I i el 21.II (CAC).

Un exemplar per sobre can Juanals, a Castell d'Aro, el 2.I (CAC).

Un exemplar a l'abocador de Solius, el 28.II (CAC).

El 22.III, un exemplar, depreda sobre pardal comú (*Passer domesticus*), a la menjadora d'un jardí de Platja d'Aro (CMC).

Un exemplar, des de l'abocador de Solius, el 22.III (CAC).

Un mascle aturat a un pi de Panedes, Llagostera, el 9.VI (JBL).

El 7.IX, un exemplar al nord de roca Rovira (CAC).

Una femella remunta sobre els horts de Castell d'Aro abans de prendre direcció sud, el 24.X (CAC)*.

Un exemplar al tram final del Ridaura, el 8.XI (CAC).

El 15.XI, un mascle adult a l'abocador de Solius. (CAC).

El 25.XII, una femella entre la desembocadura del Ridaura i els estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).



Aligot comú

Buteo buteo

Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.

Malgrat la presència al pla de Panedes, a l'abocador de Solius i a Santa Cristina d'Aro durant l'estació reproductora, no s'ha comprovat la cria a la vall.

No menys de 10 exemplars junts a l'abocador de Solius, l'1.I (CAC).



Àguila calçada

Aquila pennata

Estatus: migrant regular, encara que escàs.

Un exemplar de fase fosca sobrevolant els estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 15.X. (CAC)*.



Àguila cuabarrada

Aquila fasciata

Estatus: divagant molt irregular i escàs.

Un immadur a l'abocador de Solius, els dies 22.II, 1.III, 7.III, 21.III i 18.IV (CAC)*.

Un adult a l'abocador de Solius, el 17.X (CAC).



Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant. Només es recullen les dades durant l'època de cria.

El 26.V, dos exemplars entre la Divina Pastora i Sant Benet (JBL).

Els dies 4.VI i 12.VI un mascle a l'abocador de Solius (CAC).

Observat diverses vegades un exemplar als horts de Castell d'Aro, que es dirigia cap a Roques Martines durant l'estació reproductora (JBL, JRG).

El 29.XI s'observa un exemplar que devia haver passat la nit a una



finestra alta que dominava els estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC)*.

Falcó pelegrí

Falco peregrinus

Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.

El 3.I, un adult caça pels penyassegats del sud de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 10.I, un exemplar als penyassegats del sud de Sant Feliu de Guíxols (JRG, LHM, DBV).

El 28.I, un exemplar al Matxacuca (JBL).

El 10.III, una parella pels penyassegats del sud de Sant Feliu de Guíxols (LDL).

El 25.IV, un exemplar a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 7.VI, una adult amb dos polls totalment plumats als penyassegats del sud de Sant Feliu de Guíxols (CAC)*.



Rascló

Rallus aquaticus

Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat.

Al tram final de Ridaura, un exemplar el 26.IX; primera observació postnupcial. (CAC).

Al mateix indret, es va detectar diversos exemplars entre el 3.X i el 8.XI; el 31.X almenys tres exemplars. (CAC).

Un exemplar al Ridaura a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 14.XI i 29.XI, 26.XII i 27.XII (CAC).

Al tram final de Ridaura, un exemplar els dies 6.XII i 12.XII (CAC).

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 19.XII (CAC).

Polla pintada

Porzana porzana

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

Al tram final de Ridaura, dos exemplars el 31.X i, almenys, un l'1.XI; dates força tardanes per l'espècie. (CAC)*.



Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Estatus: resident sedentari, relativament abundant.

Una parella amb quatre petits als estanys de Platja d'Aro, el 30.V; primers pollets de la temporada de cria (CAC).

Fotja vulgar

Fulica atra

Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.V; sisena citació a la vall (CAC)*.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, des del 9.X al 15.XI; setena citació a la vall (JRG, CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 27.XII; vuitena citació a la vall (CAC).



Grua

Grus grus

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

Un estol de 37 exemplars sobrevolant Platja d'Aro, el 6.III (JRG).

Un exemplar a un camp del costat del mas Candell de Platja d'Aro, el 17.XI; el 21.XI encara és present a la zona (JRG, CAC)*.



Cames llargues

Himantopus himantopus

Estatus: migrador regular.

Els dies 30.V i 31.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 13.VI i tres exemplars del 25.VII al 26.VII (CAC).



Corriol petit

Charadrius dubius

Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs.

Tres exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 22.III; primera observació prenupcial (CAC).

De dos a quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura, des del 4.IV al 13.VI (CAC).

El 10.V, set exemplars al tram final del Ridaura, a l'alçada de l'estació de bombeig (JBL). Un exemplar al Ridaura, a l'alçada de can Bada, el 10.V (JBL).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 25.IV i 26.IV, dos exemplars i els dies 2.V, 3.V, 31.V i 6.VI, un (CAC); el 16.V una parella copula (CAC).

El 30.V un adult vigila dos polls petits a la desembocadura del Ridaura; nou lloc de cria (CAC).

Els dies 13 i 27.VI un adult cova quatre ous al tram final del Ridaura (CAC); els polls desclouen el 28.VI (JBP, JO)*.

El 27.VI, una parella amb, almenys, tres polls als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

El 27.VI, una parella amb tres polls completament plomats al Ridaura, a l'alçada de can Bada (CAC)



Corriol gros

Charadrius hiaticula

Estatus: migrador irregular, molt escàs.

A la desembocadura del Ridaura quatre exemplars el 25.IV; el 26.IV encara n'hi havia dos (CAC)*. Un exemplar del 2.V al 10.V (CAC). Un exemplar el 30.V (CAC).



Fredeluga

Vanellus vanellus

Els efectius d'aquesta espècie estan molt influïts per les condicions meteorològiques, essent més abundants en aquells hiverns més freds. D'altra banda, a la vall, el gruix d'hivernants sol localitzar-se al pla de Panedes.

Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.

Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, amb màxims de 105 exemplars a un mateix camp, el 25.I i uns 130 exemplars el 15.II (CAC).

Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, l'11.X; dos, el 15.X i un el 16.X (CAC)*.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 10.XII i, almenys vuit exemplars l'11.XII (CAC).

Trenta-quatre exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, l'11.XII i vuitanta-nou al mateix lloc, el 25.XII (CAC).



Territ menut

Calidris minuta

Estatus: ha passat de ser un migrador escàs a molt escàs.

Un exemplar als estanys de les Escoles, el 2.VIII. (CAC)*.



Territ variant

Calidris alpina

Estatus: migrador esporàdic.

El 9.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie, que no es detectava a la vall des de 1990 (CAC).

Un altre exemplar al mateix lloc els dies 24.X i 25.X (CAC)*.



Becadell sord

Lymnocryptes minimus

Estatut: hivernant molt escàs i localitzat.

Un exemplar a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes, Llagostera, l'11.XII (CAC).

Becadell comú

Gallinago gallinago

Estatut: hivernant i migrador relativament abundant.

Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 10.I (CAC)*.

Presència hivernal als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb 7 exemplars com a xifra màxima, el 7.II (CAC).

La darrera observació prenupcial a la vall es produeix el 2.V a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 4.X; primera observació postnupcial (CAC).

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 19.XII (CAC).



Becada

Scolopax rusticola

Estatut: hivernant i migrador relativament abundant.

Un exemplar prop de la punta d'en Bosch, el 10.I (JRG, LHM, DBV).

Un exemplar rere el Molí d'en Tarrés, el 22.XI (MF).

Un exemplar prop de roca Tossa, a Santa Cristina d'Aro, el 6.XII (MF).

Xivitona

Actitis hypoleucos

Estatut: migrador i hivernant regular, encara que escàs.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.V; darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, l'11.VII; primera observació postnupcial (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars del 2.VIII al 30.VIII amb un màxim de quatre del 16.VIII al 30.VIII (CAC).

Del 5.IX al 20.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

Xivita

Tringa ochropus

Estatus: migrador regular.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, cinc exemplars el 4.IV (CAC)*.

A la bassa del Dofí, un exemplar l'11.IV, dos exemplars el 13.IV i un altre exemplar el 26.IV (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 12.VII (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 27.IX (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 16.X (CAC).



Gamba roja pintada

Tringa erythropus

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

Del 6.VIII al 23.VIII, un juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 8, 11 i 12.VIII, dos; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.



Gamba verda

Tringa nebularia

Estatus: migrador esporàdic.

Dos exemplars als estanys de les Escoles, el 29.VIII (CAC).

Del 5.IX al 8.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

Del 26.IX al 25.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 27.IX, dos (CAC)*.



Valona

Tringa glareola

Estatus: migrador regular.

A la desembocadura dels Ridaura, un exemplar de l'1.V al 3.V (CAC)*.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 26.VII (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 19 i 20.IX (CAC).



Gamba roja vulgar

Tringa totanus

Estatus: de migrador escàs però regular ha passat a molt escàs i irregular.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 19.IV, un altre l'1.V i tres el 3.V (CAC).



A la desembocadura del Ridaura, cinc exemplars l'1.V, nou el 2.V i tres el 3.V (CAC)*. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 20.VI (CAC).

Paràsit cuapunxegut

Stercorarius parasiticus

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un migrador regular, encara que molt escàs.

Un exemplar de fase fosca, en vol costa amunt, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 13.IV; segona citació d'aquesta espècie a la vall (CAC). El 19.IV, al mateix indret, dos exemplars foscos no identificats però probablement pertanyents a aquesta espècie, passen costa amunt (CAC).

Paràsit gros

Stercorarius skua

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un hivernant i migrador regular, encara que escàs.

Un exemplar entre la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols i la punta d'en Pau de S'Agaró, el 10.I (CAC, DVS, MCD, JBL).

Un exemplar una milla mar endins front punta Prima, el 25.X (JBL).

Un exemplar, volant costa amunt, front punta Prima, el 14.XI (CAC).

Gavina vulgar

Chroicocephalus ridibundus

Estatus: migrador abundant i hivernant regular.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 26.IV; darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar adult a la desembocadura del Ridaura, el 4.VII; primera observació postnupcial (CAC).

Primer exemplar juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 18.VII (CAC).

A finals d'octubre, començament de novembre, s'observa com un petit estol d'uns 35 a 40 exemplars i algun martinet blanc segueixen un grupet de quatre a sis corbs marins grossos que van resseguint les vores dels estanys, tot pescant.

Aquesta activitat dels corbs marins deu espantar petits animalons que són aprofitats per les gavines i els martinets blancs (CAC)*.



Gavina capnegra

Larus melanocephalus

Estatus: migrador i hivernant regular i escàs.

Un adult a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols, el 10.I (CAC, DVS, MCD).

El matí del 21.III, intens pas costa amunt, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

A la desembocadura dels Ridaura, un 2n any del 16.V al 17.V; observació molt tardana (CAC)*.

El 10.VIII, un adult al port de Sant Feliu de Guíxols; primera observació postnupcial. (CAC).

El 12.VIII, un juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

Quatre exemplars: dos adults i dos primers any als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 24.X (CAC).

Set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 14.XI (CAC).

Cinc exemplars en vol en direcció sud, front punta Prima, el 14.XI (CAC).



No menys de vint exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 6.XII (CAC).

Dos exemplars front Platja d'Aro, el 12.XII (JBC). (ICO, 2009).

Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 25.XII (RCA).


Gavià fosc

Larus fuscus

Observable tot l'any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l'abocador de Solius. Aquest any, els màxims s'han produït al mes d'abril. Els mínims, entre la fi del pas prenupcial i la dispersió postnupcial, al maig – juliol. (Fig. 2).

Estatus: hivernant i migrador regular i estival en petit nombre.

Fig. 2. Comparació del promig mensual del nombre d'exemplars de gavià fosc (*Larus fuscus*) observats per hora, a l'abocador de Solius, durant l'any 2009, front el promig del període 2004 - 2009 (CAC).



No menys de quinze exemplars diferents a l'abocador de Solius, el 13.IV Xifra rècord a la vall (CAC).

A l'abocador de Solius, l'1.VIII s'observa un adult de la subespècie nominal (*Larus fusucs fuscus*) o gavià fosc bàltic, amb anella blanca i inscripció negra llegible a distància (CPAH), anellat a Espoo, Uusimaa, Finlàndia. (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO.

A l'abocador de Solius, els dies 5.XII i 8.XII, s'hi observa un segon any marcat el 04/07/08 a Amrum / Odde, Alemanya, al tars dret amb anella de plàstic vermell amb inscripció blanca H295 i anella metàl·lica al tars esquerre (CAC).



A l'abocador de Solius, el 12.XII, s'hi observa un primer any marcat a Alemanya, al tars dret amb anella de plàstic vermell amb inscripció blanca H·892 i anella metàl·lica al tars esquerre (CAC).

El 27.XII, s'observa un adult marcat amb anella metàl·lica al tars dret, a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Gavià argentat de potes roses

Larus argentatus

Estatus: es tracta d'un migrador i divagant hivernal molt escàs, encara que regular.

Es té notícia de l'exemplar juvenil observat l'abocador de Solius, el 12.X.2003, amb anella blanca llegible a distància (V:H), anellat com a poll a Bristol, Regne Unit. Aquesta citació no va ser enviada a homologar pel CAC, ja que l'anellador tenia dubtes de si podria tractar-se d'un híbrid amb gavià fosc (*Larus fuscus*). Aquesta hipòtesi es va confirmar en tornar-se a observar l'exemplar prop del lloc de naixença, ja amb plomatge d'adult, amb aparença de gavià fosc (Peter Rock, com. pers.). (CAC).



A l'abocador de Solius, s'hi observa un tercer hivern, el 14.II (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CAC.



A l'abocador de Solius, s'hi observa un adult, l'1.III (CAC)*. Citació homologada pel CAC (ICO, 2009).



A l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern, del 22.III al 28.III. Aquest mateix ocell havia estat observat a Tarragona a mitjans de gener (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CAC.

A l'abocador de Solius, s'hi observa un altre primer hivern, el 28.III (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CAC.

A l'abocador de Solius, s'hi observa un tercer hivern, el 5.IV (CAC). Citació pendent d'homologació pel CAC.



A l'abocador de Solius, s'hi observa un adult, el 18.IV (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CAC.



A l'abocador de Solius, s'hi observa un adult, l'1.V (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CAC.



Gavià argentat

Larus michahellis

Estatus: present durant tot l'any; nidificant abundant.

El 4.I, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià marcat a San Sebastián el juny/08, amb anella vermella i inscripció blanca (G939) al tars esquerre i anella metàl·lica al tars dret. Després d'una observació feta a València el gener de 2007, d'un altre primer hivern anellat a la mateixa zona i d'un adult que havia estat anellat com a poll a Galícia i fou observat a Málaga el desembre passat, aquesta és la tercera observació segura d'un ocell d'aquesta raça (*L. m. "lusitanius"*) feta a la zona de la Mediterrània (CAC)*.



El 25.I, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern amb el bec deformat i un adult amb una pota groga i l'altra de color carn (CAC)*.

El 22.III, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar leucístic (CAC)*.



El 13.IV, a l'abocador de Solius, es llegeix una anella metàl·lica corresponent a un ocell anellat a Sant Feliu de Guíxols el maig del 1991. Per tant, aquest ocell tenia quasi 18 anys (CAC).

El 31.V, primer poll volander a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).



El 7.VI, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar anellat amb una combinació d'anelles de color, probablement anellat a València. No s'havia observat mai un marcatge d'aquestes característiques. (CAC)*.

El 13.VI, a l'abocador de Solius, s'hi observa el primer jove de l'any (CAC).

Els dies 20, 27 i 28.VI, a l'abocador de Solius, es llegeix unes anelles metàl·liques corresponents a uns ocells anellats a Sant Feliu de Guíxols el maig del 1991. Per tant, aquests ocells tenien 18 anys (CAC). Al mateix lloc, el 19.VII i el 12.IX es llegeix una anella metàl·lica d'un exemplar anellat a Platja d'Aro el maig de 1990, per tant aquest ocell tenia 19 anys i constitueix el rècord de longevitat per aquesta espècie a Catalunya, tot i que s'estima que aquests ocells poden viure fins a quaranta anys (CAC).

El 18.VII, a l'abocador de Solius, es llegeixen les primeres anelles corresponents a joves de l'any de França i Balears (CAC).



El 19.VII, a l'abocador de Solius, s'observa un jove de l'any marcat amb anella blanca i inscripció negra A010C, marcat a Algèria; primera observació d'un exemplar d'aquest origen a l'estat espanyol (CAC)*. El mateix exemplar es torna a observar, al mateix indret, el 27.IX (CAC).



Com cada any, durant els mesos d'estiu i tardor es multipliquen les observacions d'ocells amb hams de pesca clavats (CAC)*



El 24.X, a l'abocador de Solius, un adult amb les mandíbules lleugerament creuades; es torna a observar el 25.XII (CAC)*.

Gavià caspi

Larus cachinnans

Actualment, a l'estat espanyol, no hi ha cap registre homologat d'aquesta espècie ja que el CR-SEO n'està revisant els criteris d'identificació (De Juana i altres, 2007, Dies i altres, 2008).

Estatus: cas d'homologar-se aquestes observacions es tractaria d'un divagant hivernal i migrador escàs encara que regular.

El 3.I, a l'abocador de Solius, s'observa un possible exemplar de primer hivern de gavià caspi. L'ocell presentava un aspecte estilitzat. El cap blanc i afuat, amb l'ull petit i davanter i el bec, de marges paral·lels, fosc, però canviant a clar. Color del dors, gris molt clar. L'observació va ser molt curta ja que un camió l'espantà i no es va poder tornar a localitzar-lo (CAC).

A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer, el 14.II. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.



A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern de caràcters barrejats, el 14.II. (CAC)*.



A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern, el 15.II. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.



A l'abocador de Solius, s'observa un segon exemplar de primer hivern, el 15.II. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.



A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon hivern, l'1.III (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.



Al mateix indret, un adult, el 8.III. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.



Gavians no identificats

Larus sp.



El 28.III, a l'abocador de Solius, s'observa una gavina de mida més petita i color gris dorsal lleugerament més clar que els gavians argentats (*Larus michahellis*). Tenia les potes rosades, el cap arrodonit, els ulls foscos i el bec delicat, groc grisós, amb franja subterminal negra. Diverses persones més o menys expertes varen opinar sobre la identificació sense arribar-se a cap conclusió. Els noms específics que varen sortir van ser: *michahellis*, *delawarensis*, *canus*, *argentatus* i, fins i tot, *californicus* (CAC)*.



dorsal amb un lleuger matís blavós, puntes de les primàries més externes completament blanques, estat de muda bastant retardat en comparació al del gavià argentat (*Larus michahellis*) mediterrani. Un expert asturià opina que podria tractar-se d'un gavià argentat de raça cantàbrica (*Larus michahellis* "*lusitanus*"), encara que atípic (CAC)*.

Fumarell negre

Chlidonias niger

Estatus: migrador esporàdic.

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 25.IV; hores més tard s'observa als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC)*. Segona citació d'aquesta espècie a la vall, després d'una de l'agost de 1993 (Alvarez, 1999).



Xatrac bec llarg

Sterna sandvicensis

Estatus: migrador i hivernant regular.

Dos exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols, el 8.IX; primera observació postnupcial. (CAC).

Gavot

Alca torda

Estatus: hivernant regular i escàs.

Un exemplar front la desembocadura del Ridaura, l'11.XII (CAC).

Dos exemplars front Platja d'Aro, el 12.XII (JBC). (ICO, 2009).

Fraret

Fratercula arctica

Estatus: migrador i hivernant molt irregular i escàs.

Donada l'escassetat de dades d'aquesta espècie, s'inclou la següent tot i que es va fer des d'una embarcació i no des de la costa.

Diversos exemplars entre 4 i 5 milles front la costa de Sant Feliu de Guíxols, el 14.III (LDL).

Colom roquer

Columba livia

Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota originària d'aus escapades de captivitat.

Estatus: resident, sedentari, abundant.

Tudó

Columba palumbus

Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

Estatus: resident sedentari, abundant.

Tórtora

Streptopelia turtur

Estatus: migrador i nidificant escàs.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 19.IV; primera observació prenupcial (CAC).

Cotorreta de pit gris

Myiopsitta monachus

Estatus: després d'eradicar la incipient colònia establerta a Castell d'Aro, sembla que torna a nidificar a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions.

Observada durant tot l'any a una palmera front l'Hostal La Gavina de S'Agaró i a les palmeres dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. (CAC)

Cucut

Cuculus canorus

La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

Estatus: migrador i reproductor escàs.

Un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro, el 9.IV: primera observació prenupcial (CAC).

Òliba

Tyto alba

Estatus: resident nidificant escàs.

Detectada al la torre del mas Ros (JRG).

Una parella a ca l'Anglada de Solius (MPX).

Una parella es reproduïx al monestir de Solius (JRG).

Xot

Otus scops

Estatus: migrant i nidificant escàs.

Duc

Bubo bubo

La població d'aquesta espècie a la vall sembla estabilitzada al voltant de les cinc parelles. Sembla que aquest any la cria no ha estat gaire reeixida. (JRG).

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

El 5.I, es captura i es torna alliberar un mascle a Pineda de Mar, Barcelona. Aquest exemplar havia estat anellat com a poll a Castell d'Aro, el 9.IV.08 (HAP, JGM, JRG).

El 3.I una parella a la zona de roca Ponça (JRG).

El 8.I una parella a la zona de Pedralta (JRG).

Els dies 10.I i 31.V, un exemplar a una cala de Sant Feliu de Guíxols (CAC)*.



Mussol comú _____

Athene noctua

Estatus: resident nidificant escàs.

Parella al mas del costat de la carretera de Castell d'Aro a Platja d'Aro (CAC).

Parella al costat del càmping Riembau (JRG).

Mussol banyut _____

Asio otus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un nidificant molt escàs.

Un exemplar, a Panedes, Llagostera, el 12.IV (ACH, PFL).

Dos polls volanders i un adult a Panedes, l'1.VII; primera evidència de cria a la vall (JBL, JRG).

Enganyapastors _____

Caprimulgus europaeus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.

Ballester _____

Apus melba

Abundant durant els passos migratoris i a les muntanyes de Gavarres i Ardenya, encara que no se n'ha confirmat la cria.

Estatus: migrador i estival relativament abundant.

No menys de quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 13.VI (CAC).

Falciot negre _____

Apus apus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.

Blauet _____

Alcedo atthis

Present durant els passos migratoris i a l'hivern a les poques zones humides i al mar.

Estatus: migrador i hivernant escàs.

Un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 16.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diverses observacions d'un exemplar del 30.VIII al 7.XII; dos, el 12.X (CAC, JRG).

Del 5.IX al 19.XII, diverses observacions d'un exemplar al tram final del Ridaura (CAC).

El 28.XI, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

Un exemplar a la bassa de l'Alou, a Panedes, Llagostera, l'11.XII (CAC).

Abellerol _____

Merops apiaster

Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs.

Primera observació prenupcial als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 25.IV (CAC)

Gaig blau _____

Coracias garrulus

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

Una parella volta pel pla de Panedes, Llagostera, a principis de juny, sense que es confirmi la cria. (JBL).

Puput _____

Upupa epops

Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recullen dades de desembre i gener), encara que escàs.

Vuit exemplars a un camp de Castell d'Aro, el 18.IX. (JRG).

Picot verd _____

Picus viridis

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser gros _____

Dendrocopos major

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser petit _____

Dendrocopos minor

Estatus: hivernant escàs i localitzat. No s'ha constatat la cria a la vall.

Diverses observacions d'individus solitaris o parella a una pollancreda entre can Provensal i la variant de Santa Cristina d'Aro, del 18.I a l'1.III (CAC)*.

Almenys un exemplar a la pollancreda entre can Provensal i la variant de Santa Cristina d'Aro, els dies 7.VIII, 4.X, 1.XI i 9.XII (CAC).



Cogullada vulgar _____

Galerida cristata

Estatus: present tot l'any. No massa abundant.

Cotoliu _____

Lullula arborea

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada.

Alosa vulgar _____

Alauda arvensis

Estatus: migrant i hivernant escàs.

Dos exemplars a l'abocador de Solius, l'1.I (CAC).

Presència hivernal a Panedes, Llagostera, amb màxim de més de cent exemplars a un mateix camp del costat de can Perera, el 18.I (CAC).

No menys de cinquanta-sis exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, l'11.XII (CAC).

Oreneta de ribera _____

Riparia riparia

Estatus: migrant no massa abundant.

El 22.III, als estanys de les Escoles, s'observa un exemplar barrejat amb un grup d'orenets vulgars (*Hirundo rustica*). Primera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 20.VI (CAC).

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

Estatus: hivernant escàs i localitzat.

Sis exemplars prop de la punta d'en Bosch, el 10.I (JRG, LHM, DBV).

Encara un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 4.IV (CAC).

El 21.XI, més de 20 exemplars a la desembocadura del Ridaura. (TSB i altres membres del Centre Excursionista de Terrassa)

Durant el mes de desembre, es confirma la presència d'unes dues dotzenes d'exemplars a l'edifici Beach Palace, situat a la desembocadura del Ridaura. Sembla que aquests roquerols podrien dormir-hi aprofitant els nius de la colònia estival de cria d'oreneta cuablanca (CAC):

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.

Dos exemplars al tram final del Ridaura i un altre als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 13.II; primera observació prenupcial (JBL, LHM).

Oreneta cuablanca

Delichon urbicum

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.

Oreneta cua-rogenca

Cecropis daurica

Estatus: migrant i nidificant escàs.

Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 12.IV; primera observació prenupcial (CAC).

Encara set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 16.X; darrera observació postnupcial (CAC).

Trobat

Anthus campestris

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador escàs.

Un exemplar a l'abocador de Solius, l'1V (CAC)*.

Titella

Anthus pratensis

Estatus: migrador i hivernant abundant.

Almenys un exemplar, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 14.X; primera observació postnupcial. (CAC).

Grasset de muntanya

Anthus spinoletta

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador molt escàs.

Almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 24.X i 25.X (CAC).

Els dies 15.XI i 28.XI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.



Cuereta groga

Motacilla flava

Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral.

Primers exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 4.IV (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 30.VIII; primera observació postnupcial (CAC).

Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

Estatus: present tot l'any en nombre no massa abundant.

Cuereta blanca

Motacilla alba

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cargolet

Troglodytes troglodytes

Estatus: present tot l'any relativament abundant.

Pardal de bardissa

Prunella modularis

Estatus: hivernant relativament abundant.

Almenys un exemplar, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 7.XI; primera observació postnupcial. (CAC).

Pit-roig

Erithacus rubecula

Estatus: nidificant escàs i migrador i hivernant abundant.

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.

Un exemplar al costat de can Provencal, a Santa Cristina d'Aro, el 9.IV. Primera observació prenupcial (CAC).

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.

El 24.X s'observa els primers exemplars, després de l'estació reproductora, a l'abocador de Solius (CAC).

Cotxa cuarroja

Phoenicurus phoenicurus

Estatus: migrador regular i escàs.

A mitjans de març, una parella roman diversos dies a un hort de Castell d'Aro (JRG, JBL).

Bitxac rorenc

Saxicola rubetra

Estatus: migrador regular i escàs.

El 13.IV, un exemplar a Panedes; primera observació primaveral (ACH, PFL).

Un exemplar als horts de Castell d'Aro, el 22.IX (JBL).

Bitxac comú

Saxicola torquatus

Estatus: present tot l'any.

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Estatus: migrador regular i escàs.

L'1.V, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació primaveral (CAC).

Merla blava

Monticola solitarius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, encara que localitzat.

L'11.XII, s'observa un mascle a la barana del terrat del 32 del carrer Maragall de Sant Feliu de Guíxols, lloc no gens habitual per a l'espècie (CAC).

Merla

Turdus merula

Estatus: present tot l'any, abundant.

Tord comú

Turdus philomelos

Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.

Tord alarroig

Turdus iliacus

Estatus: migrador i hivernant molt escàs i irregular.

Un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 21.II (CAC).

Griva

Turdus viscivorus

Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.

Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, amb màxims de 24 exemplars a un mateix camp, el 4.I i 31 exemplars el 21.II (CAC)*.

Un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro, el 25.X (CAC).

Dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 25.XII (CAC)



Rossinyol bord

Cettia cetti

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Trist

Cisticola juncidis

Estatus: present tot l'any, en nombre més aviat escàs i localitzat.

Boscarla de canyar

Acrocephalus scirpaceus

Estatus: migrador relativament abundant.

Primera observació prenupcial al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.V; malgrat que el 6.VI, encara se sent cantar al mateix balcar, no sembla que hi hagi criat (CAC).

El 7.IX, almenys un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles (CAC).

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

Primera observació prenupcial al costat de can Provencal, a Santa Cristina d'Aro, el 17.V (CAC)*.



Tallarol de casquet _____

Sylvia atricapilla

Estatus: present tot l'any, abundant.

Tallarol gros _____

Sylvia borin

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

Tallareta vulgar _____

Sylvia communis

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

Tallareta cuallarga _____

Sylvia undata

Estatus: present tot l'any, en nombre molt escàs i localitzat.

Un exemplar cantant prop de l'abocador de Solius, el 13.III (ACH).

Un exemplar prop de l'abocador de Solius, el 13.IV (ACH, PFL).

El 26.V, quatre exemplars territorials entre la Divina Pastora i Sant Benet (JBL).

Tallarol de garriga _____

Sylvia cantillans

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

Tallarol capnegre _____

Sylvia melanocephala

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mosquiter pàl·lid _____

Phylloscopus bonelli

Estatus: migrador i nidificant escàs.

Mosquiter comú _____

Phylloscopus collybita

Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n'ha comprovat la cria, encara que no es descarta.

Mosquiter de passa _____

Phylloscopus trochilus

Estatus: migrador regular.

El 6.IX, almenys un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles (CAC).

Reietó _____

Regulus regulus

Estatus: migrador i hivernant escàs.

Un exemplar al parc de les Dunes de Sant Pol, el 2.I (CAC):

Dos exemplars al bicarri, a l'alçada del puig de la Gramoia, a Castell d'Aro, el 2.I (CAC).

Bruel _____

Regulus ignicapilla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Papamosques gris _____

Muscicapa striata

Estatus: migrador regular, se n'ha comprovat la cria.

Un exemplar, probablement reproductor, a la zona de la Casa Nova – Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols, el 9.VI. (JBL).

Mategatxes _____

Ficedula hypoleuca

Estatus: migrador regular.

Un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 9.IV; primera observació prenupcial (CAC)*.

Els dies 6.IX i 19.IX, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).



Mallerenga cuallarga _____

Aegithalos caudatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant tot i que, darrerament, s'ha notat una certa disminució dels seus efectius.

Mallerenga blava _____

Cyanistes caeruleus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga carbonera _____

Parus major

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga emplomallada _____

Lophophanes cristatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mallerenga petita _____

Periparus ater

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més abundant a l'hivern.

Raspinell comú _____

Certhia brachydactyla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Oriol _____

Oriolus oriolus

Estatus: migrador i estival en declivi.

Capsigrany

Lanius senator

Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant a migrador escàs, encara que regular.

El 25.V, dos exemplars entre can Tirans i el mas Ros, a Castell d'Aro (JBL).

Gaig

Garrulus glandarius

Estatus: present tot l'any, abundant.

Garsa

Pica pica

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cornella negra

Corvus corone

Estatus: divagant escàs.

A l'abocador de Solius, un exemplar l'11.I (CAC).

Dos exemplars al Montclar, el 28.I (JBL).

Un exemplar en vol cap a l'est sobre can Provensal, a Santa Cristina d'Aro, el 9.IV (CAC).

Dos exemplars al pla de Santa Cristina d'Aro, el 27.IV (JBL).

Quatre exemplars entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Corb

Corvus corax

Estatus: present tot l'any, en molt petit nombre.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, lloc insòlit per a aquesta espècie, s'observa un exemplar del 24 al 26.VII (CAC)*.

Dos exemplars sobre el mateix indret, l'II.X (CAC).



Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

Estatus: present tot l'any, abundant, molt especialment a l'hivern.

Estornell negre _____

Sturnus unicolor

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Diversos exemplars a S'Agaró, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, a can Provencal de Santa Cristina d'Aro i a l'abocador de Solius (CAC)*.



Pardal comú _____

Passer domesticus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Pardal xarrec _____

Passer montanus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pinsà comú _____

Fringilla coelebs

Estatus: present tot l'any, abundant a l'hivern i nidificant escàs.

El 17.X s'observa els primers exemplars, després de l'estació reproductora, a l'abocador de Solius (CAC).

Pinsà mec _____

Fringilla montifringilla

Estatus: divagant hivernal molt rar.

Un exemplar al pla de Solius, el 28.I; tercera citació d'aquesta espècie a la vall (JBL).

Gafarró _____

Serinus serinus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Verdum _____

Carduelis chloris

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cadenera _____

Carduelis carduelis

Estatus: present tot l'any, abundant.

Lluer _____

Carduelis spinus

Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant.

Passerell comú _____

Carduelis cannabina

Estatus: present tot l'any, escàs.

Gratapalles _____

Emberiza cirlus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Repicatalons _____

Emberiza schoeniclus

Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la desaparició de les taques de canyissar de la vall.

El 7.XI, es constata una ja bona quantitat d'exemplars, al tram final del Ridaura i als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

Cruixidell _____

Emberiza calandra


Estatus: migrant i nidificant, escàs.

ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia

Alopochen aegyptiaca

Dos exemplars apareixen als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, de l'11.I al 25.I (CAC)*. Aquests ocells probablement s'havien escapat, junt amb una desena més, d'una casa de Santa Cristina d'Aro (JRG).



Ànec carolí x Ànec collverd

Aix sponsa x Anas platyrhynchos

Un mascle i una femella als estany de les Escoles primer, i a la desembocadura del Ridaura després, el 6.VI. Anaven associats a una femella d'ànec collverd (*Anas platyrhynchos*) que podria ser la mare (CAC)*.



Tórtora domèstica

Streptopelia roseogrisea var. *risoria*

Un exemplar i un altre, possible híbrid amb tórtora turca (*Streptopelia decaocto*), a can Juanals de Castell d'Aro, el 1.I (CAC)*.

Un exemplar al costat de la Colomina, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 21.II (CAC).

Dos exemplars al costat de la Colomina, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 7.XII i 9.XII (CAC).



Periquito

Melopsittacus undulatus var. domestica

Un exemplar verd i groc als camps de prop del Remei, a Castell d'Aro, la darrera desena de setembre (JRG).

Cotorra de Kramer

Pittacula krameri

Estatut: relativament habitual a la vall, no s'ha arribat a confirmar-ne la cria, malgrat els indicis.

Dos exemplars a Sant Pol, els dies 2.I i 7.XII (CAC).

Agapornis capnegre

Agapornis personatus

Nova espècie a la vall.

El 8.VIII, un exemplar és capturat a Castell d'Aro (JRG)*.



Canari

Serinus canarius var. domestica

A primers agost, un exemplar de coloració groga a Platja d'Aro (JRG).

Bec de corall senegalès

Estrilda astrild

Dos exemplars als horts de Castell d'Aro, el 29.VIII (JBL).

Almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 10.X al 12.X (CAC)*.



TAULA D'OBSERVADORS

CODI OBSERVADOR

ACH Aleix Comas Herrera
 AMP Àlex Massana Pernias
 CAC Carlos Alvarez Cros
 CJL Carlos Javier López
 CMC Clàudia Mompó Cros
 DBV David Bañeras Vives
 DVS Dani Valverde Saubí
 JBC Joan Bohigas Cayuel
 JBP Josep Barbarà Puig
 JBL Josep Ma Bas Lay
 JGM Joan Grajera Melo
 JHC Joan Hontangas Canela
 JRG Jaume Ramot García
 JO Jaume Oliveras

CODI OBSERVADOR

HAP Hèctor Andino Pol
 LDL Lluís Donat Lorenzo
 LHM Lluís Hugas Mulà
 LZH Lluís Zamora Hernández
 MCD Mireia Codina Diago
 MM Martí Masvidal
 MF Martí Fernández
 MPX Miquel Pros
 PFL Ponç Feliu Latorre
 RCA Raül Calderon Alvarez
 RGB Ricard Guriérrez Benítez
 RSA Redacció setmanari Àncora
 TSB Toni Sanllehí Bitria
 VGK Vito García Kosildo

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Alvarez, C. 1999. Els ocells de la vall del Ridaura. Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Alvarez, C. (ed.). 2005-2010. Actualització del catàleg dels ocells de la vall del Ridaura: www.ocellsvallridaura.comxa.com

Alvarez-Cros, C. (coord.). 2010. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 1999 - 2008. Àncora, Suplement del núm.: 3.143. Associació Cultural Bitàcola, Sant Feliu de Guíxols. Versió digital:
www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_1999_2008.pdf

Alvarez, C., Burgas, A., Capalleras, E., Feliu, P., Ollé, A. 2008. Llista Patró dels ocells de l'Empordà. Gener de 2008. Comitè Avifaunístic Empordanès. Versió "on line":
http://www.comiteempordanes.org/Llista/LLISTA_PATRO_Gener_2008.pdf

CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya). 2008. Taxons sotmesos a homologació (Última modificació 29/10/08). <http://www.ornitologia.org/monitoratge/cac5.htm>

Clavell, J., Copete, J. L., Bigas, D., Sales, S., Arcos, J. M., Lopez, F. & Clarabuch, O. 2006. Llista patró dels ocells de Catalunya. Edició 2.0, octubre de 2006. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO. Versió "on line":
http://www.ornitologia.org/monitoratge/llista_ocells_catalunya.pdf

De Juana, E. & Comité de Rarezas de la S.E.O. 2007. Observaciones de aves raras en España. Año 2005 Ardeola 54 (2). Madrid, SEO.

Dies J. I., García, E., Gorospe, G., Gutiérrez, R., Lorenzo, J. A., Martí-Aledo, J., Gutiérrez, P., Vidal, C. 2008. Lista de Rarezas de España. Taxones de aves sometidos a homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. Madrid, SEO/BirdLife. Versió "on line": http://www.seo.org/media/docs/lista_rarezas_2006.pdf

Dies, J. I. & Comité Ibérico de Rarezas de la S.E.O. 2008. Observaciones homologadas de aves raras en España 2006. Ardeola 55 (2). Madrid, SEO.

Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 2008. Hipermapa. Ates electrònic de Catalunya.
<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp>

Gutiérrez, R. (ed.). 2009. Rare Birds in Spain. Febrer 2009.
<http://www.rarebirdspain.net/arbsr902.htm>

ICO (Institut Català d'Ornitologia). 2009. www.ornitho.cat

Sangster, G., Collinson, J.M., Helbig, A.J., Knox, A.G., & Parkin, D.T. 2005. Taxonomic recommendations for British birds: Third report. *Ibis* 147: 821-826.
<http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118644713/PDFSTART>

Sangster, G., Collinson, J.M., Knox, A.G., Parkin, D.T. & Svensson, L. 2007. Taxonomic recommendations for British birds: Fourth report. *Ibis* 149: 853-857.
<http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118531152/PDFSTART>