

**ANUARI ORNITOLÒGIC DE
LA VALL DEL RIDAURA
(COSTA BRAVA)
2010**



ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2010

Carlos Alvarez-Cros (ed.)
[\(\[vallridaura@yahoo.es\]\(mailto:vallridaura@yahoo.es\)\)](mailto:vallridaura@yahoo.es)

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2010

Coordinació i selecció de dades
Carlos Alvarez-Cros

Revisió de textos
Josep Ma Bas Lay
Jaume Ramot García

Citació bibliogràfica recomanada.

Obra completa: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2011. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2010.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2010.pdf

Espècie concreta, exemple: Ramot, J. 2011. Morell cap-roig (*Aythya ferina*) in: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2011. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2010. www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2010.pdf

Foto portada: Gavià caspi (*Larus cachinnans*), a l'abocador de Solius el 14/03/2010, anellat essent un poll, el 21/05/09, a Jankowice (Polònia). (C. Alvarez-Cros)

INTRODUCCIÓ

Aquest és el tercer dels anuaris de la vall del Ridaura. Com els precedents, neix amb la voluntat de deixar constància de la realitat ornitològica actual de la vall, tot recollint aquelles observacions més destacades que s'hi han produït.

RESUM DE L'ANY

Pel que fa a les particularitats d'aquest any 2010, es passa a enumerar, cronològicament, les més significatives.

A primers de gener, es tornà a formar el dormidor d'esplugabous (*Bubulcus ibis*) a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro, amb un màxim de 34 exemplars, el 27.II. Aquest dormidor no s'havia tornat a formar des que el gener de 2006 els esplugabous el deixessin (Alvarez-Cros, 2010a). L'abandó va ser provocat per l'assecament de la bassa. Assecament causat pels desperfectes que els greus aiguats de la tardor del 2005 provocaren al tractament terciari de l'EDAR, que és el que alimenta la bassa.

A primers de març, els forts temporals afectaren molt negativament la cria d'ocells marins primerencs, com el corb marí emplomallat (*Phalacrocorax aristotelis*) (Generalitat de Catalunya. DMAH, 2010).



La segona setmana de març caigué una important nevada acompanyada de forts vents, que causà una enorme destrossa al medi natural, amb gran quantitat de branques esberlades i arbres caiguts arreu de la vall i de tota la província de Girona que, com s'observa a la imatge inferior, presa al desembre, mesos després encara era ben evident.



Probablement aquest episodi hagi contribuït al fracàs generalitzat de la cria de duc (*Bubo bubo*) i gamarús (*Strix aluco*). En tot cas, aquesta i altres precipitacions, feren que les zones humides de la vall tinguessin un començament d'any amb bons nivells d'aigua, la qual cosa possibilità la hivernada d'ocells aquàtics i afavorí la presència d'ocells migradors lligats a aquesta mena d'ambients. Així, als estanys de Platja d'Aro s'observà, per segona vegada a la vall, un rascletó (*Porzana parva*), un pòlit cantaire (*Numenius phaeopus*) i un fumarell carablanc (*Chlidonias hybrida*). A la desembocadura del Ridaura es detectà,

també per segona vegada a la vall, un batallaire (*Philomachus pugnax*) i per tercera i quarta vegada un boscaler pintat gros (*Locustella naevia*). Com a notes destacades d'observacions costaneres a la desembocadura del Ridaura, s'ha d'esmentar la primera citació a la vall de territ tresdits (*Calidris alba*) i la quarta de corriol camanegre (*Charadrius alexandrinus*).

Més endavant, les intenses i continuades pluges i les baixes temperatures de finals d'abril i començament de maig afectaren de manera important els ocells insectívors d'alimentació aèria, com orenetes i falciots. Es constatà una certa mortalitat d'adults d'oreneta vulgar (*Hirundo rustica*) a diverses cases de pagès de la vall. Igualment, la revinguda del Ridaura malbaratà l'establiment a la seva llera de diverses parelles de corriol petit (*Charadrius dubius*), que no sembla que hagi criat aquest any a la vall.

S'ha de destacar que la maduració dels nous ambients aquàtics i els bons nivells d'aigua, han permès la nidificació d'almenys tres parelles de fotja vulgar (*Fulica atra*) als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Fins enguany aquesta espècie era molt escassa en pas i ocasional com a hivernant a la vall. Una altra espècie que probablement ha niat a la vall, al balcar de la llera del Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, és la boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*). La darrera parella d'aquesta espècie que va criar a la vall ho havia fet al desaparegut canyissar de S'Agaró el 1999.

A l'estiu varen continuar les agressions urbanístiques al medi natural, especialment delicades pel que fa a l'afectació de zones de nidificació i de campeig de duc (*Bubo bubo*). Un exemple d'això serien les obres portades a terme a un indret de fortes pendents, a la zona del Mas Semi, a Castell d'Aro.



Aquest any no s'ha produït cap irrupció de cigonyes blanques en el pas de tardor, la qual cosa corrobora l'excepcionalitat de l'esdeveniment de l'any passat. En canvi, una curta però intensa tempesta nocturna del 7.IX, ens portà, l'endemà, limícoles poc habituals als estanys de les Escoles, com un territ bec llarg (*Calidris ferruginea*), dos territs menuts (*Calidris minuta*) i un territ de Temminck (*Calidris temminckii*), primera vegada que se cita aquesta espècie a la vall.

A finals de setembre, començament d'octubre, es formà un dormidor d'esplugabous (*Bubulcus ibis*) als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Probablement es tracti del de la desembocadura de la riera de Calonge, que aquest any no s'ha pogut formar degut a les obres de canalització que s'hi estan portant a terme.

L'episodi de pluges i vents de llevant i gregal que va durar del vespre del 9.X a la matinada 13.X portaren xifres rècords d'ardeids, en concret de martinets blancs (*Egretta garzetta*) i bernats pescaires (*Ardea cinerea*), sedimentats als estanys de les

Escoles de Platja d'Aro. A partir de mitjans del mes d'octubre s'observa un increment progressiu del nombre de fotges (*Fulica atra*) als estanys de les Escoles que, a final d'any, s'estabilitza en uns 35 exemplars hivernants, xifra inimaginable a la vall abans de la creació d'aquest espai. Encara que en nombre més reduït, també hiverna un grup de xarxets (*Anas crecca*) i alguns ànecs cullerots (*Anas clypeata*).

Coincidint amb els freds de principis de desembre s'observà dues noves espècies a la vall: la merla de pit blanc (*Turdus torquatus*) i el gavinet (*Larus marinus*). També es detectà, després de deu anys, bec de serra mitjà (*Mergus serrator*).

De mitjans a finals de desembre, la bassa del Dofí quasi s'arriba a secar totalment en no rebre aigua del tractament terciari de l'estació depuradora d'aigües residuals de Castell d'Aro.

A finals d'any s'ha instal·lat una desena de caixes niu per a gamarús (*Strix aluco*) al massís de l'Ardenya. Aquesta operació ha estat portada a terme per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el Grup de Natura Sterna, amb el finançament del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL

A aquest document, per vall del Ridaura, s'entén l'àrea (uns 130 km²) compresa pels termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro (amb la franja oriental del terme de Llagostera) i la part de mar prospectable des de la costa (Fig. 1).

Tal com figura al títol, l'espai temporal abraça l'any 2010.



Fig. 1. Límits, en verd, de la vall del Ridaura (Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2008)

ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI

Per a comunicar les dades es recomana l'ús del portal web Ornitho.cat (www.ornitho.cat) ja que, a més, podran servir, entre altres coses, per l'anuari català. En tot cas, també es poden enviar directament a l'editor, a l'adreça de correu electrònic: vallridaura@yahoo.es

Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:

- Geogràfic: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de les que es té poca informació.
- Fenològic: dates de presència a la zona, tant extremes, com poc habituals.
- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona.
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona.
- Etològic: comportaments d'interès o poc habituals.
- Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

AGRAÏMENTS

Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l'aportació d'observacions i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible.

METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES

La gran majoria de les dades provenen de comunicacions personals, fruit d'una activitat d'observació ornitològica regular i constant, encara que no professionalitzada. L'altra font, correspon a l'obtenció d'observacions durant les sessions de treball de diferents projectes que s'han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.

- Anellament científic d'ocells i control d'ocells anellats.

Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. En tot cas, es varen marcar alguns ocells recuperats i alguns polls. Cal remarcar que, per primera vegada a la vall, s'anellà una becada (*Scolopax rusticola*), un esparver vulgar (*Accipiter nisus*), i xoriguer comú (*Falco tinnunculus*), en concret, els cinc polls d'una parella establerta a una caixa niu situada al castell de Castell d'Aro.

D'altra banda, es va continuar amb la labor sistemàtica de lectura d'anelles a distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat (*Larus michahellis*). Com a notes excepcionals d'aquest any, s'ha d'esmentar el segon control a la vall (i a Catalunya) de gavià argentat cantàbric (*Larus michahellis "lusitanus"*). Curiosament, el mateix dia que s'observà aquest ocell, també es controlava un gavià caspi (*Larus cachinnans*) anellat a Polònia.

- Projectes coordinats per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO).

Durant el 2009, diverses persones han continuat amb els recorreguts pel Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC).

- Censos.

Com cada gener, s'ha participat en la realització del cens anual internacional d'aus aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- Altres.

A l'igual que altres anys, la recerca d'ocells marins des de la costa, ha estat més aviat irregular i escassa.



d'elles va ser vista a l'abocador de Pedret i Marzà pocs dies després i, més tard, a Banyoles.

Dins el marc d'un projecte més ampli, s'ha continuat el control d'algunes caixes niu destinades al gaig blau (*Coracias garrulus*), col·locades l'any anterior. No es té evidència de nidificació d'aquesta espècie i les caixes han estat ocupades per mallerengues i estornells (veure imatge).

Aquest any, dues cigonyes blanques (*Ciconia ciconia*) marcades, procedents d'un projecte de reintroducció a Gallecs, Mollet del Vallès, passaren l'hivern als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Davant d'aquest fet, alguns membres del Grup de Natura Sterna varen construir un niu artificial, que instal·laren, el 12.I, a un arbre dels estanys (veure imatge) per tal d'estimular la cria d'aquesta espècie. La iniciativa no va reeixir, ja que les cigonyes abandonaren la vall, a mitjans de febrer. Una



Per fi, comentar que s'ha continuat amb la recerca de rapinyaires nocturns, la qual cosa ha permès constatar que l'èxit reproductor del duc (*Bubo bubo*) i del gamarús (*Strix aluco*) ha estat molt escàs. Les possibles causes han estat les molèsties provocades pels escaladors, les agressions urbanístiques i la nevada del mes de març.



ESTRUCTURA

Les espècies d'aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2010 es relacionen en dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a casa nostra. A la segona es llisten les espècies exòtiques i/o escapades de captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s'ha inclòs espècies que, malgrat ser exòtiques com el faisà (*Phasianus colchicus*) o la cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*), mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d'algunes més o menys properes.

També s'inclou les observacions d'ocells fruit de creuaments interespecífics i les observacions de gavians de les que no s'ha arribat a aclarir la identificació específica.

Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies. L'ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions de l'AERC-TAC (Crochet i altres, 2010).

A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la *Llista patró dels ocells de Catalunya* (Clavell i altres, 2006). Immediatament sota seu, el nom científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d'un taxó de nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l'àrea d'estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dona la següent informació: nombre, edat i sexe dels exemplars, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de l'observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d'una citació a una altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l'observació. Quan es tracta de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d'on s'ha extret la informació. Les citacions d'espècies sotmeses a homologació per part del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (Alvarez i altres, 2008), el CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya) (CAC, 2008) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología) (Dies i altres, 2008), que encara no hagin estat homologades, figuren en lletra de color gris i duen una nota explicativa d'aquest fet. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota on, si se sap, es detalla el número de l'homologació.

De la majoria d'espècies comuns a la vall, sense canvis significatius d'estatus o observacions destacables, no s'inclou les citacions.

Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s'han pres a la vall durant el 2010 i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un asterisc: *.

Per fi, s'inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades.

LLISTAT GENERAL

Ànec blanc

Tadorna tadorna

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

L'exemplar detectat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 25.XII (Alvarez-Cros, 2010b), encara s'hi observa el 16.I (CAC).

Cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 7.XII; l'endemà encara en reten dos (CAC, JRG)*.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 26.XII (JRG).



Ànec xiulador

Anas penelope

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

El mascle detectat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 19.XII (Alvarez-Cros, 2010b), s'observa fins el 20.II (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle del 10.X al 15.X; el 15.X, dos (DVS, MCD, DVB, JRG, CAC)*.



Xarxet comú

Anas crecca

Estatus: hivernant i migrant escàs però regular.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro continua les observacions dels exemplars hivernants fins el 14.III, amb un màxim de 14 el 30.I (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 15.VIII; primera observació postnupcial (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar del 28.VIII al 4.IX.10 (aquest dia, dos) (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars del 10.X a final d'any, amb màxim de 9 exemplars del 2.XII al 8.XII (CAC).

Al tram final del Ridaura, dos exemplars els dies 6.XI i 7.XI (CAC).

Tres mascles al mar, front la desembocadura del Ridaura, el 4.XII (CAC).

Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Estatus: resident i nidificant relativament comú.

Una femella amb vuit petits al tram final del Ridaura, el 10.IV; primers pollets de la temporada de cria (CAC).

Ànec cuallarg

Anas acuta

Estatus: migrant esporàdic.

Un exemplar als estanys de les Escoles, del 4.IX al 19.IX; sisena citació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*

Un exemplar als estanys de les Escoles, del 9.X al 15.X (CAC).



Ànec cullerot

Anas clypeata

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle el 24.IV (CAC); presència del 8.IX a final d'any, amb màxim de quatre exemplars del 8.IX al 28.XI (CAC, JRG, RMT)*.



Morell cap-roig

Aythya ferina

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

Un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 7.VI; cinquena citació a la vall (JRG)*.



Bec de serra mitjà

Mergus serrator

Estatus: divagant hivernant molt escàs i irregular.

Tres exemplars tipus femella front el camí de ronda de S'Agaró a la Conca, l'11.XII (MFR). Quarta citació a la vall; no s'havia detectat des del desembre de 2000 (Alvarez-Cros, 2010a)..

Perdiu roja

Alectoris rufa

Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l'àrea d'estudi.

Un exemplar creua volant la variant de Santa Cristina d'Aro, el 15.V (CAC).

Als horts de Castell d'Aro, l'11.VII, una lloca amb, almenys, tres polls (CAC)*.

Un exemplar a Bufaganyes el 13.XI (CAC).

Un exemplar al pla de Solius el 12.XII (JRG).



Guatlla

Coturnix coturnix

Estatus: migrant molt escassa i irregular.

Almenys un exemplar cantant prop de can Barella, a Panedes, el 9.V (CAC).

Alguns exemplars canten prop del Remei, a Castell d'Aro, el 18.V (JRG).

El 13.VI, almenys dos exemplars al pla de Panedes, Llagostera (JRG).

Un exemplar a la punta de Garbí, el 10.X, dia de vent de llevant (DVS, MCD, DVB).

Faisà

Phasianus colchicus

Estatus: resident escàs. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors.

Aquest any, almenys s'ha reproduït als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.VIII, almenys catorze exemplars (CAC)*; el 5.IX un mínim de disset. , xifra rècord a la vall (AMP).



Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Estatus: resident i nidificant escàs. Un increment de la prospecció ha aportat noves observacions de cria. Regular com hivernant i en migració.

Aquest any ha criat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, als estanys del golf de Mas Nou i a les basses de la costa de l'Alou i de can Perrera, a Panedes, Llagostera.(CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, encara hi ha adults covant el 18.VII (CAC)*.

Cabussó emplomallat

Podiceps cristatus

Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.

Un exemplar front la desembocadura del Ridaura, el 27.XI (CAC)*.



Baldriga cendrosa

Calonectris diomedea

Estatus: migrant regular, escassa a l'estiu.

El 30.V, front la punta de Garbí, no menys de cinc exemplars barrejats en un estol mixt d'uns 1500 exemplars de baldrigues mediterrànies-balears (*Puffinus yelkouan* / *mauretanicus*) (CAC).

El 20.VI, a punta de dia, front la punta de Garbí i front la desembocadura del Ridaura, diversos exemplars costa avall (CAC); als mateixos llocs i mateixa hora, el 3.VII, diversos exemplars costa amunt (CAC).

L'11.VIII, un exemplar front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols (DVS).

Baldriga mediterrània

Puffinus yelkouan

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; escassa a l'estiu.

El 30.V, uns 1500 exemplars s'alimenten front la punta de Garbí. Barrejades, s'observa baldrigues balears (*Puffinus mauretanicus*) (CAC).

L'11.VIII, tres exemplars front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols (DVS).

Baldriga balear

Puffinus mauretanicus

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern.

De vegades, sobre tot a l'hivern, se'n pot observar estols mixtes amb l'espècie següent, molt nombrosos.

El 30.V, front la punta de Garbí, diversos exemplars barrejats en un estol d'uns 1.500 exemplars de baldriga mediterrània (*Puffinus yelkouan*) (CAC).

Mascarell

Morus bassanus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escàs a l'estiu, estació durant la qual només s'observa exemplars immadurs.

El 30.V, front la punta de Garbí, un exemplar immadur (CAC).

El 20.VI, un exemplar immadur front la desembocadura del Ridaura (CAC).

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Estatus: abundant durant l'hivern i els passos migratoris.

El 10.IV, darrers exemplars als estanys de les Escoles (CAC).

El 9.IX, un exemplar en vol sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial (CAC).

El mateix exemplar, marcat com a poll a Dinamarca al 2001 amb anella de plàstic llegible a distància (T4J) (Alvarez-Cros, 2010), és detectat per cinquè any consecutiu, al S'Adolix, el 25.XII (CAC)*.



Corb marí emplomallat

Phalacrocorax aristotelis

Estatus: resident, relativament abundant durant tot l'any.

Aquest any no s'ha ocupat el niu de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Martinet menut

Ixobrychus minutus

Estatus: migrant molt escàs i irregular, present, sobre tot, durant el pas prenupcial.

Un mascle al bogar del tram final del Ridaura, del 22.V al 6.VI (CAC, JBL, JRG). El 30.V, mentre un mascle reclamava, un altre exemplar el contestava (CAC)*.

El 27.VI una femella al Ridaura a l'alçada dels estanys de les Escoles, volant en direcció a la desembocadura (CAC).



Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Estatus: escàs però regular durant els passos migratoris, sobre tot durant el prenupcial.

Un exemplar adult a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 26.V (JRG)*.

Un exemplar adult i un immadur a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, del 25.VII a l'1.VIII (CAC).



Martinet ros

Ardeola ralloides

Estatus: escàs però regular durant els passos migratoris sobre tot durant el prenupcial.

Al tram final del Ridaura, un adult el 25.IV i un immadur des de l'1.V al 9.V i un altre adult el 16.V (CAC).

A la desembocadura del Ridaura, un exemplar des del 16.VIII al 9.IX (CAC)*



Esplugabous

Bubulcus ibis

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les condicions de determinats indrets.



a del Dofí de Castell d'Aro. Es detecta 21 i 34 exemplars, el 27.II; el 24.IV encara n'hi

Cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 24.IV; darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar a l'abocador de Solius, el 24.VI; primera observació postnupcial a l'abocador (CAC); el 31.VII dos exemplars al mateix lloc. A partir del novembre s'hi regularitza la seva presència amb un màxim de 35 exemplars el 26.XII (CAC).

Es forma un dormidor als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. El 19.IX hi havia quatre exemplars, el 25.IX ja n'hi havia 25 i el 9.X, uns 250. Aquest any, el dormidor de la desembocadura de la riera de Calonge

no s'ha pogut formar degut a les obres de canalització i sembla que s'ha traslladat als estanys. (CAC)*.

Els dies 7.XII i 12.XII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, ANA); el 26.XII, cinc (JRG)..

Setze exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 12.XII (CAC).



Martinet blanc

Egretta garzetta

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular.

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 6.I (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, tres exemplars el 10.IV, nou el 17.IV, i dos el 18.IV i 10 el 24.IV (CAC).

A la desembocadura del Ridaura, un exemplar de l'11.IV al 16.V (darrera observació prenupcial) i dos el 18.IV (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 17.VI; primera observació postnupcial (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.VII (CAC).

Del 8.VIII al 31.X diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb uns màxims de quaranta el 8.X (JRG, CAC), i uns cent cinquanta el 10.X (RMT); xifres rècord a la vall.

Del 10.VIII al 28.XI diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de nou el 9.X (CAC).

El 12.X, quatre exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, amb direcció nord! (CAC).

El 14.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC)

Del 22.X a final d'any, diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, amb màxim de sis exemplars els dies 6.XII i 12.XII (CAC)*.

Del 14.XI al 8.XII diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars el 8.XII (CAC).

Del 2.XII al 17.XII diversos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un màxim de tres exemplars el 4.XII (CAC, ANA, RMT)



Agró blanc

Egretta alba

Estatus: espècie en expansió, probablement ja es tracti d'un migrant regular, encara que molt escàs.

El 26.IX, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, JRG)*; el 3.X encara n'hi ha un.

El 10.X, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 12.X encara n'hi havia un i el 13.X n'hi dormien tres. (CAC, JRG. JBL, RMT)*.



Bernat pescaire

Ardea cinerea

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular.

Els dies 2.I i 9.I, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 6.I (CAC).

Un exemplar a l'abocador de Solius, el 10.I (CAC)*.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars de l'1.I a l'17.IV amb un màxim de 4 el 2.I (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 9.V; darrera observació prenupcial (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars el 18.VII; primera observació postnupcial (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars de l'1.VIII al 9.XII (CAC), amb un màxim de trenta, el 10.X (RMT).

Els dies 11.X i 23.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 14.X, tres (CAC).

El 12.X, un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, amb direcció nord! (CAC).

Del 28.XI a final d'any, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 4.XII i 12.XII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 7.XII, 25.XII i 26.XII, dos (CAC, ANA).



Agró roig

Ardea purpurea

Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas prenupcial.

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 10.IV (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 17.IV, un altre el 2.V i un altre el 12.VI (CAC)*.



Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Estatus: migrador escàs i regular.

Els dos exemplars anellats a Gallecs, Mollet del Vallès, arribats l'estiu passat (Alvarez-Cros, 2010b), van romandre als estanys de Platja d'Aro, almenys, fins el 14.II (CAC). Els dies 30.I, 7.II i 13.II s'observen a l'abocador de Solius i el personal comenta que feia temps que els observaven (CAC)*.

Un exemplar aturat a un dels focus del camp de futbol de Castell d'Aro del 4.X (JBL) al 5.X (JRG); un altre exemplar al mateix lloc el 27.X (JBL).



Milà negre

Milvus migrans

Estatus: migrant abundant que, en determinats moments, pot presentar elevades concentracions. No s'ha arribat a comprovar-ne la nidificació, però sí la presència d'exemplars no reproductors durant el període de cria, a l'abocador de Solius.

Almenys un exemplar a l'abocador de Solius, el 13.III; primera observació prenupcial. (CAC)*.

El 25.IV, no menys de 20 exemplars a l'abocador de Solius (CAC).

A la cala Ametller, el 30.V, a les dues de la tarda, dos exemplars provinents



del sud-est. Dues hores més tard, quatre exemplars amb el mateix rumb i des de la mateixa direcció (AMP).

Durant l'estació reproductora, a l'abocador de Solius, s'observa un màxim de 28 exemplars a Solius, el 13.VI (CAC).

A l'abocador des Solius, els dos primers joves de l'any, el 24.VII (CAC).

A l'abocador des Solius, un exemplar en migració, el 25.IX (AMP).

Voltor comú

Gyps fulvus

Estatus: migrant i divagant hivernant molt escàs i irregular.

Un exemplar a l'abocador de Solius, del 6.I al 24.I (PAS)*.



Àguila marcenca

Circaetus gallicus

Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Malgrat les sospites i les observacions en època reproductora, no s'ha arribat a confirmar la cria a la vall.

Un exemplar, sobrevola l'abocador de Solius, el 17.IV; primera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar, el Tennis d'Aro, el 4.VII (AMP).

Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Estatus: migrant regular.

Una femella sobrevolant els estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 27.III (JRG).

Una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 30.IX al 2.X (RMT, CAC); els dies 18.X i 24.X es torna a veure la mateixa o una altra (CAC, MAC, JRG).

Astor

Accipiter gentilis

Estatus: Malgrat el seu caràcter sedentari, no s'ha arribat a constatar la cria a la vall i la majoria de les observacions es concentren a la tardor i a l'hivern..

El 5.IX, un exemplar jove sobre les Planes, sota al Mas Nou, a Platja d'Aro (AMP).

Els dies 10.X i 7.XII, un adult, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC)*.



Esparver vulgar

Accipiter nisus

Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

Un exemplar a prop de can Barella, Panedes, a Llagostera, el 9.I (CAC).

Un exemplar a can Tirans, a Catell-Platja d'Aro, el 14.II (AMP).

Un exemplar empaita sense èxit una tórtora turca al tram final del Ridaura, el 10.IV (CAC).

Un exemplar al pla de Panedes, a Llagostera, el 13.VI (JRG).

El 26.IX, un exemplar encalça un estol d'estornells vulgars (*Sturnus vulgaris*) a Castell d'Aro (AMP)

Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 5.X (JRG).

El 12.X, almenys 15 exemplars en pas sobre Pinell, a Platja d'Aro. (AMP).

El 22.X es captura i torna a alliberar un jove als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JB, JRG)*.

El 13.XI es troba una femella adulta morta després de col·lidir amb les vidrieres d'un edifici de Castell d'Aro (JRG).

El 8.XII una femella adulta a la desembocadura del Ridaura; un exemplar al mateix lloc el 19.XII (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 12.XII (ANA).

Un exemplar al pla de Sant Pol, el 26.XII (JRG).



Aligot comú

Buteo buteo

Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.

Malgrat la presència al pla de Panedes i a can Provencal durant l'estació reproductora, no s'ha comprovat la cria a la vall (CAC).

Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant. Només es recullen les dades durant l'època de cria.

Un mascle marcant territori a la punta del Mulà, l'11.IV (AMP).

El 25.IV, una parella a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols; es va observant algun exemplar durant tot el mes de maig (CAC).

El 22.V, cinc polls a una caixa niu del castell de Castell d'Aro; són els primers exemplars d'aquesta espècie anellats a la vall (JRG, JBL).

Falcó mostatxut

Falco subbuteo

Estatus: migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

Un exemplar caçant orenetes al Ridaura, a l'alçada del parc de bombers de Castell d'Aro, el 17.V (JRG).

El 19.IX, un exemplar sobre Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

A l'abocador des Solius, un exemplar en migració, el 25.IX (AMP).

El 12.X, almenys 6 exemplars en pas sobre Pinell, a Platja d'Aro. (AMP).

Falcó de la reina

Falco eleonora

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrador esporàdic.

L'11.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura en direcció als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

Falcó pelegrí

Falco peregrinus

Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.

El 16.I, un exemplar als penyassegats del sud de Sant Feliu de Guíxols (JRG, LHM).

El 8.VIII un exemplar sobrevola l'abocador de Solius (CAC).

A mitjans d'agost un possible exemplar ataca un gos de mida petita a una casa de la punta de Garbí. Amb tota seguretat es tractava d'un ocell emprat en cetreria ja que portava les corretges de control lligades als tarsos. (FCC).

El 26.IX, un exemplar captura una tórtora turca (*Streptopelia decaocto*) al costat de l'institut de Castell d'Aro (AMP).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 10.X (CAC).

Rascló

Rallus aquaticus

Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat.

Un exemplar al Ridaura a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, de l'1.I al 22.II; el 16.I, dos (CAC).

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 6.II (CAC).

Almenys un exemplar al Ridaura a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, des del 2.X (primera observació postnupcial). Diversos exemplars hivernen a aquest indret i a la desembocadura del Ridaura (CAC, JRG)*.

Els dies 15.XII i 17.XII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).



Rascletó

Porzana parva

Estatus: migrador esporàdic.

Una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.IV (CAC)*. Segona citació a la vall, després de la d'un mascle moribund a uns horts de Castell d'Aro, a l'abril de 1994 (Alvarez-Cros, 2010a).



Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Estatus: resident sedentari, relativament abundant.

Primers polls petits als estanys de Platja d'Aro, el 15.V (CAC).

Fotja vulgar

Fulica atra

Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs (fins a aquest any).

L'exemplar detectat a la desembocadura del Ridaura, el 27.XII (Alvarez-Cros, 2010b), s'hi observa fins el 16.I (CAC).

Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 7.III (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 20.III i 21.III (CAC).

Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 24.IV i 25.IV, un d'ells fent niu; primera evidència de cria probable d'aquesta espècie a la vall (CAC).

Diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, des de l'1.V al 27.VI; els dies 15.V, 23.V, 29.V i 30.V, cinc (CAC). Els dies 2.VI i 6.VI sis exemplars (JBL, CAC) i el 17.VI, no menys de vuit (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, des de l'1.V al 9.V (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 29.VI, una parella peixant un poll; primera dada de cria segura d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 25.VII almenys nou adults i cinc polls; xifra rècord a la vall.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 10.VII, una altra parella amb, almenys, dos polls (CAC).



Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 18.VII, una tercera parella amb, almenys, un poll (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 25.VII almenys nou adults i cinc polls; xifra rècord a la vall (CAC).

El 22.X, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mínim de 19 exemplars; nova xifra rècord a la vall (CAC).

El 20.XI, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mínim de 25 exemplars; nova xifra rècord a la vall (CAC).

El 12.XII, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mínim de 32 exemplars; nova xifra rècord a la vall (CAC).

El 18.XII, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mínim de 35 exemplars; nova xifra rècord a la vall (CAC).

Cames llargues

Himantopus himantopus

Estatut: migrador regular.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, cinc exemplars el 3.IV, tres exemplars l'11.IV, dos el 25.IV i tres el 9.V (CAC)*.

El 19.VI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRG).



Corriol petit

Charadrius dubius

Estatut: migrador regular i nidificant molt escàs.

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 17.III; primera observació prenupcial (OBC).

Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, des del 20.III al 21.III; quatre exemplars el 28.III i continues observacions fins el 12.VI (CAC).

A finals d'abril, mínim de 8 exemplars al Ridaura, des de la desembocadura al pont del Remei (JRG).

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 23.V (CAC).

Quatre exemplars al Ridaura, el 6.VI (JRG)*.

L'1.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).



Corriol gros

Charadrius hiaticula

Estatus: migrador irregular, molt escàs.

A la desembocadura del Ridaura un exemplar el 15.V; única observació prenupcial (CAC)*.

A la desembocadura del Ridaura un exemplar el 15.X; única observació postnupcial (CAC).



Corriol camanegre

Charadrius alexandrinus

Estatus: migrador esporàdic.

Un mascle a la desembocadura del Ridaura, el 10.IV; quarta observació a la vall (CAC)*.



Fredeluga

Vanellus vanellus

Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, 3 exemplars el 9.I (CAC).

El 9.I, una dotzena d'exemplars sobrevolen la variant de Santa Cristina d'Aro a l'alçada del golf Costa Brava (CAC).

Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, amb cinquanta exemplars, el 9.I (CAC).

Cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 15.X (JRG).

Cinc exemplars al pla de Santa Cristina d'Aro, el 3.XI (JRG).

Nou exemplars en vol sobre can Provensal de Santa Cristina d'Aro, el 27.XI (CAC).

Quatre exemplars al pla de Santa Cristina d'Aro, el 5.XII (CAC).

Territ tresdits

Calidris alba

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrador esporàdic.

El 24.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.



Territ menut

Calidris minuta

Estatus: ha passat de ser un migrador escàs a molt escàs.

El 7.VIII, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

El 8.IX, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).



Territ de Temminck

Calidris temminckii

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrador esporàdic.

El 8.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC)*.



Territ becclarg

Calidris ferruginea

Estatus: migrador esporàdic.

El 18.VII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la (CAC)*.

El 8.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).



Territ variant

Calidris alpina

Estatus: migrador esporàdic.

El 15.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC, JRG)*.

Del 2.XII al 6.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; dates hivernals molt tardanes per l'espècie (RMT, CAC).



Batallaire

Philomachus pugnax

Estatus: migrador esporàdic.

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, l'11.IV (CAC)*. Segona observació a la vall; la darrera datava dels anys vuitanta (Alvarez, 1999).



Becadell comú

Gallinago gallinago

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 24.X; primera observació postnupcial (JRG).

Becada

Scolopax rusticola

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.

Un exemplar entre Tallades i el Ridaura, el 13.II (JRG).

El 7.III, s'anella i s'allibera un exemplar adult, ja recuperat, trobat el 25.I a prop de Roca Ponça (MG, JRG).

Pòlit cantaire

Numenius phaeopus

Estatus: migrador esporàdic

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 9.VIII i 20.VIII; segona observació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.



Gamba roja pintada

Tringa erythropus

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

Del 3.IX al 12.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; sisena citació d'aquesta espècie a la vall (JRG, CAC)*.



Gamba roja vulgar

Tringa totanus

Estatus: de migrador escàs però regular ha passat a molt escàs i irregular.

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 24.IV (CAC)*.

A la desembocadura del Ridaura, un exemplar els dies 8.V i 9.V (CAC).



Gamba verda

Tringa nebularia

Estatus: migrador irregular.

Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 24.IV (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 28.VIII al 25.IX; del 4.IX al 12.IX, dos (CAC)*; el 19.IX, tres (JRG).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 10.X (CAC, JRG).



Xivita

Tringa ochropus

Estatus: migrador regular.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 27.II i 28.II; probablement el mateix exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 28.II (CAC)*.

A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar a el 26.III i un altre l'1.IV (CAC).

Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 1.IV i 2.IV (CAC).

A la desembocadura del Ridaura, el dos exemplars 4.IV i un el 17.IV (CAC).

Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, l'11.IV (CAC).



Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 18.VII; primera observació postnupcial (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 15.VIII; dos els dies 21.VIII i 22.VIII i un del 3.IX al 9.IX (CAC, JRG).

Valona

Tringa glareola

Estatus: migrador regular.

A la desembocadura dels Ridaura, un exemplar el 10.IV; l'11.IV, dos; tres, el 24.IV i un el 25.IV (CAC)*.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 10.IV (CAC).

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, l'11.IV (ML).



Xivitona

Actitis hypoleucos

Estatus: migrador i hivernant regular, encara que escàs.

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 24.IV i tres els dies 8.V i 9.V (CAC).

Al tram final del Ridaura, un exemplar els dies 24.IV, 8.V i 9.V; cinc el 15.V i quatre el 16.V; darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 10.VII; primera observació postnupcial (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, presència del 31.VII al 12.IX amb un màxim de dos exemplars els dies 16.VIII, 25.VIII, 4.IX i 8.IX (CAC).

El 7.VIII, sis exemplars junts al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

A la desembocadura del Ridaura, un exemplar del 19.VIII al 12.IX (CAC).

A la desembocadura del Ridaura, cinc exemplars el 12.X (CAC).

Paràsit gros

Stercorarius skua

Estatus: poc estudiat, probablement es tracta d'un hivernant i migrador regular, encara que escàs.

Un exemplar, volant costa avall, front la punta d'en Pau, el 6.XII (RMT)*.



Gavina capnegra

Larus melanocephalus

Estatus: migrador i hivernant regular i escàs.

Dos exemplars adults als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 21.II (CAC).

L'11.VIII, dos exemplars front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols (DVS)*.

El 14.X, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro els dies 24.X i 31.X (CAC).

Vuit exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 20.XI (CAC).

El 7.XII, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 25.XII, un exemplar a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).



Gavina vulgar

Larus ridibundus

Estatus: migrador abundant i hivernant regular.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, l'11.IV; darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar adult a la cala del Vigatà, tres a la desembocadura del Ridaura i dos a l'abocador de Solius, el 10.VII; primeres observacions postnupcials (CAC).

Primer exemplar juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 18.VII; un altre o el mateix a l'abocador de Solius (CAC).

Gavina corsa

Larus audouinii

Estatus: migrador regular i escàs.

Dos tercers estius a l'abocador de Solius, el 4.VII (CAC)*.

Un juvenil a l'abocador de Solius, el 21.VIII (CAC).



Gavina cendrosa*Larus canus*

Estatus: migrador i divagant hivernal regular, encara que molt escàs.
A l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern, el 9.I (CAC).

Gavià fosc*Larus fuscus*

Estatus: hivernant i migrador regular i estival en petit nombre.

Observable tot l'any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l'abocador de Solius. Aquest any, els màxims s'han produït als mesos de desembre i octubre. Els mínims, com és habitual, entre la fi del pas prenupcial i la dispersió postnupcial, al maig – juliol. (Fig. 2).




Fig. 2. Comparació del promig mensual del nombre d'exemplars de gavià fosc (*Larus fuscus*) observats per hora, a l'abocador de Solius, durant l'any 2010, front el promig del període 2004 - 2010. (CAC).

El 13.II, a l'abocador de Solius, s'observa un segon plàstic vermell que no s'aconsegueix llegir. (CAC).

Quatre exemplars adults als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 21.II i cinc el 27.II, lloc on no és habitual observar-ne un nombre tant elevat. Durant els mesos de març, abril i desembre alguns exemplars més (CAC).

A les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols, els dies 27.II i 28.II s'observa dos adults, un d'ells marcat amb anella metàl·lica al tars dret (CAC).

El 10.IV, a l'abocador de Solius, un primer hivern amb el bec deformat (CAC)*.





El 4.VII, a l'abocador de Solius, un exemplar amb plomatge d'adult molt fosc i amb un únic mirallet a la punta de la primària més externa (CAC)*.

El 25.VII, a l'abocador de Solius, s'observa un adult molt fosc, amb mirallets blancs a les primàries p10 i p9 i, almenys, la p5 d'ambdues ales mudades; també té mudada alguna secundària més externa tot i que no està en muda activa de plomes de vol. Aquest exemplar, es torna a observar el 31.VII i l'1.VIII (CAC)*. Aquestes característiques suggereixen la possibilitat que es tracti d'ocells de la subespècie nominal.



A l'abocador de Solius, el 7.VIII, s'hi observa un segon any marcat a Burhou, Alderney, Guernsey, petita illa britànica al canal de la Mànega, al tars dret amb anella de plàstic negre amb inscripció blanca 0'N5 i anella metàl·lica al tars esquerre (CAC)*. Tot i que aquest ocell s'havia observat a l'abril a Vilanova i la Geltrú i al juny a Barcelona, aquesta observació és la més oriental d'un ocell d'aquesta procedència.



A l'abocador de Solius, el 12.IX, s'hi observa un primer any marcat a Holanda, a la tíbia esquerra amb anella de plàstic negre amb inscripció blanca 97 i anella metàl·lica al tars esquerre (CAC)*.

Gavià argentat de potes roses

Larus argentatus

Estatus: es tracta d'un migrador i divagant hivernal molt escàs, encara que regular.



A l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern, el 9.I (CAC)*. Citació homologada pel CAC amb el número 389 (CAC, com. pers.).

A l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern, el 31.I (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CAC.

A l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern de la subespècie *L. a. argenteus*, el 6.III (CAC)*. Citació homologada pel CAC amb el número 391 (CAC, com. pers.).



A l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern, els dies 13.III i 14.III (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CAC.



A l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern, el 28.XI (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CAC.

Gavià caspi

Larus cachinnans

Estatus: cas d'homologar-se aquestes observacions es tractaria d'un divagant hivernal i migrador escàs encara que regular. Actualment, a l'estat espanyol, no hi ha cap registre homologat pel CR-SEO d'aquesta espècie ja que n'està revisant els criteris d'identificació (De Juana i altres, 2007, Dies i altres, 2008).

A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer, el 10.I. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.



A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern, el 13.II. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.



A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern, el 14.II. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.



A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern de caràcters barrejats, el 14.II. (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern de caràcters barrejats, el 7.III. (CAC)*.



A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern, el 6.III. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern, els dies 7.III, 13.III i 20.III. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.



A l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern, el 14.III. Un d'aquests exemplars havia estat marcat a Polònia el maig/09, amb anella groga i

inscripció negra (PAEP) al tars dret i anella metàl·lica al tars esquerre. El no anellat es torna a observar al mateix indret el 27.III. Citacions pendents d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.

Gavià argentat

Larus michahellis

Estatus: present durant tot l'any; nidificant abundant.

El 14.III, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià marcat a San Sebastián el juny/09, amb anella vermella i inscripció blanca (215.G) al tars dret i anella metàl·lica al tars esquerre. Aquesta és la segona observació segura d'un ocell d'aquesta raça (*L. m. "lusitanius"*) feta a la vall i a Catalunya (CAC).

El 6.III, a l'abocador de Solius, s'observa la primera còpula de l'any (CAC).

El 20.III, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, s'observa un exemplar leucístic, que podria tractar-se del mateix individu observat l'any passat a l'abocador de Solius el 22.III.2009 (CAC).



L'11.IV, a l'abocador de Solius, s'observa un tercer any calendari que presenta una muda suspesa, amb les quatre primàries externes (de segona generació) d'ambdues ales sense mudar i la resta de primàries internes mudades (CAC)*.



El 15.V, a l'abocador de Solius, s'observa un tercer any leucístic amb les cobertores alars blanques (CAC)*. Podria tractar-se d'un exemplar ja observat l'agost del 2008 (Alvarez-Cros, 2010a).

El 23.V, a l'abocador de Solius, un exemplar adult amb els ulls foscos (CAC)*.

El 12.VI, un exemplar depreda sobre tórtora turca (*Streptopelia decaocto*) al carrer Gravina de Sant Feliu de Guíxols (CAC, MAC)..

L'11.VII dos juvenils es disputen el cos d'un anedó a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 18.VII, a l'abocador de Solius, s'aconseguí llegir dues anelles metàl·liques, que corresponien a ocells nascuts i marcats a la costa de Sant Feliu de Guíxols – Platja d'Aro el 1991 i 1990. Per tant, tenien 19 i 20 anys respectivament (CAC).



Els dies 24.VII i 25.VII, a l'abocador de Solius s'observa diversos exemplars, principalment juvenils amb diferents graus d'afectació per petroli. (CAC)*.

Els dies 24.VII i 25.VII, es llegeixen les primeres anelles corresponents a joves de l'any de Algèria i del delta de l'Ebre (CAC)*.



Com cada any, especialment durant els mesos d'estiu i tardor es multipliquen les observacions d'ocells lesionats per arts de pesca (CAC)*

El 18.VIII, a la platja de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un juvenil marcat amb una brida groga a la tibia dreta; el 29.VIII, s'observa el mateix exemplar a l'abocador de Solius (CAC)*



Els dies 1.XI, i 7.XI i 19.XII, a l'abocador de Solius, s'observa un segon any leucístic (CAC)*

Gavinot

Larus marinus

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrador esporàdic.

Un exemplar de primer hivern a l'abocador de Solius, el 12.XII; el mateix exemplar s'havia vist a Palamós el 10.XII; citació pendent d'homologació pel CAC.(CAC)*.



Gavians no identificats

Larus sp.



L'11.XII, a l'abocador de Solius, s'observa sengles exemplars de segon any calendari amb molt poc gris a les parts dorsals i els ulls amb iris clar. A aquesta edat, el gavià argentat (*Larus michahellis*) mediterrani, treu moltes més plomes grises, com es pot veure als exemplars del fons de les imatges. Aquest tipus de plomatge és més congruent amb el gavià argentat de potes roses (*Larus argentatus*) o, fins i tot, amb alguns exemplars de la raça cantàbrica de gavià argentat (*Larus michahellis "lusitanus"*). En tot cas, un reconegut ornitòleg català, afirma que podrien tractar-se de gavians argentats *Larus michahellis*, qui sap si vinguts del nord. (CAC)*.

El 19.XII, a l'abocador de Solius, s'observa un gavià adult, de mida semblant a la dels gavians argentats (*Larus michahellis*). Tenia ambdós ulls foscos, amb anell ocular vermell. El bec més aviat gruixut amb una aparent franja subterminal negra i taca gonial vermella. El disseny de la punta de l'ala i el to gris de les parts dorsals, semblants a les del gavià argentat. L'observació va ser molt ràpida ja que va volar de seguida de ser detectat, espantat per una màquina. Donada la manca d'imatges i l'excepcionalitat que suposaria que fos un ocell pertanyent a l'espècie *Larus armenicus*, no es pot descartar que es tractés d'un gavià argentat aberrant. (CAC).

Gavina menuda

Hydrocoloeus minutus

Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs.

Un exemplar adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 26.III i 28.III (CAC).

Fumarell carablanc

Chlidonias hybrida

Estatus: migrador esporàdic.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 1.V i 2.V (CAC)*. Segona observació a la vall del Ridaura des de primers dels anys 90 (Alvarez, 1999).



Fumarell negre

Chlidonias niger

Estatus: migrador esporàdic.

Un exemplar, el 15.IX, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG)*. Tercera citació d'aquesta espècie a la vall.



Xatrac bec llarg

Sterna sandvicensis

Estatus: migrador i hivernant regular.

Dos exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, l'11.VIII; primera observació postnupcial. (DVS).

Colom roquer

Columba livia

Estatus: resident, sedentari, abundant.

Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota originària d'aus escapades de captivitat.

Els dies 6.VI i 13.VI, un exemplar marcat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Portava una anella de color entre marró i grana al tars esquerre i una groga al tars dret amb el número 6015064 en negre, i en doble línia 2009 BEL.... En vol, s'aprecià que tenia el dors tenyit de vermell (CAC)*.



Tudó

Columba palumbus

Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

Estatus: resident sedentari, abundant.

Tórtora

Streptopelia turtur

Estatus: migrador i nidificant escàs.

El 2.V, un exemplar a can Tirans i dos més a Romanyà de la Selva; primeres observacions prenupcials (AMP).

Cotorreta de pit gris

Myiopsitta monachus

Estatus: després d'eradicar la incipient colònia establerta a Castell d'Aro, sembla que torna a nidificar a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions.

Observada durant tot l'any a una palmera front l'Hostal La Gavina de S'Agaró i a les palmeres dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols; a aquest darrer indret sembla que s'hi ha reproduït ja que al mes d'agost s'hi observa un mínim de deu exemplars (CAC).

Cucut

Cuculus canorus

Estatus: migrador i reproductor escàs.

La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

Un exemplar prop de la font del Ferro de Castell d'Aro, el 18.III: primera observació prenupcial (JRG).

Òliba

Tyto alba

Estatus: resident nidificant escàs.

Una parella es reproduïx a una església de Santa Cristina d'Aro (JRG)*.

El 8.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).



Xot

Otus scops

Estatus: migrant i nidificant escàs.

Dos exemplars prop de la font del Ferro de Castell d'Aro, el 18.III: primera observació prenupcial (JRG).



Duc

Bubo bubo

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

La població d'aquesta espècie a la vall sembla estabilitzada al voltant de les cinc parelles. Aquest any però, la cria no ha estat gaire reeixida a causa dels importants temporals primaverals, les agressions urbanístiques i les molèsties ocasionades pel col·lectiu d'escaladors. (JRG).

El 31.X un exemplar a la zona de la font d'en Barceló, a Castell d'Aro (JRG).

Un exemplar canta a la zona de la Roca de Malvet, el 8.XII (JRG).

Almenys un exemplar canta a la zona de can Duran del Gatellar, els dies 14.XI i 12.XII (JRG).

Mussol comú

Athene noctua

Estatus: resident nidificant escàs.

Parella al mas Pouplana, al costat de la carretera de Castell d'Aro a Platja d'Aro (CAC).

Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.

Ballester

Apus melba

Estatus: migrador i estival relativament abundant.

Abundant durant els passos migratoris i a les muntanyes de Gavarres i Ardenya, encara que no se n'ha confirmat la cria.

El 10.X, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (CAC, JRG)

El 12.X, diversos exemplars en pas sobre Pinell, a Platja d'Aro. (AMP)

Falciot negre

Apus apus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.

Diversos exemplars a Sant Feliu de Guíxols, el 2.IV; primera observació prenupcial (CAC).

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

Estatus: estival i migrador molt escàs.

Almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 24.IV (CAC).

Un mínim de tres exemplars a l'extrem nord del passeig dels Guíxols, el 24.X; el 30.X, un (CAC).

Blauet

Alcedo atthis

Estatus: migrador i hivernant escàs.

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro i un altre al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 31.VII. Primeres observacions postnupcials (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diverses observacions d'un exemplar del 15.VIII a final d'any; dos, el dies 8.IX, 19.IX i 12.XII (CAC, JRG, ANA).

Del 25.VIII al 19.XII, diverses observacions d'un exemplar al tram final del Ridaura (CAC).

Del 8.IX al 30.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC); el 5.X, dos (RMT).

Abellerol _____

Merops apiaster

Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs.

Primera observació prenupcial sobre Castell d'Aro, el 3.IV (JRG)

Gaig blau _____

Coracias garrulus

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

Un exemplar a Panedes, Llagostera, el 26.VII. (PFL).

Puput _____

Upupa epops

Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recullen dades de desembre i gener), encara que escàs.

Picot verd _____

Picus viridis

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser gros _____

Dendrocopos major

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser petit _____

Dendrocopos minor

Estatus: hivernant escàs i localitzat. No s'ha constatat la cria a la vall.

Almenys un exemplar a la pollancreda entre can Provencal i la variant de Santa Cristina d'Aro, el 21.II (CAC)*.

Una parella al mateix lloc, el 14.III (CAC).

Un mascle al mateix lloc, el 2.IV (CAC).

Un mascle adult al mateix lloc, l'11.X (CAC).

Dos exemplars al mateix lloc, el 6.XI (CAC).

Dos exemplars al mateix lloc, el 7.XII (CAC).



Cogullada vulgar _____

Galerida cristata

Estatus: present tot l'any. No massa abundant.

Cotoliu

Lullula arborea

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada.

El 10.IX, un exemplar a Panedes, Llagostera (JRG).

El 19.IX, dos exemplars al puig Portugal, Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 25.IX, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

Alosa vulgar

Alauda arvensis

Estatus: migrant i hivernant escàs.

Un vol d'uns setanta exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 25.XII (CAC).

Oreneta de ribera

Riparia riparia

Estatus: migrant no massa abundant.

El 3.IV, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, s'observa un exemplar barrejat amb un grup d'orenets vulgars (*Hirundo rustica*); primera observació prenupcial (CAC).

El 3.X, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i el dies 12.X i 13.X, almenys dos (CAC).

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

Estatus: hivernant escàs i localitzat.

El 16.I, nou exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Un exemplar prop de la punta d'en Bosch, el 16.I (JRG, LHM).

Cinc exemplars al Ridaura, a l'alçada del passallís de can Bada, el 10.II (LHM).

Una vintena d'exemplars al Ridaura, a l'alçada del parc de bombers, el 21.II (CAC).

L'1.XI, almenys tres exemplars a l'edifici Beach Palace, situat a la desembocadura del Ridaura; uns trenta exemplars al mateix lloc el 6.XI i no menys de cinquanta el 13.XI. Sembla que aquests roquerols podrien dormir-hi aprofitant els nius de la colònia estival de cria d'oreneta cuablanca (CAC)*.



Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.

Almenys tres exemplars al tram final del Ridaura i dos als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 6.III; primera observació prenupcial (CAC).

Les pluges continuades i les baixes temperatures de finals d'abril,



començament de maig han provocat una certa mortalitat d'aquesta espècie. A Castell d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, s'ha trobat adults morts al niu o al terra dels coberts de diverses cases on niaven (JRG)*.

Oreneta cuablanca

Delichon urbicum

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.

Almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 28.III; primera observació prenupcial (CAC).

Oreneta cua-rogenca

Cecropis daurica

Estatus: migrant i nidificant escàs.

Un exemplar al Ridaura, a l'alçada del passallís de can Bada, el 10.II; primera observació prenupcial (LHM).

Piula dels arbres

Anthus trivialis

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador regular, encara que escàs.

El 19.IX, dos exemplars al puig Portugal, Santa Cristina d'Aro (CAC)*.

Els dies 25.IX i 3.X, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).



Titella

Anthus pratensis

Estatus: migrador i hivernant abundant.

Diversos exemplars, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 12.X; primera observació postnupcial. (CAC).

Grasset de muntanya

Anthus spinoletta

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador molt escàs.

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 10.I (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.IV (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, els dies 4.XII i 5.XII (CAC)*.



Cuereta groga _____

Motacilla flava

Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral.
Primers exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 3.IV (CAC).

Cuereta torrentera _____

Motacilla cinerea

Estatus: present tot l'any en nombre no massa abundant.

Cuereta blanca _____

Motacilla alba

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cargolet _____

Troglodytes troglodytes

Estatus: present tot l'any relativament abundant.

Pardal de bardissa _____

Prunella modularis

Estatus: hivernant relativament abundant.

Pit-roig _____

Erithacus rubecula

Estatus: nidificant escàs i migrador i hivernant abundant.

Rossinyol _____

Luscinia megarhynchos

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.

Primers cants sentits a Castell d'Aro, el 15.IV; primera observació prenupcial (JRG).

Cotxa fumada _____

Phoenicurus ochruros

Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.

L'11.IX s'observa el primer exemplar, després de l'estació reproductora, a l'abocador de Solius (CAC).

Cotxa cuarroja _____

Phoenicurus phoenicurus

Estatus: migrador regular i escàs.

Un exemplar a la cala del Corb de Sant Feliu de Guíxols, el 8.IX (RMT).

El 25.IX, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

Bitxac rorenc

Saxicola rubetra

Estatus: migrador regular i escàs.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 24.IV (CAC).

El 19.IX, dos exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC)*.



Bitxac comú

Saxicola torquatus

Estatus: present tot l'any.

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Estatus: migrador regular i escàs.

El 24.IV, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació primaveral (CAC).

El 10.X, dos exemplars a la punta de Garbí. (DVS, MCD, DVB)

El 14.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (CAC)



Merla blava

Monticola solitarius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, encara que localitzat.

Merla de pit blanc

Turdus torquatus

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrador esporàdic.

El 2.XII es caça un exemplar a can Llac de Romanyà de la Selva (JRG).

Merla

Turdus merula

Estatus: present tot l'any, abundant.

Tord comú

Turdus philomelos

Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.

Un exemplar a can Provensal de Santa Cristina d'Aro, els dies 17.VI i 4.VII (CAC).

Griva

Turdus viscivorus

Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.

Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

Un exemplar, a Panedes, Llagostera, el 13.VI (JRG)

Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, amb no menys de sis exemplars el 4.XII (CAC).

Dos exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 12.XII (ANA).

Rossinyol bord

Cettia cetti

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Trist

Cisticola juncidis

Estatus: present tot l'any, en nombre més aviat escàs i localitzat.

Boscaler pintat gros

Locustella naevia

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

Només es tenia notícia de dues captures per anellament als mesos d'abril i setembre de 1995 (Alvarez, 1999).

Un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura, els dies 10.IV i 11.IV (CAC).

Un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles, el 24.IV (CAC).

Boscarla de canyar

Acrocephalus scirpaceus

Estatus: migrador relativament abundant.

Primera observació prenupcial a la desembocadura del Ridaura, el 10.IV (CAC).

Reproducció al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles; no es tenia notícia de la cria d'aquesta espècie a la vall, des de 1999 (Alvarez, 2010a) (CAC)*.



Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

Primera observació prenupcial a la bassa de la costa de l'Alou i al costat de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro, el 9.V (CAC)*.

Tallareta cuallarga _____

Sylvia undata

Estatus: present tot l'any, en nombre molt escàs i localitzat.

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 24.X (JRG).

Un exemplar a l'abocador de Solius, el 12.XII (CAC).

Tallarol de garriga _____

Sylvia cantillans

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

Un mascle a can Provensal de Santa Cristina d'Aro, l'1.IV; primera observació prenupcial (CAC).

Tallarol capnegre _____

Sylvia melanocephala

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Tallareta vulgar _____

Sylvia communis

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

El 19.IX, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

Tallarol gros _____

Sylvia borin

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

Els dies 19.IX i 25.IX, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC)*.



Tallarol de casquet _____

Sylvia atricapilla

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mosquiter pàl·lid _____

Phylloscopus bonelli

Estatus: migrador i nidificant escàs.

Almenys un exemplar al costat de la bassa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro, el 18.IV; primera observació prenupcial (CAC).

Mosquiter comú

Phylloscopus collybita

Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n'ha comprovat la cria, encara que no es descarta.

El 25.IV, al tram final del Ridaura, s'observa un exemplar amb un tumor a l'ull esquerre (CAC).

Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

Estatus: migrador regular.

Primera observació prenupcial al costat de can Provencal, a Santa Cristina d'Aro, l'1.IV (CAC).

El 19.IX, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

Reietó

Regulus regulus

Estatus: migrador i hivernant escàs.

Un exemplar al puig del Molí de les Forques, el 27.XI (RMT).

Diversos exemplars a Castell d'Aro, al recorregut del SOCC (CAC)*.



Bruel

Regulus ignicapilla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Papamosques gris

Muscicapa striata

Estatus: migrador regular, se n'ha comprovat la cria.

Un exemplar, a S'Agaró, el 22.XI; data molt tardana. (MFR)*.



Mategatatxes

Ficedula hypoleuca

Estatus: migrador regular.

Una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 8.V i 9.V; primera observació prenupcial (CAC).

Dos exemplars al camí de ronda de S'Agaró, el 28.IX (RMT)*.

El 3.X, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 17.X, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).



Mallerenga cuallarga

Aegithalos caudatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant tot i que, darrerament, s'ha notat una certa disminució dels seus efectius.

Mallerenga emplomallada

Parus cristatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mallerenga petita

Parus ater

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més abundant a l'hivern.

Mallerenga blava

Parus caeruleus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga carbonera

Parus major

Estatus: present tot l'any, abundant.

Raspinell comú

Certhia brachydactyla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Oriol

Oriolus oriolus

Estatus: migrador i estival en declivi.

Escorxador

Lanius collurio

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

El 19.IX, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC)*.



Capsigrany

Lanius senator

Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant a migrador escàs, encara que regular.

El 19.IX, un exemplar juvenil a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC)*.



Gaig

Garrulus glandarius

Estatus: present tot l'any, abundant.

Garsa

Pica pica

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cornella negra

Corvus corone

Estatus: divagant escàs.

A l'abocador de Solius, un exemplar el 7.II i dos el 13.II (CAC)*.

Dos exemplars a Panedes, Llagostera, a tocar del restaurant, el 28.II (CAC).

A l'abocador de Solius, un exemplar el 17.III (OBC), un el 25.IV, un el 15.V i un altre el 30.V (CAC)*.

Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro l'1.V (CAC).



Corb

Corvus corax

Estatus: present tot l'any, en molt petit nombre.

Detectat durant tot l'any en molt petit nombre a l'abocador de Solius (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, lloc on ja es va observar l'any passat, s'observa un exemplar els dies 5.IV, 11 i 17.IV (CAC).

Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

Estatus: present tot l'any, abundant, molt especialment a l'hivern.

El 6.III, al tram final del Ridaura, ja s'observa una còpula (CAC).

Estornell negre

Sturnus unicolor

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Diversos exemplars a S'Agaró, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, a la desembocadura del Ridaura, a can Provencal de Santa Cristina d'Aro i a l'abocador de Solius (CAC)*.



Pardal comú

Passer domesticus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Pardal xarrec _____

Passer montanus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pinsà comú _____

Fringilla coelebs

Estatus: present tot l'any, abundant a l'hivern i nidificant escàs.

El 28.III s'observa els darrers exemplars, abans de l'estació reproductora, a l'abocador de Solius (CAC).

Un mascle adult al pla de Panedes, a Llagostera, el 13.VI (JRG).

Dos exemplars, un d'ells un mascle adult, prop de cal Cuc, a Castell d'Aro, el 17.VI (CAC).

L'1.XI s'observa els primers exemplars, després de l'estació reproductora, a l'abocador de Solius (CAC).

Gafarró _____

Serinus serinus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Del 8.IX al 15.X, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar de coloració aberrant clara, com un canari domèstic (CAC)*.



Verdum _____

Carduelis chloris

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cadernera _____

Carduelis carduelis

Estatus: present tot l'any, abundant.

Lluer _____

Carduelis spinus

Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant.

El 16.I, diversos exemplars al parc de les Dunes de Sant Pol (CAC).

Un exemplar entre canyet i Sant Feliu de Guíxols, el 21.XI (DVS).

Passerell comú _____

Carduelis cannabina

Estatus: present tot l'any, escàs.

Gratapalles _____

Emberiza cirius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Sit negre _____

Emberiza cia

Estatus: migrant i hivernant, molt escàs.

Vuit exemplars a can Llach, a Romanyà de la Selva, el 29.I (JBL).

Repicatalons _____

Emberiza schoeniclus

Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la desaparició de les taques de canyissar de la vall.

El 6.XI, es constata una ja bona quantitat d'exemplars, al tram final del Ridaura i als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

Cruixidell _____

Emberiza calandra

Estatus: migrant i nidificant, escàs.

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia

Alopochen aegyptiaca

Tres exemplars d'origen desconegut apareixen als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 24.IV (CAC)*.

El 09.X, a primera hora del matí, dos exemplars d'origen desconegut sobrevolen la desembocadura del Ridaura i marxen en direcció nord (CAC).



Tórtora domèstica

Streptopelia roseogrisea var. *risoria*

Un exemplar a can Juanals de Castell d'Aro, el 17.I (CAC).

Un exemplar al costat dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 24.IV (CAC).

Cacatua mimfa

Nymphicus hollandicus

A Castell d'Aro, un exemplar atacat per diverses garses (*Pica pica*), el 24.V. Es rescata encara viu, però no es pot evitar la mort posterior (JRG).

El 6.VI, un exemplar molt manyac a la riba dreta del Ridaura, prop del pont de la variant de Platja d'Aro (CAC)*.

El 19.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG); el 2.X encara hi era (RMT, CAC).



Agapornis

Agapornis sp

L'1.III, dos exemplars a Castell d'Aro (JRG).

TAULA D'OBSERVADORS

<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>
AMP	Àlex Massana Pernias
ANA	Aniol Negre Albertí
CAC	Carlos Alvarez Cros
DVB	Daniel Valverde Bussot
DVS	Dani Valverde Saubí
FCC	Fina Cros Chavarria
JB	Jaume Bosch
JBL	Josep Ma Bas Lay
JRG	Jaume Ramot García
LHM	Lluís Hugas Mulà
MAC	Manuel Alvarez Cros
MCD	Mireia Codina Diago
MFR	Miguel Angel Fuentes Rosúa
MG	Manel Gonzales
ML	Michael Lockwood
OBC	Oriol Baena Crespo
PAS	Personal Abocador de Solius
PFL	Ponç Feliu Latorre
RMT	Rosa Matesanz Torrent

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Alvarez, C. 1999. Els ocells de la vall del Ridaura. Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Alvarez, C. (ed.). 2005-2011. Actualització del catàleg dels ocells de la vall del Ridaura: www.ocellsvallridaura.comxa.com

Alvarez, C., Burgas, A., Capalleras, E., Feliu, P., Ollé, A. 2008. Llista Patró dels ocells de l'Empordà. Gener de 2008. Comitè Avifaunístic Empordanès. Versió "on line": http://www.comiteempordanes.org/Llista/LLISTA_PATRO_Gener_2008.pdf

Alvarez-Cros, C. (coord.). 2010a. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 1999 - 2008. Àncora, Suplement del núm.: 3.143. Associació Cultural Bitàcola, Sant Feliu de Guíxols. Versió digital: www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_1999_2008.pdf

Alvarez-Cros, C. (ed.). 2010b. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2009. www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2009.pdf

CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya). 2008. Taxons sotmesos a homologació (Última modificació 29/10/08). www.ornitologia.org/monitoratge/cac5.htm

Clavell, J., Copete, J. L., Bigas, D., Sales, S., Arcos, J. M., Lopez, F. & Clarabuch, O. 2006. Llista patró dels ocells de Catalunya. Edició 2.0, octubre de 2006. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO. Versió "on line": www.ornitologia.org/monitoratge/llista_ocells_catalunya.pdf

Crochet P.-A., Raty L., De Smet G., Anderson B., Barthel P.H., Collinson J.M., Dubois P.J., Helbig A.J., Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Le Maréchal P., Parkin D.T., Pons, J.-M., Roselaar C.S., Svensson L., van Loon A.J., Yésou P. 2010. AERC TAC's Taxonomic Recommendations. July 2010. <http://www.aerc.eu/tac.html>.

Dies J. I., García, E., Gorospe, G., Gutiérrez, R., Lorenzo, J. A., Martí-Aledo, J., Gutiérrez, P., Vidal, C. 2008. Lista de Rarezas de España. Taxones de aves sometidos a homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. Madrid, SEO/BirdLife. Versió "on line": www.seo.org/media/docs/lista_rarezas_2006.pdf

Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge 2010. La població d'una espècie d'ocell marí en perill d'extinció es veu afectada pels temporals de finals d'hivern.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsyp/AppJava/notapremsavw/detall.do;jsessionid=GsjtL7JDmJyM0WvIPSpGL0XybHvhZqPYLBHWQglGGM0tv9hQ7Sm9!14500257?id=36982&idioma=0&departament=20&canal=21

Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 2008. Hipermapa. Ates electrònic de Catalunya. www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp

ICO (Institut Català d'Ornitologia). 2009-2010. www.ornitho.cat